Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Entomologisches Taschenbuch für Schmetterlings-Sammler

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

Monatliche Flugzeit der Schmetterlinge.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

Visual Library

Monatliche Flugzeit

der

Schmetterlinge.

Landesbibliothek Oldenburg

Landesbibliothek Oldenburg

Abbreviaturen.

Pap.	Papilio.
Hesp.	Hesperia. Fabricius.
Sph.	Sphinx.
Ses.	Sesia. Fabricius.
Zig.	Zigaena. Fabricius.
Bomb.	Bombices.
Noct.	Noctua.
Phal.	Phalaena. Fabricius.
Piral.	Piralides.
Tin.	Tinei.
Tort.	Tortrices.
Aluc.	Alucitae.
Esp.	Esper.
W. V.	Wiener Verzeichniß.
L.	Linnei.
Fabr.	Fabrizius.
Borckh.	Borckhausen.

Landesbibliothek Oldenburg

Landesbibliothek Oldenburg

Januar.

1. Pap. Jo. L. Vor zwey Jahren, den 17ten dieses Monats, fand ich einen auf dem Schnee umherflattern, der auch nicht im mindesten beschädigt war.
2. Phal. Hyemaria. Borckh. An den Stämmen der Linden, Pappeln und Buchen.
3. Phal. Brumaria. Borckh. Ist verschiedentlich schon in diesem Monate bey starkem Froste gefangen worden.

Februar.

1. Pap. Antiopa. L. Zeigt sich schon oft an heitern Tagen in diesem Monate.
2. Pap. Urticae. L.
3. Phal. Vernaria. L. In Gärten und Wäldern.
4. Phal. Hyemaria. Borckh. siehe Januar.
5. Phal. Brumaria. Borckh. siehe Januar.

März.

1. Pap. Machaon. L. Sucht sich zum Fluge freye Stellen aus.
2. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
3. Pap. Podalirius. L. An freyen Oertern.
4. Pap. Urticae. L. In nesselreichen Gegenden.
5. Pap. Rhamni. L. In Gärten, Wiesen und Laubwaldungen.

Landesbibliothek Oldenburg

6. Sph. Elpenor. L. Entschlüpft zu Ende dieses Monats der Puppe, und zeigt sich des Abends im Fluge.
7. Sph. Porcellus. L. Kommt ebenfalls schon oft in diesem Monate aus der Puppe.
8. Bomb. Pavonia minor. L. Das Männchen fliegt am Tage.
9. Bomb. Hicifolia. L. Kommt in diesem Monate bey warmer Witterung zum Vorschein, und verbirgt sich in den Ritzen der Bäume.
10. Bomb. Versicolora. L. An den Stämmen und Zweigen der Birken, Erlen und Weiden.
11. Bomb. Nubeculosa. Esp. In Waldungen an Baumstämmen.
12. Bomb. Cassinia. Esp.
13. Noct. Lolii. Bomb. Esp. An Zäunen und Mauern.
14. Noct. Rumicis. Esp.
15. Noct. Erythocephala. Esp. Ende dieses Monats an Baumstämmen.
16. Phal. Diversata. Borckh. In Föhren-Waldungen, wo sie gemeiniglich platt auf der Erde sitzt.
17. Phal. Pascuaria. Borckh. Auf Wiesen und lichten grasigten Plätzen in Wäldern.

April.

1. Pap. Cardamines. L. In lichten sumpfigten Waldungen.
2. Pap. Aegaeria. L. Am häufigsten in sumpfigten Erlen-Brüchen.
3. Pap. Polichloros. L. In Gärten und an Häusern.
4. Pap. Polixena. W. V. Zeigt sich in einigen warmen Gegenden Deutschlands; das eigentliche Vaterland ist Ungarn und Frankreich.

Landesbibliothek Oldenburg

5. Hesp. Minimus. Pap. Esper. Auf dem Vorsaum der Wälder.
6. Sph. Elpenor.
7. Sph. Porcellus.
8. Bomb. Rubi. L. Gegen Ende dieses Monats zeigt das Männchen sich am Tage im schnellen Fluge.
9. Bomb. Lucifera. W. V.
10. Bomb. Roboris. Esper.
11. Bomb. Curtula. Esper. Zeigt sich zu Anfange dieses Monats.
12. Bomb. Cossus. L. An Weidenstämmen.
13. Bomb. Anastamosis L. Zu Ende des Monats.
14. Bomb. Argentina. W. V. Zu Ende dieses Monats an Eichenstämmen.
15. Bomb. Palpina. L. An den Stämmen der Weiden, Espen, oder den daran nahe gelegenen Zäunen und Mauern.
16. Bomb. Hamula. W. V. Auf Espen, Eichen, Weiden und Bircken.
17. Bomb. Sicula. W. V. Zu Ende dieses Monats auf Buchen, Eichen, Schlehen und Weiden.
18. Bomb. Lupolina. Esp. An Zäunen und Gemäuern.
19. Bomb. Nemorosa. Esp. In lichten Waldungen im Grase.
20. Bomb. Fuliginosa. L. An Zäunen und Mauern.
21. Bomb. Terifica. W. V. An den Stämmen der Pappeln.
22. Bomb. Chaonia. W. V.
23. Noct. Parthenias. L. Zu Anfange dieses Monats in lichten Laubwaldungen, wo sie sich im hervorsprossenden Grase gern niederläßt.

24. Noct. Glyphica. L. Fliegt am Tage, und nährt sich von dem Safte der Blumen.
25. Noct. Mi. L. Zeigt sich in Gesellschaft der Glyphica.
26. Noct. Fimbria. L. An den Stämmen der Bäume und Gartenmauern.
27. Noct. Puella. L. Im Grase in Laubwaldungen.
28. Noct. Pallens. Esper.
29. Phal. Margaritaria. Hübner. Auf Eichen und an den Stämmen derselben.
30. Phal. Vibicaria. Esp. Im Grase in lichten Laubwaldungen.
31. Phal. Dolabraria. Fabr. Auf Eichen.
32. Phal. Consobrinaria. Borckh. Auf italienischen Pappeln.
33. Phal. Pascuaria. L. Auf Wiesen und lichten grasigten Plätzen in Wäldern.
34. Phal. Prodromaria. W. V. An den Stämmen der Linden, Weiden, Eichen und Birken.
35. Phal. Hirtaria. Fabr. An den Stämmen der Linden, Pappeln, Weiden, Ulmen, Kirschbäumen und allen Arten Pflaumenbäumen.
36. Phal. Zonaria. W V.
37. Phal. Murinaria. Fabr.
38. Phal. Marginaria. Fabr. An den Stämmen der Linden und Birken.
39. Phal. Atomaria. L. Auf Wiesen und grasreichen Stellen in Wäldern, auch auf den niedrigen Gesträuchen.
40. Phal. Glarearia. Borckh. Zeigt sich in Gesellschaft der vorigen.

41. Phal.

41. Phal. Diversata. Borckh. In Föhren-Waldungen.
42. Phal. Garpinata. Borckh. In niedrigen Gebüschen.
43. Phal. Hexapterata. Fabr. An den Stämmen der Pappeln, Ahorn und Rüstern.
44. Phal. Derivata. Fabr. In Gärten und Gebüschen.
45. Phal. Tristata. L. In Gärten und Wäldern, an Zäunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
46. Phal. Euphorbiata. L. Im Grase in Waldungen und Wiesen.
47. Piral. Purpuralis. L. Auf Weidungen im Grase.
48. Piral. Ptybridalis. Hübner.

May.

1. Pap. Sinapis. L. In lichten Laubwaldungen, wo niedrige Gebüsche stehen.
2. Pap. Medea. Herbst. Auf freyen Grasplätzen an Waldungen.
3. Pap. Dejanira. L. In Waldungen und Haiden.
4. Pap. Levana. L. In freyen Waldungen.
5. Pap. Lucina. W. V. In lichten Waldungen.
6. Pap. Eufrosine. Esper. In Wäldern auf freyen Grasplätzen.
7. Pap. Pamphilus. L. Auf Wiesen und Waldungen überall.
8. Pap. Hero. L. In lichten Waldungen, in gebirgigen Gegenden.
9. Pap. Eupheno. L. In den Gegenden von Marseille nicht selten.
10. Pap. Tarpeia. Esp. In Rußland und Kamtschatka.
11. Pap. Geltis. Esp. In Tyrol und Ungarn.
12. Pap. Machaon. L. Sucht sich zum Fluge freye Stellen aus.

13. Pap.

Landesbibliothek Oldenburg

13. Pap. Podalirius. L. Zeigt sich in Gesellschaft des vorigen.
14. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
15. Pap. Cardamines. L. In lichten sumpfigten Waldungen.
16. Pap. Rhamni. L. Auf Wiesen, in Gärten und Waldungen nicht selten.
17. Pap. Aegaeria. L. In sumpfigten Erlenbrüchen, auch in lichten Waldungen.
18. Hesp. Phlaeas. Pap. L. Auf freyen Anhöhen.
19. Hesp. Malvae. Esper. Im Freyen, wie auch in Waldungen.
20. Hesp. Icarus. Pap. L. Auf freyen Anhöhen.
21. Hesp. Tiresias. Pap. Esp. Auf blumigten Stellen in Waldungen.
22. Hesp. Phocas. Pap. Esp. Zu Anfange dieses Monats auf Wiesen und in lichten Waldungen.
23. Hesp. Cleobis. Pap. Esp. In der Mitte des Monats auf Wiesen, so nahe an Waldungen liegen.
24. Hesp. Eumedon. Pap. Esp. Auf einsamen Plätzen in Waldungen.
25. Hesp. Althaee. Pap. Esp. In gebirgigen Gegenden.
26. Hesp. Minimus. Pap. Esp. Auf dem Vorsaum der Wälder.
27. Hesp. Xanthe. Pap. Borckh. Auf Wiesen und in Waldungen.
28. Sph. Tilliae L. Bey Tage nicht selten an den Zweigen und Stämmen der Linden.
29. Sph. Gallii. Fabr. Bey Tage, besonders des Abends, auf den Blüthen des caprifolii.
30. Sph. Oenothaerae. W. V. An Zäunen und Gesträuchen.

31. Sph.

Landesbibliothek Oldenburg

31. Sph. Elpenor. L. Zeigt sich auch noch oft in diesem Monate.
32. Sesia. Apiformis Sph. L. An den Stämmen der Pappelbäume.
33. Bomb. Pavonia major. L. Um Wien herum nicht selten.
34. Bomb. Pavonia medior. L. In Ungarn.
35. Bomb. Tau. L. In Laubwaldungen an den Stämmen der Bäume. Das Männchen fliegt am Tage.
36. Bomb. Quercifolia. L. An verborgnen Stellen der Bäume und Geländer. Bey der mindesten Berührung sucht sie durch herabfallen allen Nachforschungen zu entgehen.
37. Aomb. Eatax. L.
38. Bomb. Lentipes. Esper.
39. Bomb. Vinula. L. An den Stämmen der Weiden.
40. Bomb. Erminea. Fabr. Gegen Ende dieses Monats an den Stämmen der Espen und Weiden.
41. Bomb. Bucephala. L.
42. Bomb. Neustria. L. Das Männchen fliegt am Tag umher.
43. Bomb. Limacodes. Esper.
44. Bomb. Bicoloria. W. V. Auf Birkenbäume, von wo sie durch heftige Erschütterungen herunter fällt, dann aber bald munter wird, und schnell davon fliegt.
45. Bomb. Dictaea. Esp.
46. Bomb. Dictaeoides. Esp.
47. Bomb. Aulica. Esp.
48. Bomb. Camelina. L.
49. Bomb. Hecta. Esp. Auf Eichen. Fällt durch anschlagen herunter.

50. Bomb. Sylvina. Esp. Im Grase in Waldungen, und an den Stämmen der Bäume.
51. Bomb. Leporina. Esp.
52. Bomb. Rubi. L. Das Männchen fliegt am Tage.
53. Bomb. Hamula. W. V. Auf Espen, Weiden, Eichen und Birken.
54. Bomb. Sicula. W. V. Auf Buchen, Eichen Schlehen und Weiden.
55. Bomb. Plantaginis. L. Auf Wiesen bey Waldungen, und im Grase derselben.
56. Bomb. Terrifica. W. V. An den Stämmen der Pappeln.
57. Bomb. Villica. L. An Zäunen und im Grase.
58. Bomb. Pudibunda. L. An den Stämmen der Lindenbäume.
59. Noct. Gothica. Bomb. Esp. An Wänden, Zäunen und den Stämmen der Bäume.
60. Noct. Batis. L.
61. Noct. Augus. Esper.
62. Noct. Pronuba. L. Im Grase unter dürren Blättern und versteckten Oertern, fliegt am Tage sehr schnell.
63. Noct, Subsequa. Esper. In Gesellschaft von Pronuba, wenigstens an dem nehmlichen Auffenthalt.
64. Noct. Janthina. W. V. Versteckt im Grase, auch unten an den Stämmen der Bäume.
65. Noct. Aceris Esp.
66. Noct. Alni. Esp.
67. Noct. Euphorbiae. Esp.
68. Noct. Aprilina. Esp. An den Stämmen der Bäume in Laubwaldungen.

69. Noct.

69. Noct. Ligustri. Esp.
70. Noct. Egregia. Esp. Zeigt sich zu Anfange dieses Monats.
71. Noct. Ludifica. W. V.
72. Noct. Culta. Esp.
73. Noct. Piniperda. Esp.
74. Noct. Unigutta. Esp.
75. Noct. Bricuris. Esp. Zeigt sich gegen Ende dieses Monats, und schwärmt des Abends auf den Blumen.
76. Noct. Glyphica. L. Fliegt am Tage, und nährt sich von den Saft der Blumen.
77. Noct. Pallens. Esp.
78. Noct. Pythiocampa. L. Zu Anfange dieses Monats an den Stämmen der Tannen.
79. Noct. Pyrophila. W. V.
80. Noct. Poliodon. Fabr.
81. Noct. Umbratica. L.
82. Noct. Delphinii. L.
83. Noct. Artiplicis. L.
84. Noct. Lactucae. Esp.
85. Noct. Auricoma. Esp.
86. Noct. Dipsacea. Esp.
87. Noct. Scrophulariae. Esp.
88. Noct. Pinastri. L.
89. Noct. Pisi.
90. Noct. Olorecea.
91. Bomb. Anastamosis. L.
92. Bomb. Dromedarius. L. An den Stämmen der Weiden.
93. Bomb. Coryli. L.
94. Bomb. Cuculla. Esper.

95. Noct.

Landesbibliothek Oldenburg

95. Noct. Megacephala. Fabr.
96. Noct. Histrio. Götze.
97. Noct. Psi. L.
98. Noct. Oleracea. L.
99. Noct. Meticulosa. L.
100. Noct. Albipuncta. Fabr.
101. Noct. Alsinis. Brahm.
102. Noct. Poliodon. W. V.
103. Noct. Cucubali. W. V.
104. Phal. Vibicaria. L. Im Grase in lichten Laubwaldungen.
105. Phal. Piniaria. L. In jungen Fichten-Waldungen.
106. Phal. Crepustulata. Hübner. An den Stämmen der Buchen.
107. Phal. Cebraria. Hübner. Einsam, auf sandigen Gegenden, wo nur sparsam Gras wächst.
108. Phal. Petraria. Hübner. In Erlenbrüchen häufig.
109. Phal. Atomaria. L. Im Grase und niedern Gesträuchen in Laubwaldungen.
110. Phal. Amataria. L. In Gärten an den Geländern, wie auch in den niedern Gebüschen der Laubwaldungen.
111. Phal. Lactearia. Esp. Auf die untere Seite der Baumblätter in Laubwaldungen.
112. Phal. Prunaria. L. In Birken, Erlen und Haselbüschen.
113. Phal. Lunaria. W. V. In Gärten an den Stämmen der Obstbäume, oder den nahe daran gelegenen Verzäunungen.
114. Phal. Crataegata. L. In Schlehen und Erlenbüschen.

115. Phal. Viridata. L. In Wäldern auf Grasreichen Plätzen.
116. Phal. Lineolata. W. V. In lichten Plänen in Waldungen auf der Erde.
117. Phal. Russata. Fabr. In Wäldern, wo viele Besenpfrieme wächst, auf die sie sich auch niederläßt.
118. Phal. Palumbaria, L. In Wäldern auf der Erde.
119. Phal. Flavicaria. W. V.
120. Phal. Dolabraria. W. V.
121. Phal. Repandaria, L. An Weißbuchenhägen und in Pappelnbüschen.
122. Phal, Prodromaria. W. V. An den Stämmen der Pappeln, Linden, Birken, Eichen und Weiden.
123. Phal. Betularia. L. An den Stämmen der Weiden, Pappeln, Birken und Rüstern, oder der daran nahe gelegnen Verzäunungen.
124. Phal. Pomonaria. W. V.
125. Phal. Pulveraria. L. In Waldwiesen und grasreichen Waldplätzen.
126. Phal Adspersaria. Hübner.
127. Phal Glarearia. Borckh. Zeigt sich in der Gesellschaft der Aomaria.
128. Phal. Luridata. Borckh. Auf den Zweigen und an den Stämmen der Eichen in Laubwäldern.
129 Phal. Liturata. L. Auf jungen Föhrenstämmen.
130. Phal. Punctulata. W. V. In Laubwaldungen an den Birckenstämmen.
131. Phal. Pendularia. L. In jungen Birkenwäldern nicht selten.

Landesbibliothek Oldenburg

132. Phal. Punctaria. L. In Eichenwäldern an den Stämmen und Zweigen derselben.
133. Phal. Omicronaria. W. V. In jungen Gebüschen und an den Stämmen verschiedener Bäume.
134. Phal. Pusaria. L. In Laubwaldungen und Gebüschen.
135. Phal. Exanthemata. W. V. In Laubwaldungen mit der Pusaria zu gleicher Zeit.
136. Phal. Obliterata. Borckh. In Erlengebüschen.
137. Phal. Clypeata. Borckh.
138. Phal. Dubitata. L. In Gärten an Bretterwänden.
139. Phal. Rhamnata. Fabr. In Laubwaldungen.
140. Phal Hexapterata. Fabr. An den Stämmen der Pappeln, Ahorn, Rüstern und Platane.
141. Phal. Sexalata. Borckh. An den Stämmen der Weiden und Pappeln.
142. Phal. Zonata. Borckh. An Ahorn und Pappelnstämmen.
143. Phal. Trifascrata. Borckh. An Eichenstämmen.
144. Phal. Rivulata. W. V. In Gärten an den Umzäunungen derselben.
145. Phal. Insignata. Borckh. An Lindenstämmen.
146. Phal. Undulata. L. In Erlen und Birkengebüschen.
147. Phal. Luteata. Fabr. In Erlengebüschen.
148. Phal. Ochreata. Fabr. Auf Waldwiesen und Haselgebüschen.
149. Phal. Pallidata. W. V. Auf Waldwiesen nicht selten.
150. Phal. Osseata. Fabr. In Wiesen und auf grasigten Waldplätzen.

Landesbibliothek Oldenburg

151. Phal. Succenturiata. L. In Gärten an Zäunen, und Gartenhäusern, auch selbst in denselben.
152. Phal. Innotata. Borckh. An Baumstämmen Bretterwänden und Zäunen.
153. Phal. Scabiosata. Borckh.
154. Phal. Caprearia. Borckh.
155. Phal. Strobilata. Borckh. In Tannen-Wäldern.
156. Phal. Olivata. Borckh. In Birken-Wäldern.
157. Phal. Alchemillata. L In Birken- und Erlengebüschen, wo Alchemille wächst.
158. Phal. Ocellata. L.
159. Phal. Galiata. W. V. In Gärten und Wäldern.
160. Phal. Derivata. W. V. In Gärten.
161. Phal. Hastata. L. In Birkengebüschen.
162. Phal. Tristata. L. In Gärten und Wäldern, auch an Zäunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
163. Phal. Albicillata. L.
164. Phal. Marginata. L. In niedrigen Haselgebüschen.
165. Phal. Macularia. L. Im Grase, wo viele Heide steht.
166. Phal. Temerata. W. V. In Wäldern.
167. Phal. Euphorbiata. Fabr. Im Grase in Wäldern, wo viele Cypressen-Wolfsmilch steht.
168. Piral. Salicalis. W. V. Auf Weidenauen.
169. Piral. Emortualis. W. V. In freyen Wäldern und Gebüschen.
170. Piral. Grisealis. W. V. Nicht selten in Buschwäldern.

171. Piral.

171. Piral. Barbalis. L. Auf Wiesen.
172. Piral. Pollinalis. W. V. In Wiesen oft häufig.
173. Piral. Cingulalis. W. V. Auf blumigten Weiden und Wiesen.
174. Piral. Anguinalis. Hübner. Zeigt sich in Gesellschaft der Cingulalis.
175. Piral Sanguinalis, Hübner. Auf Wiesen und Weiden.
176. Piral. Cespitalis. Hübner. Häufig in Grasgegenden.
177. Piral. Sordidalis. Hübner. Zeigt sich in Gesellschaft von Cespitalis.
178. Piral. Urticolis. Hübner. An Nesselreichen Stellen.
179. Piral Pallustralis. Hübner. Im Banat an Sümpfen.
180. Piral. Rubiginalis. Hübner. Auf Anhöhen.
181. Piral. Verticalis. Hübner. In Waldungen an Nesselreichen Stellen.
182. Piral. Fuscalis. Hübner. Auf Wiesen und Weiden im Oesterreichischen und der Ukraine.
183. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

Juny.

1. Pap Palaemo. Esp. Auf Blumenreichen Wiesen.
2. Pap. Hyperanthus. L. Ende dieses Monats häufig auf Wiesen.
3. Pap. Maera. L. In lichten Waldungen, an Zäunen, Wegen und Hecken.
4. Pap. Iris. 5. Pap. Iris luteus. Esper. 6. Pap. Iris rubescens. 7. Pap. Ilia und 8. Pap. Jole W. V.

W. V. Auf freyen Plätzen in und an Waldungen.

9. Pap. Maturna. Esp. In Waldigten Lagen.

10. Pap. Cinxia. L. Auf Wiesen so an Waldungen liegen.

11. Pap. Adippe. L. In der Mitte dieses Monats in Gesellschaft des Aglaia.

12. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen auf freyen und feuchten Plätzen.

13. Pap. Lucina. W. V. In lichten und grasigten Wäldern.

14. Pap. Arge russiae. Esper. Auf Wiesen.

15. Pap. Cinthia. W. V. Auf freyen Stellen in Waldungen.

16. Pap. Proserpina. W. V. Auf freyen grasigten Stellen in Wäldern, und auf Wiesen um Wien herum nicht selten.

17. Pap. Athalia. Esp. 18. Pap. Pilosellae. Esp. Zeigen sich gemeinschaftlich, auf freyen grasreichen Plätzen, in und an Waldungen.

19. Pap. Ino. Esp. Einzeln auf unangebauten Brachfeldern.

20. Pap. Selene. Esp. In Wäldern, an lichten Plätzen.

21. Pap. Climene. Esper. Rußland.

22. Pap. Actaea. Esper. In Rußland auf kahlen Bergen.

23. Pap. Autonoe. Esp. In Rußland auf Bergigten Gegenden.

24. Pap. F. album. Esp. In Rußland in Gesellschaft der autonoe.

25. Pap. Amathusia. Esp. Um Petersburg herum häufig.

26. Pap. Fascelis. Esp. Rußland.
27. Pap. Athalia minor, Esp. Rußland.
28. Pap. Europome. Esp. An einsamen Plätzen in Waldungen, in einigen Gegenden Deutschlands.
29. Pap. Suwarowius. Herbst. In der Gegend um der Wolga in Rußland.
30. Pap. Luidion. Herbst. Auf feuchten Wiesen.
31. Pap. Iphigenia. Herbst. In Ungarn in Waldungen.
32. Pap. Machaon. L. Auf freyen Stellen in Wäldern.
33. Pap. Podalirius. L. An freyen und ofnen Oertern.
34. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
35. Pap. Sinapis L. In lichten Laubwaldungen.
36. Pap. Jo. L. An freyen und Nesselreichen Gegenden.
37. Pap. Dejanira. L. In Waldungen und Haiden.
38. Pap. Hero. L. In gebürgigen Gegenden in lichten Holzungen.
39. Pap. Aglaia L. Ende Monats auf Blumen in lichten Wäldern.
40. Pap. Agrotera. Borckh. In lichten Wäldern.
41. Pap. Delia. L. Auf Waldwiesen.
42. Hesp. Arion. Pap. L. Auf Wiesen und in lichten Waldungen.
43. Hesp. Argus. Pap. Esp. An den Rändern der Waldungen, wie auch in Gärten und Wiesen.
44. Hesp. Argiolus. Pap. Esp. Zeigt sich in Gesellschaft des Argus.
45. Hesp. Rubi. Pap. L. Zeigt sich einzeln unter den Argusarten.
46. Hesp. Pruni. Pap. Esp. Ende dieses Monats.

47. Hesp. Quercus. Pap. L. In Eichenwäldern.
48. Hesp. Linceus. Pap. Esp. Um Schlehensträucher.
49. Hesp. Euridice. Pap. Borckh. In lichten Waldungen.
50. Hesp. Bellargus. Pap. Esp. In Gärten, auf Wiesen und in grasigten Wäldern.
51. Hesp. Diomedes. Pap. Borckh. Auf Wiesen und und in lichten grasigten Wäldern.
52. Hesp. Comma. Pap. L. In lichten Waldungen.
53. Hesp. Sylvanus. Pap. Esper. In lichten Waldungen und am Vorsaum derselben.
54. Hesp. Melicerta. Pap. Borckh. An und in lichten Wäldern.
55. Hesp. Thaumas. Pap Borckh. In Gesellschaft der vorigen verwandten Arten.
56. Hesp. Actaeon. Pap. Borckh.
57. Hesp. Paniscus. Pap. Borckh. Zeigt sich, obgleich seltener, ebenfalls in freyen Waldungen in Gesellschaft der verwandten Arten.
58. Hesp. Frittilarius. Pap. Borckh. Auf Wiesen an Wegen und Wäldern.
59. Hesp. Altheae. Pap. Borckh. Auf Wiesen.
60. Hesp. Tages. Pap. L. Auf lichten Waldplätzen.
61. Hesp. Virgaurea. Pap. Esp. Bergigte Lagen sind sein gewöhnlichster Aufenthalt.
62. Hesp Hippothoe. Pap. L. In Gesellschaft der Virgaurea.
63. Hesp. Battus. Pap. W. V. In Wäldern an einsamen Oertern.
64. Hesp. Semiargus. Pap. Esp. In Gärten und Wiesen.

65. Hesp. Arcas. Pap. Esp. In freyen Waldungen.
66. Hesp. Alcaee. Pap. Esp. In Gärten.
67. Hesp. Biton. Pap. W. V. In bergigten Gegenden.
68. Hesp. Erebus. Pap. Esp. In Wäldern auf lichten Grasplätzen.
69. Hesp. Argiades. Pap. Esp. An einzelnen abgesonderten Plätzen oft zahlreich, doch nicht in Gesellschaft der übrigen Argus-Arten.
70. Hesp. Xanthe. Pap. Borckh. Auf Wiesen und in Waldungen.
71. Hesp. Phocas. Pap. Esp. Auf Waldwiesen.
72. Sph. Ocellata. L. An den Stämmen der Weidenbäume.
73. Sph. Nerii. L.
74. Sph. Convolvuli. L. Des Abends auf den Blüthen des Caprifolii und andern strenge riechenden Gewächsen.
75. Sph. Ligustri. L. Des Abends nach Sonnenuntergang auf strenge riechenden Blumen.
76. Sph. Populi. L. An den Stämmen der Weiden.
77. Sph. Atropos. L. Des Abends auf den Blüthen des Jasmins und Caprifolio.
78. Sph. Celerio. L.
79. Sph. Elpenor. L. Des Abends auf den Blüthen des Caprifolio oft sehr häufig.
80. Sph. Porcellus. L. Bey Tage nicht selten im Grase; des Abends auf Caprifolium.
81. Sph. Euphorbiae. L. Des Abends auf Caprifolii und andern stark riechenden Blumen.
82. Sph. Pinastri. L. Bey Tage an den Stämmen der Fichten- und Tannenbäume.
83. Sph. Fuciformis. L. Fliegt sehr schnell, und zeigt sich am Tage auf Blumen.

84. Sph. Bombiliformis. L. Zeigt sich, obgleich selten, in Gesellschaft des Fuciformis.

85. Sph. Quercus. W. V. Zeigte sich ehemals um Wien in einem jungen Eichenholze, welches aber schon seit einigen Jahren niedergehauen, wodurch er zur größten Seltenheit geworden ist.

86. Sph. Livornica. Hübner. Hat sich schon in verschiedenen Gegenden Deutschlands gezeigt, obgleich sehr selten.

87. Ses. Culiciformis. Sph. L. Sitzt am Tage auf den Blüthen der Bäume.

88. Ses. Vespiformis. Esp. Zur Mittagszeit auf den Blüthen der Bäume.

89. Ses. Tipuliformis L. Auf den Blättern der Johannisbeersträucher.

90. Ses. Oestriformis. Esp. Zeigt sich dann und wann in Gesellschaft des Fuciformis.

91. Ses. Crabroniformis. W. V. An den Stämmen der Pappelbäume.

92. Ses. Asiliformis. Esper. Zeigt sich einzeln am Tage auf den Blüthen des Jasmins.

93. Ses. Spheciformis. Esp. Am Tage auf den Blüthen des Jasmins.

94. Ses. Muscaformis. Borckh.

95. Ses. Formicaeformis. Borckh.

96. Zigaena. Phegea. Sph. L. Einzeln auf verschiedenen Gewächsen.

97. Zig. Pruni. W. V. Auf Wiesen und Blumen.

98. Zig. Statices. L. Auf Blumen in Wiesen und Wäldern.

99. Zig. Globulariae. Hübner.

100. Bomb. Betulifolia. W. V.

101. Bomb. Turcula. L.
102. Bomb. Hebe. L.
103. Bomb. Dominula. Noct. L. Fliegt am Tage.
104. Bomb. V. Nigrum. Esper.
105. Bomb. Salicis. L. An den Stämmen und Zweigen der Weiden.
106. Bomb. Fascelina. L. Zeigt sich zu Anfange dieses Monats.
107. Bomb. Trepida. W. V.
108. Bomb. Grammica. W. V. In lichten Waldungen an den Grasstengeln.
109. Bomb. Lacertula. W. V. In jungen Birkenbüschen, fliegt am Tage.
110. Bomb. Falcula. W. V. In Birken- und Erlenbüschen.
111. Bomb Humuli. Fabr. Des Abends in freyem Fluge.
112. Bomb. Hera. Fabr. Ist sehr lebhaft am Tage, und zeigt sich öfters in zahlreicher Gesellschaft in schattigten Waldungen, auf dem Attig oder andern schirmtragenden Pflanzen.
113. Bomb. Matronula. Fabr. An Zäunen und Stämmen der Bäume.
114. Noct. Pulverulenta. Esp. Auf Eichenbäumen, fällt leicht durch Erschütterungen herunter.
115. Noct. Luctuosa. Esp. Bey Tage im Grase.
116. Noct. Paranimpha. L. An den Stämmen der Bäume.
117. Noct. Chrisitis. L. Zu Ende dieses Monats auf den wohlriechenden Blumen des Lavendels, Ysops, Thimians und Salbeys.
118. Noct. Argentea. Esper.
119. Noct. Gamma. L. Am Tage, besonders des Abends, auf Blumen, woraus sie den Saft im Fluge schwebend saugen.
120. Noct. Flavago. Esper.

121. Noct. Meticulosa. L. Zu Ende dieses Monats an den Wänden und Mauern.
122. Noct. Jota. Esp. Zeigt sich, obgleich selten, in Gesellschaft von Noct. Chrisitis.
123. Noct. Chi. Esp.
124. Noct. Absinthii. Esp. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
125. Noct. Verna. Esp.
126. Noct. Lagopus. Esp. In niedrigen Birkengebüschen.
127. Noct. Arabica. Esp.
128. Bomb. Vinula. An den Stämmen der Weiden.
129. Bomb. Erminea. Fabr. An den Stämmen der Espen und Weiden.
130. Bomb. Bucephala. L.
131. Bomb. Neustria. L.
132. Noct. Batis. L.
133. Noct. Augur. Esp.
134. Noct. Glyphica. L. Am Tage auf Blumen.
135. Noct. Janthina. W. V. Versteckt im Grase, auch unten an den Stämmen der Bäume.
136. Noct. Aceris. Esp.
137. Noct. Brieuspis. Esp. Des Abends auf Blumen.
138. Noct. Alchimista. Esp.
139. Noct. Leucophaea. W. V.
140. Noct. Praecox. Esp.
141. Noct. Runica. Esp.
142. Bomb. Mendica. L. An Zäunen.
143. Bomb. Jacobaea. L. Bey Tage im Fluge.
144. Bomb. Purpuraea. L. An Zäunen.
145. Bomb. Bicoloria. W. V. Auf Birkenbäumen, von welchen sie durch heftige Erschütterungen herunter fällt.

146. Bomb. Cossus. Fabr. An Weidenstämmen.
147. Bomb. Terebra. Esp.
148. Noct. Delphinii. L.
149. Noct. Tanaceti. Fabr.
150. Noct. Dissimilis. Knoch.
151. Noct. Segetum. Esp.
152. Noct. Derasa. L.
153. Noct. Choenopodii. Fabr.
154. Phal. Hastata. L. In Birkenbüschen.
155. Phal. Ligustrata. Hübner. In Gärten, an den Zäunen, Wänden und Bäumen.
156. Phal. Biundulata. Mihi. Im trocknen Erlenbruche.
157. Phal. Notatoria. L. In den niedrigen Gebüschen der großen Laubwaldungen.
158. Phal. Hepararia. Hübner. In Tannen- und Eichenwäldern.
159. Phal. Aerugaria. Hübner. Auf Eichen.
160. Phal. Luteata. Fabr. In Erlengebüschen.
161. Phal. Hirtaria. Hübner. An den Stämmen verschiedener Bäume in Laubwaldungen.
162. Phal. Bupleuraria. Fabr. Auf Wiesen und auf Aeckern unter dem Getreide.
163. Phal. Thymiaria. L. In Laubwaldungen im Grase.
164. Phal. Putataria. L. In Grasgärten und Laubwaldungen.
165. Phal. Linnenolata. W. V. Auf lichten Waldplätzen auf der Erde.
166. Phal. Artesiaria. Fabr. Auf grasreichen Plätzen in Wäldern.
167. Phal. Obliquaria. Borckh. In Wäldern wo Besenfriem wächst.

168. Phal. Palumbaria. W. V. Häufig in Wäldern.
199. Phal. Luridaria. Borckh. In Wäldern.
170. Phal. Purpuraria. L. Beynahe überall in allen Waldungen und Wiesen.
171. Phal. Pennaria. L. An den Stämmen verschiedener Bäume in Laubwaldungen.
172. Phal. Sambucaria. L. An Linden- Birn- Weiden- und Hollunder-Bäumen.
173. Phal. Crataegata. L. In Gärten und Schlehensträuchern.
174. Phal. Advenaria. Hübner. In Tannenhölzern auf freyen Plätzen in Wacholder und jungen Birkensträuchern.
175. Phal. Prunaria. L. In Birkengebüschen und Haselstauden.
176. Phal. Roboraria. Fabr. An Eichen und Buchenstämmen.
177. Phal. Consortaria. Fabr. In Laubwäldern.
178. Phal. Gemmaria. Borckh. In Obstgärten an Baumstämmen, Wänden und Bretterzäunen.
179. Phal. Selenaria. W. V. Auf grasreichen Plätzen.
180. Phal. Betularia. L. An den Stämmen der Weiden, Pappeln, Birken und Rüstern.
181. Phal. Pulveraria. L. In Waldwiesen und grasreichen Plätzen.
182. Phal. Punctaria. L. In Eichwäldern an den Stämmen und Zweigen derselben.
183. Phal. Obliterata. Borckh. In Erlengebüschen.
184. Phal. Impluviata. Borckh. An den Stämmen der Bäume in Wäldern.
185. Phal. Vibicaria. L. Auf Wiesen.
186. Phal. Ochreata. Fabr. Auf Waldwiesen.

187. Phal. Pallidata. W. V. Auf Waldwiesen.
188. Phal. Osseata. Fabr. Auf Wiesen und grasigten Waldplätzen.
189. Phal. Succenturiata. L. In Gärten an Zäunen, und Wänden.
190. Phal. Minutata. W. V. An Baumstämmen Bretterwänden und Zäunen.
191. Phal. Pygmeata. Borckh. In Gärten an Zäunen und Bretterwänden.
192. Phal. Scabiosata. Borckh.
193. Phal. Mensuraria. W. V. zu Ende dieses Monats häufig auf allen Grasplätzen in Wäldern, Gärten und Wiesen.
194. Phal. Plagiata. L In Gärten und freyen Anhöhen.
195. Phal. Caprearia. Borckh.
196. Phal. Rectangulata. L. In Gärten an Bretterwänden.
197. Phal. Psittacata. Fabr. An Baumstämmen in Obstgärten.
198. Phal. Linariata. Fabr. An Baumstämmen, Zäunen und Bretterwänden.
199. Phal. Ferrugata. L.
200. Phal. Spadicearia. W. V.
201. Phal. Galliata. W. V. In Gärten und Wäldern.
202. Phal. Bicolorata. Borckh. In Föhrenwäldern.
203. Phal. Montanata. W. V. In Föhrenwäldern.
204. Phal. Corylata. Borckh. In Wäldern an Eichenstämmen.
205. Phal. Russata. W. V. An Hägen und Zäunen.
206. Phal. Viridaria. Fabr. In Wäldern an Eichenstämmen.
207. Phal. Aestivaria. Borckh. In Birkenhölzern.

208. Phal.

208. Phal. Tristata. L. In Wäldern und Gärten an Zäunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
209. Phal. Rubiginata. Fabr. In Gärten und Erlengebüschen wo viele Nesseln stehn.
210. Phal. Albicillata. L.
211. Phal. Adustata. Fabr. An Zäunen und Bretterwänden.
212. Phal. Decorata. W. V. In Wäldern.
213. Phal. Ornata. Fabr. Im Grase.
214. Phal. Conspicuaria. Borckh. An Oertern wo viele Besenpfrieme (Spartium scoparium) steht.
215. Phal. Melanaria. L. In Laubwaldungen.
216. Phal. Chaerophyllata. L. Auf Wiesen.
217. Phal. Farinata. Borckh. In lichten Gehölzen und auf trocknen Grasplätzen.
218. Phal. Euphorbiata. Fabr. In Wäldern auf freyen Plätzen, wo viele Cypressen-Wolfsmilch steht.
219. Phal. Conjugata. Borckh. An Zäunen und Baumstämmen.
220. Phal. Vernaria. L. In Gärten und Wäldern.
221. Phal. Striataria. L. In lichten Laubwaldungen.
222. Phal. Micantharia. Esp. Zu Anfange dieses Monats in jungen Laubwaldungen.
223. Phal. Lactearia. Esp. Auf der untern Seite der Baumblätter in Laubwaldungen.
224. Piral. Tentaculalis. L. In Buschwäldern.
225. Piral. Pinguinalis. L. In alten Häusern.
226. Piral. Marginalis. W. V. Im Grase und an Baumstämmen.
227. Piral. Nimphaealis. W. V. An den Rändern der Wassergräben und stehenden Gewässern.

228. Piral. Straciotalis. W. V. In Gesellschaft der Nimphaealis.
229. Piral. Margaritalis. Fabr. Auf Plätzen wo viele Raute steht.
230. Piral. Palealis. W. V. Zwischen Aeckern im Grase.
231. Piral. Litteralis. Hübner. Auf freyen Grasplätzen, und den erhöhten Rändern der Graben.
232. Piral. Forficalis. Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
233. Piral. Emortualis. W. V. In freyen Wäldern und Gebüschen.
234. Piral. Salicalis. W. V. Auf Weidenauen.
235. Piral. Grisealis. W. V. In Buschwäldern.
236. Piral. Barbalis. L. Auf Wiesen.
237. Piral. Punicealis. W. V. Auf Grasplätzen.
238. Piral. Purpuralis. L. Auf Sonnenreichen Grasplätzen.
239. Piral. Cespitalis. Hübn. Häufig in Grasgegenden.
240. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft des vorigen.
241. Piral. Urticalis. Hübner. An Nesselreichen Stellen.
242. Piral. Verticalis. Hübner. In Waldungen an Nesselreichen Stellen.
243. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.
244. Tort. Querciana. W. V. An den Stämmen der Buchen.
245. Tort. Metallicana. W. V. An Buchenstämmen.
246. Tort. Ferrugana. Hübner. In Birkengebüschen.
247. Tin. Pratella. Hübner. Im Grase in Laubwaldungen.

July.

July.

1. Pap. Apollo. L. In verschiedenen Gegenden Deutschlands häufig.
2. Pap. Crataegi. L. In Obstgärten.
3. Pap. Prasicae L. In Kohlgärten.
4. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
5. Pap. Rapae. L. In Kohlgärten.
6. Pap. Maegaera. L. An Wegen und Mauern.
7. Pap. Galathea. L. Auf blumigten Wiesen.
8. Pap. Hermione. Herbst. Auf freyen Plätzen in Waldungen, wo er sich mit flach niedergebognen Flügeln an den Baumstämmen setzt.
9. Pap. Thitonius. Herbst. In großen Laubhölzern auf den niedern Gebüschen der Unterhölzer.
10. Pap. Panira. L. Auf Wiesen.
11. Pap. Cardui. L. Auf freyen Plätzen und feuchten Stellen der Wege.
12. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen an den feuchten Stellen der Wege.
13. Pap. Sybilla. W. V. In Wäldern auf blumenreichen Plätzen.
14. Pap. Paphia. L. Auf lichten Stellen in Waldungen wo Himbeersträucher stehn.
15. Pap. Aglaia. L. In lichten Waldungen auf Blumen.
16. Pap. Lathonia. L. Auf Wiesen und in Wäldern.
17. Pap. Euphrosine. Esp. Auf freyen Plätzen in Wäldern.
18. Pap. Niobe. L. Auf freyen blumenreichen Stellen in Wäldern.
19. Pap. Tiphon. Herbst. Auf Wiesen so nahe an Wäldern liegen.

Landesbibliothek Oldenburg

20. Pap. Arcanius. L. Auf Grasplätzen in lichten Waldungen.

21. Pap. Camilla. W. V. In der Gegend um Wien und in der Schweitz nicht selten.

22. Pap. Tindarus. Esp. In der Schweitz.

23. Pap. Castar. Esp. 24. Pap. Pollux. Esper. Ebenfalls in der Schweitz.

25. Pap. Arethusa. Esp. In Wäldern.

26. Pap. Clitie. Esp. Auf blumigten grasreichen Stellen in Wäldern.

27. Pap. Eudora. Esp. Einzeln auf Wiesen und Feldern so an Waldungen grenzen.

28. Pap. Cassioides. Esp. Auf den Wiesen der höchsten Alpen in Cärnten.

29. Pap. Melas. Herbst. Auf den höchsten Alpengebirge.

30. Pap. Machaon. L. Auf freyen Stellen in Wäldern.

31. Pap. Podalirius. L. An freyen und offenen Oertern.

32. Pap. Sinapis. L. In und an lichten Laubwäldern.

33. Pap. Hyale. Esp. Auf Waldwiesen.

34. Pap. Rhamni. In Gärten und Laubhölzern.

35. Pap. Dejanira. L. In Wäldern und Haiden.

36. Pap. Antiopa. L. Auf Wegen und an Plätzen wo viele Weiden stehen.

37. Pap. Iris. Esp. 38. Pap. Iris, luteus. Esp. 39. Pap. Iris rubescens. Herbst. 40. Pap. Ilia. W. V. 41. Pap. Jole. W. V. Auf freyen und feuchten sonnenreichen Plätzen in und an Waldungen.

42. Pap. C. album, L. In Gärten und auf Wegen.

43. Pap. Athalia. Esp. 44. Pap. Pilossellae. Esp. Zeigen sich gemeinschaftlich auf grasreichen Stellen in und an Waldungen.

45. Pap.

Landesbibliothek Oldenburg

45. Pap. Dictinna. Esper. Auf lichten Waldplätzen.
46. Pap. Davus. Herbst. Auf Wiesen.
47. Pap. Lucilla. W. V.
48. Hesp. Ilicis. Borckh. In Eichenwäldern, auf grasigten und blumenreichen Plätzen.
49. Hesp. Linceus. Borckh. Um Schlehenstauden.
50. Hesp. Quercus. L. In Eichenwäldern und Gärten.
51. Hesp. Tiresias. Esp. In Gärten und blumigten Anhöhen.
52. Hesp. Virgaurea. L. Auf hochliegenden Wiesen.
53. Hesp. Thetis. Esp. Auf blumigten Anhöhen.
54. Hesp. Amphion. Esp.
55. Hesp. Hipponoe. Esp. In bergigten Gegenden.
56. Hesp. Biton. Esp. Ebenfalls in bergigten Gegenden.
57. Hesp. Helle. W. V. In freyen Waldungen.
58. Hesp. Xanthe. Borckh. Auf Wiesen und in Waldungen.
59. Hesp. Alsus. Esper.
60. Hesp. Arion. Esp. In lichten Waldungen und Wiesen.
61. Hesp. Argus. Esp. An den Rändern der Waldungen, wie auch in Gärten und Wiesen.
62. Hesp. Argiolus. Esp. In Gesellschaft des vorigen.
63. Hesp. Hippothoe. L. Auf Waldwiesen.
64. Hesp. Thaumas. Borckh. Zeigt sich in Gesellschaft des comma.
65. Hesp. Comma. L. In lichten Waldungen.
66. Hesp. Actaeon. Borckh.
67. Hesp. Semicolon. n. Sp. In lichten Waldungen.
68. Hesp. Amphidamas. Borckh.

69. Hesp.

Landesbibliothek Oldenburg

69. Hesp. Sylvanus. Esp. In und an lichten Waldungen.
70. Hesp. Melicerta. Borckh. In lichten Wäldern.
71. Hesp. Paniscus. Borckh. In freyen Wäldern.
72. Hesp. Fritillarius. Borckh. Auf Wiesen, Wegen und in Wäldern.
73. Hesp. Altheae. Borckh. Auf Wiesen und in lichten Wäldern.
74. Hesp. Tages. Esp. In lichten Waldplätzen.
75. Sph. Fenestrina. W. V. Auf Wiesen, fliegt am Tage in heißer Sonne.
76. Sph. Pinastri. L. Unten an den Stämmen der Fichtenbäume.
77. Ses. Muscaformis. Borckh.
78. Ses. Formicaeformis. Borckh.
79. Ses. Tipuliformis. L. Auf den Blättern der Johannissträucher.
80. Ses. Vespiformis. Esp. Zur Mittagszeit auf den Blüten der Bäume.
81. Ses. Culiciformis. L. Am Tage auf den Blüten der Bäume.
82. Ses. Oestriformis. Esp. Auf Blumen in Wiesen.
83. Ses. Spheciformis. Esp. Auf den Blüten des Jasmins.
84. Ses. Asiliformis. Esp. Ebenfalls doch nur einzeln am Tage auf den Blüten des Jasmins.
85. Zig. Loti. W. V. Auf freyen Stellen, an Waldungen.
86. Zig. Scabiose. Esp.
87. Zig. Pilosellae. Esp.
88. Zig. Lonicerae. Espr. Auf freyen Stellen in Waldungen, auf Distelnblumen.
89. Zig. Meliloti. Esp.

Landesbibliothek Oldenburg

90. Zig. Exulans. Esper. Auf den höchsten Schneegebirgen.
91. Zig. Statices. L. Auf Blumen in Wiesen und Wäldern.
92. Bomb. Flexula. W. V. In Eichenwäldern.
93. Bomb. Potatoria. L. Das Männchen zeigt sich oft am Tage.
94. Bomb. Quercus et var. L. Im Grase versteckt. Das Männchen zeigt sich am Tage im Fluge.
95. Bomb. Furcula. L.
96. Bomb. Castrensis. L. Gegen Mitte dieses Monats.
97. Bomb. Pythiocampa. Fabr. In Fichten und Föhrenwäldern.
98. Bomb. Caia. L. In Gärten an den Zäunen und Hecken.
99. Bomb. Maculosa. Esp.
100. Bomb. Villica. L. Zeigt sich, obgleich selten, am Tage im Fluge.
101. Bomb. Mendica. L. An Zäunen.
102. Bomb. Pulla. Esp. Im Grase auf Wiesen.
103. Bomb. Dromedarius. L. An den Stämmen der Weidenbäume.
104. Bomb. Purpurea. L. Sehr versteckt an Zäunen und an andern verborgnen Oertern.
105. Bomb. Russula. L. Im Grase.
106. Bomb. Graminis. Esp. Bey Tage im Grase.
107. Bomb. Grammica. W. V. In lichten Waldungen an den Grasstengeln.
108. Bomb. Cuculla. Esp.
109. Bomb. Rosea. Esp. Auf den Blättern der Eichen.

110. Bomb. Flavia. Esp.

111. Bomb. Cucullatella. Esp.

112. Bomb. Dominula. Fabr. Bey Tage auf den Blumen der Disteln.

113. Bomb. Jacobaee. Fabr. Auf den Blüten der Jakobsblumen.

114. Bomb. Rubricollis. Fabr. In Wäldern und Kornfeldern, an Grasstengeln.

115. Bomb. Lacertula. W. V. In jungen Birkengebüschen.

116. Bomb. Hera. Fabr. Am Tage sehr lebhaft, und zeigt sich oft zahlreich in schattigten Wäldern, auf den Attig, oder andern schirmtragenden Pflanzen.

117. Bomb. Plantaginis. Fabr. In Wäldern im Grase.

118. Bomb. Velitaris. Esp.

119. Noct. Lusoria. Esp. Fliegt am Tage in Waldungen.

120. Noct. Oo. Esp.

121. Noct. Sponsa. L. An den Stämmen der Espen, Weiden und Buchen.

122. Noct. Promissa. Esp. An den Eichenstämmen.

123. Noct. Nupta. L. Zeigt sich oft in unsern Zimmern, wo sie in ruhiger Lage an den Wänden sitzt.

124. Noct. Paranimpha. L.

125. Noct. Pacta. Esp. An den Stämmen der Bäume.

126. Noct. Maura. L. In den schattigten Gebüschen der Erlen, wo gemeiniglich die Bäche damit bewachsen sind.

127.

127. Noct. Leucomelas. Esp.
128. Noct. Nigricans. Esp. An Fichtenwäldern.
129. Noct. Pinastri. L. In Fichtenwäldern an den Stämmen der Bäume.
130. Noct. Gamma. L. Am Tage im Fluge auf Blumen.
131. Noct. Turca. Esp.
132. Noct. Tridens. Esp.
133. Noct. Linariae. Esp. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
134. Noct. Trigrammica. Esp. An den Stämmen und Zweigen der Eichen, wo sie leicht durch Erschütterung herunter fällt. Sie fliegt auch am Tage, doch mehr des Abends auf wohlriechende Blumen.
135. Noct. Strigula. W. V. An den Stämmen der Bäume.
136. Noct. Glyphica. L. Am Tage auf Blumen.
137. Noct. Meticulosa. L. An den Mauern und Gartenzäunen.
138. Noct. Plecta. L.
139. Noct. Psi. L. An Mauern und den Stämmen der Roßkastanien.
140. Noct. Argentea. Esp.
141. Noct. Diffinis. L.
142. Phal. Aestivaria. Hübner. Auf Waldwiesen.
143. Phal. Bupleuraria. Fabr. Auf Wiesen und Aeckern unter dem Getraide.
144. Phal. Viridata. L. Auf grasreichen Plätzen in Wäldern.
145. Phal. Lineolata. W. V. Auf der Erde in lichten Waldplätzen.

146.

146. Phal. Palumbaria. W. V. Auf der Erde in Wäldern.
147. Phal. Virgaria. Borckh. Auf grasigten Waldplätzen.
148. Phal. Aureolaria. Fabr. Auf Wiesen.
149. Phal. Angularia. W. V. In Laubwäldern.
150. Phal. Erosaria. W. V. In Eichenwäldern.
151. Phal. Quercinaria. Borckh. In Laubwaldungen.
152. Phal. Lunaria. W. V. An den Stämmen der Obstbäume und Laubwälder, auch an den nahgelegnen Zäunen und Bretterwänden.
153. Phal. Notataria. W. V. In Erlengebüschen.
154. Phal. Flavicaria. W. V.
155. Phal. Apiciaria. W. V. In Wäldern.
156. Phal. Consobrinaria. Borckh. An Italienschen Pappeln.
157. Phal. Piundularia. Borckh. An den Stämmen verschiedener Bäume.
158. Phal. Ononaria. Borckh. In Gegenden wo Hauhechel steht.
159. Phal. Atomaria. L. In Waldungen, im Grase und niedern Gebüschen.
160. Phal. Glarearia. Borckh. In Gesellschaft der Atomaria.
161. Phal. Dentilinearia. Borckh. In lichten Laubhölzern.
162. Phal. Immorata. L. Auf Waldwiesen und grasigten Plätzen.
163. Phal. Liturata. L. Auf jungen Föhrenstämmen.
164. Phal. Pusaria. L. In lichten Buschwäldern.

165.

165. Phal. Exanthemaria. Borckh. In Gesellschaft der Pusaria.
166. Phal. Dubitata. L. In Gärten an Bretterwänden.
167. Phal. Rhamnata. Borckh. An Hägen und in Laubwaldungen.
168. Phal. Consignata. Borckh. In Gärten an Zäunen und Bretterwänden.
169. Phal. Undulata L. In Birken- Erlen- Saalweiden- und Espengebüschen.
170. Phal. Rubricata. Fabr. In Grasgärten und andern grasigten Plätzen.
171. Phal. Badiata. W. V. In Laubgebüschen.
172. Phal. Plagiata. L. In Gärten und grasigten Anhöhen.
173. Phal. Rectangulata. L. In Gärten an den Bretterwänden.
174. Phal. Psittacata. Fabr. An Baumstämmen.
175. Phal. Olivata. Borckh. An Birkenstämmen.
176. Phal. Chenopodiata. L.
177. Phal. Fulvata. W. V.
178. Phal. Associata. Borckh. In Gärten an Baumstämmen.
179. Phal. Ocellata. L. In Gärten und Gebüschen.
180. Phal. Prunata. L. In Gärten an Bretterwänden und an den Stämmen der Obstbäume.
181. Phal. Rubidata. Borckh. In Gärten an Bretterwänden.
182. Phal Adaequata. Borckh. In Gärten.
183. Phal. Cucullata. Borckh. In Erlengebüschen.
184. Phal. Decorata. W. V. In Wäldern.
185. Phal. Ornata. Fabr. Im Grase in Gärten und lichten Wäldern.

186. Phal. Aurorária. Borckh. In Wäldern.
187. Phal. Farinata. Borckh. In lichten Gehölzen, und trocknen Grasplätzen.
188. Phal. Dealbata. L. In grasreichen Wäldern im Grase.
189. Phal. Temerata. W. V. In Wäldern.
190. Phal. Aversata. L. Auf Waldwiesen.
191. Phal. Remutata. L. In Gärten und Wäldern.
192. Phal. Immutata. L. In Wiesen.
193. Phal. Sylvestrata. Borckh. Im Grase auf Waldwiesen und trocknen Waldplätzen.
194. Phal. Virgulata. W. V. In Wäldern.
195. Phal. Nemorata. Borckh. In Wäldern.
196. Phal. Moniliata. Fabr. In Gärten an Zäunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
197. Phal. Scutulata. Fabr. In Gärten.
198. Phal. Bisetata. Borckh. In Waldwiesen.
199. Piral. Rostralis. L. In Gehägen mit Hopfen verwachsen nicht selten.
200. Piral. Crassalis. Fabr. In Gärten wo viele Brennesseln stehen.
201. Piral. Proboscitalis. L. Ebenfalls in Nesselreichen Gegenden.
202. Piral. Pinguinalis. L. In alten Häusern.
203. Piral. Atralis. Hübner. Bey Städten und auf den Straßen.
204. Piral. Porvicalis. W. V.
205. Piral. Punicealis. W. V. Auf grasreichen Plätzen.
206. Piral. Purpuralis. L. Auf sonnenreichen Grasplätzen.
207. Piral. Cespitalis. Hübner. Häufig in Wäldern.

208. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft der Cespitalis.
209. Piral. Farinalis. L. In Gebäuden.
210. Piral. Lemnalis. W. V. An stehenden Gewässern.
211. Piral. Nivealis. W. V. In Gesellschaft der Lemnalis.
212. Piral. Nimphaealis. W. V. Gleichfalls an stehenden Gewässern.
213. Piral. Sambucalis. W. V. In Gegenden wo viele Hollundersträuche stehen.
214. Piral. Glabralis. Hübner. Auf Auen.
215. Piral. Verticalis. Hübner. In Nesselreichen Gegenden.
216. Piral. Verbascalis. W. V. In Wäldern.
217. Piral. Limbalis. W. V. Ebenfalls in Wäldern.
218. Piral. Forficalis Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
219. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

August.

1. Pap. Hyale. Esp. Auf Anhöhen und freyen grasigten Gegenden.
2. Pap. Phoedra. Herbst. Auf Wiesen und in Waldungen.
3. Pap. Semele. L. Einzeln auf unangebauten Gegenden und steinigten Oertern, welche kahl sind, und etwas erhaben liegen.
4. Pap. Atalanta. L. Zeigt sich in diesem Monate am häufigsten.

5. Pap.

5. Pap. Prorsa. L. Auf Waldwiesen und lichten Stellen in Wäldern.
6. Pap. Dia minor. L. Auf freyen Anhöhen.
7. Pap. Aethiops. Esp. In lichten Waldungen.
8. Pap. Briseis. Borckh. Auf dürren steinigten Anhöhen.
9. Pap. Statilinus. Herbst. Auf hohen steinigten dürren Gegenden, die mit Tannenbüschen eingeschlossen sind.
10. Pap. Zanthe. Borckh. Auf steinigten und felsigten Gegenden.
11. Pap. Daedale. Borckh. Auf felsigten und blumenlosen Anhöhen.
12. Pap. Epiphron. Herbst. In Tannenwaldungen, auf offenen sonnenreichen Plätzen.
13. Pap. Pamphilus. L. Auf Wiesen im Walde, und auf Wegen.
14. Pap. Jasius. Esp. In der Gegend um Nizza nicht selten.
15. Pap. Ligea. Herbst. Gegen Ende dieses Monats auf blumigten Stellen in Waldungen.
16. Pap. Medusa. Herbst. Auf Waldwiesen.
17. Pap. Machaon. L. Auf freyen Waldstellen.
18. Pap. Podalirius. L. Gleichfalls auf freyen Plätzen in Wäldern.
19. Pap. Apollo. L. Auf Waldwiesen.
20. Pap. Brassicae. L. In Kohlgärten.
21. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
22. Pap. Sinapis. L. In lichten Laubwaldungen.
23. Pap. Rhamni. L. In Gärten, Laubwaldungen und Wiesen.
24. Pap. Jo. L. In Nesselreichen Gegenden.

25.

Landesbibliothek Oldenburg

25. Pap. Maegaera. L. Auf Wegen und an Mauern.
26. Pap. Galathea. L. Auf blumenreichen Wiesen.
27. Pap. Hermione. Herbst. Auf freyen Waldstellen, an Baumstämmen der Fichten und anderer Bäume.
28 Pap. Janira. L. Auf Wiesen.
29. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen, an den feuchten Stellen der Wege.
30. Pap. Levana. L. In und an den Rändern der Laubwaldungen.
31. Pap. Dia major. Esper. In der Schweitz.
32. Pap. Aglaia. L. In lichten Waldungen auf Blumen.
33. Pap. Lathonia. L. In Wäldern und auf Wiesen und blumigen Anhöhen.
34. Pap. Athalia. Esper. 35. Pap. Pilosellae. Esp. Gemeinschaftlich auf freyen Grasplätzen in und an Waldungen.
36. Hesp. Betulae. L. In Gärten und Gebüschen.
37. Hesp. Ilicis. Esp. In Eichenwäldern.
38. Hesp. Helle. Borckh. In freyen Waldungen.
39. Hesp. Xanthe. Borckh. Auf Wiesen und in freyen Waldungen.
40. Hesp. Coridon. Esp. Auf freyen Anhöhen.
41. Sph. Atropos. L. Des Abends auf den Blüthen des Jasmins und Caprifolii.
42. Sph. Stellatarum. L. Bey Tage auf den Blumen in Gärten und Wiesen.
43. Zig. Filupendulae. L. Bey Tage häufig auf den Blüthen der Disteln.
44. Zig. Achillae. Esp. Auf Wiesen und in lichten Waldungen.

45. Zig. Fausta. L.
46. Zig. Aeacus. W. V. Auf bergigten blumenreichen Anhöhen.
47. Zig. Statices. L. Am Tage auf den Blumen der Wiesen.
48. Bomb. Processionea. L.
49. Bomb. Chrisorhoea. Esp. An den Stämmen und Zweigen der Weiden.
50. Bomb. Vestita. Esp. Am Tage im Grase.
51. Bomb. Detrita. Esp. Ebenfalls im Grase.
52. Bomb. Aesculi. Fabr. An den Stämmen der Roßkastanien.
53. Bomb. Ancilla. Fabr. Am Tage auf Blumen, insonders der Camillen und den Blättern des Spindelbaums.
54. Bomb. Quadra. Fabr. An Baumstämmen, Zäunen und Mauern.
55. Bomb. Complana. Fabr. An den Stämmen der Bäume.
56. Bomb. Deplana. Fabr. In Gesellschaft der vorigen.
57. Bomb. Eborinea. Noct. Esp. In Waldungen an den Stengeln der Grashalmen.
58. Bomb. Unita. Noct Esp. Ebenfalls in Waldungen.
59. Bomb. Irrorea. Noct. Esp. Im Grase und an Baumstämmen.
60. Bomb. Roscida. Noct. Esp.
61. Bomb. Pythiocampa. Fabr. In Fichten und Föhrenwäldern.
62. Bomb. Fuliginosa. Noct. L. An Mauern und Gartenzäunen.

63. Noct.

63. Noct. Lusoria. Esp. Am Tage in Waldungen.
64. Noct. Glyphica. L. Auf Wiesen am Tage, wo sie die Blumen besaugt.
65. Noct. Fraxini. L. An den Stämmen der Espen und Pappeln.
66. Noct. Elocata. Esp. An den Stämmen verschiedener Bäume.
67. Noct. Circumflexa. Esp. Des Abends auf Isop, Thimian und Lavendel.
68. Noct. Festucae. Esp. Auf wohlriechenden Blumen. Auch bey Tage auf den Disteln.
69. Noct. Aurioma. Esp.
70. Noct. Rhizolitha. Esp. Am Tage an den Stämmen der Bäume. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
71. Noct. Meticulosa. L. An Wänden und Mauern.
72. Noct. Tridens. Esp.
73. Noct. Linariae. Esp. Des Abends auf wohlriechenden Blumen.
74. Noct. Strigula. W. V. An Baumstämmen.
75. Noct. Unigutta. Esp.
76. Noct. Brassicae. Esp.
77. Phal. Artesiaria. Fabr. Auf grasreichen Stellen in Wäldern.
78. Phal. Vittata. Borckh. Auf Waldwiesen.
79. Phal. Aureolaria. Fabr. Im Grase in Wäldern.
80. Phal. Purpuraria. L. Auf Wiesen und in Wäldern.
81. Phal. Angularia. W. V.
82. Phal. Erosaria. W. V. In Eichwäldern.
83. Phal. Quercinaria. Borckh. In Laubwaldungen.

84. Phal. Sieringaria. L. In Gegenden wo viel Spanischer Flieder und Jasmin steht.
85. Phal. Notatoria. L. In Erlen und Weidengebüschen.
86. Phal. Repandaria. W. V. In Buchenwäldern und Pappelngebüschen.
87. Phal. Jacobaearia. Borckh. In lichten Gehölzen.
88. Phal. Omicronaria. W. V. An Baumstämmen.
89. Phal. Pusaria. L. In Wäldern.
90. Phal. Exanthemaria. W. V. In Laubwäldern.
91. Phal. Carbonaria. L. Im Grase und an Mauern.
92. Phal. Ochreata. W. V. In Wiesen und Büschen.
93. Phal. Moeniaria. Fabr. In Nadelwäldern.
94. Phal. Choenopodiata. Fabr.
95. Phal. Ferrugaria. W. V.
96. Phal. Ocellata. L.
97. Phal. Galliata. W. V. In Gärten und Wäldern.
98. Phal. Montanata. W. V. In Gärten und Föhrenwäldern.
99. Phal. Populata. L. In Gebüschen.
100. Phal. Russata. W. V. In Gärten und an Zäunen.
101. Phal. Prunata. L. In Gärten an Bretterwänden und Zäunen.
102. Phal. Adustata. Fabr. An Hägen, Zäunen und Bretterwänden.
103. Phal. Marginata. L. In allerley niedrigen Gebüschen.

104. Phal. Chaerophillata. L. Auf Wiesen.
105. Phal. Trilinearia. Borckh. In Gärten und Wäldern.
106. Phal. Vibicaria. Fabr. Im Grase auf Wiesen.
107. Phal. Immutata. L. Auf Wiesen.
108. Phal. Conjugata. Borckh. In Gärten und an Baumstämmen.
109. Piral. Rostralis. L. In Gehägen mit Hopfen verwachsen.
110. Piral. Pinguinalis. L. In alten Häusern.
111. Piral. Punicealis. W. V. Auf grasreichen Plätzen.
112. Piral. Purpuralis. L. Auf sonnenreichen Grasplätzen.
113. Piral. Sanguinalis. Hübner. Auf Wiesen und Weiden.
114. Piral. Cespitalis. Hübner. In Grasgegenden.
115. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft der vorigen.
116. Piral. Nemoralis. W. V. In Buschwäldern besonders in der Ukraine häufig.
117. Piral. Nimphaealis. W. V. An stehenden Gewässern.
118. Piral. Glabralis. Hübner. Auf Auen.
119. Piral. Hyalinalis. Hübner. In Wäldern.
120. Piral. Leucophaealis. Hübner. Auf Weidenauen.
121. Piral. Forficalis. Hübner. Auf lichten Waldplätzen im Grase.
122. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

September.

1. Pap. Machaon. L. 2. Pap. Podalirius. L. Auf freyen Waldstellen.
3. Pap. Brassicae. L. In Kohlgärten.
4. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
5. Pap. Daplidice. L. Auf freyen Feldern.
6. Pap. Jo. L. In nesselreichen Gegenden.
7. Pap. Semele. L. Einzeln auf unangebauten Oertern und steinigten Gegenden.
8. Pap. Atalanta. L. In nesselreichen Gegenden.
9. Pap. Ligea. Herbst. Auf Waldwiesen.
10. Hesp. Betulae. L. In Gärten und Gebüschen.
11. Hesp. Pruni. L. In Obstgärten.
12. Hesp. Phlaeas. L. Auf sonnenreichen Anhöhen und Wiesen.
13. Hesp. Coridon. L. Auf bergigten Anhöhen.
14. Hesp. Poliphemus. Esp. In Gesellschaft der Phlaeas.
15. Sph. Convolvuli. L. Des Abends auf der Jalappa.
16. Sph. Stellatarum. L. Auf Wiesen.
17. Zig. Lonicaerae. Esp.
18. Zig. Filupendulae. L.
19. Zig. Pilosellae. Esp.
20. Bomb. Populi. L. An Lindenstämmen.
21. Bomb. Crataegi. Esp.
22. Bomb. Libatrix. An Gartenzäunen.
23. Noct. Lolii. Fabr. An Mauern.
24. Noct. Exclamationis. Esp.
25. Noct. Gylphica. L. Auf Wiesen.

26. Noct.

Landesbibliothek Oldenburg

26. Noct. Argiritis. Esp. Des Abends auf Blumen.
27. Noct. Festucae. Esper. Am Tage und des Abends auf Blumen.
28. Noct. Chi. Esp. Auf Blumen, und an den Wänden der Häuser.
29. Noct, Runica W. V. An Baumstämmen.
30. Noct. Catenata. Esp.
31. Phal. Quercinaria. Borckh. In Laubwaldungen.
32. Phal. Jacobaearia. Borckh. In lichten Gehölzen.
33. Phal. Prunata. In Gärten an Baumstämmen und Bretterwänden.
34. Phal. Miaria. W. V.
35. Phal. Juniperata. L. In Wacholdersträuchern.
36. Piral. Rostralis. L.
37. Piral. Punicealis. Auf Grasplätzen.
38. Piral. Purpuralis. Ebenfalls im Grase.
39. Piral. Sanguinalis. Auf Wiesen und Weiden.
40. Piral. Hybridalis. Im Grase.

October.

1. Noct. Gamma. L.
2. Phal. Defoliaria. L. In Laubwäldern.
3. Phal. Murinaria. Fabr.
4. Phal. Sericearia. Borckh. An Baumstämmen.
5. Phal. Dilutata. W. V. In Eichenwäldern.
6. Phal. Impluviata. W. V. An Baumstämmen.

7. Phal. Autumnata. Borckh. In Birkenwäldern.
8. Phal. Brumata. L. In Gärten.

November.

1. Phal. Defoliaria. L. In Laubwäldern.
2. Phal. Dilutata. W. V. In Eichenwäldern.
3. Phal. Brumata. L. In Gärten.

Landesbibliothek Oldenburg

Abbreviaturen.

Pap.	Papilio.
Hesp.	Hesperia.
Sph.	Sphinx.
Ses.	Sesia.
Zig.	Zigaena.
Bomb.	Bombix.
Noct.	Noctua.
Phal.	Phalaena.
Piral.	Piralides.
Tort.	Tortrices.
Tin.	Tinei.
L.	Linnéi.
Fabr.	Fabrizius.
W. V.	Wiener Verzeichniß.
Borckh.	Borckhausen.

* Bedeutet, daß die Raupe sich in dem Monate verpuppet.

o Bedeutet, daß die Raupe in dem Monat aus dem Ey gekrochen ist.

Landesbibliothek Oldenburg