

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Historia Natvralis Brasiliae

Piso, Willem

Lugduni Batavorum, 1648

Liber Qvartvs. Qui agit de Piscibus Brasiliae.

[urn:nbn:de:gbv:45:1-838183](#)




GEORGI MARCGRAVI
RERVM NATVRALIVM
HISTORIAE
LIBER QVARTVS.
Qui agit de Piscibus Brasiliæ.

CAPVT. PRIMVM.

Guamajacu apé species utraque. Guacucujā.

VAMAIACV APE Brasiliensibus: Piscis triangularis; duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudæ septem digitos est longus, (interdum & longior) à ventre ad dorsi summitatem tres digitos latus seu altus: venter vix duos digitos latitudine compleat: cauda unum digitum lata, desinens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. Os ipsi parvulum & pisi tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. Caput ab ore ad cornua usque in gibbum assurgit, convexitate sesquidigitum; dorsum au-



tem ad eundem modum in gibbum arcuatur: & unicam tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. Oculos habet satis amplos, diametro trientis, superne in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigitum intervallum: & ante singulos oculos foraminulum unum. Pinnas in universum obtinet quinque, unam in extremitate dorso, ut jam dixi, & in quolibet latere unam, longe infra oculos versus posticam corporis partem paulum vergentes, unum digitum longas; & prope utramque rimam, unam plus sesquidigitum longam, branchiarum loco: unam denique pinnam inferius in ventris extremitate prope exortum caudæ, unum pene digitum longam, dimidium latam: quinta facit caudam. Cornua duo directe ante se protensa in fronte gerit prope oculos, magnitudine calcaris galli galinacei; duo itidem æqualis magnitudinis in infimo ventre versus quartam pinnam. Caret squamis, sed tegitur densa cute, in ventre quidem alba, reliquo autem corpore fusca, atque in ventre & lateribus usque ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetragonis, pentagonis, hexagonisque mire distincta & notata. Vbiique autem (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus est insignita.

Guamajacu ape sine cornibus in fronte, paulo minor est antecedente, sed latiore ventre & cauda paulo longiore; & est per totum corpus sexangularibus figuris insignitus, cum innumeris

meris tuberculis minimis. Color ventris subflavus, reliquo corpore ex flavo cinereus & subfuscus. Non longe ab Insula Margarita captus à nautis nostris piscis ingens, quem vocant **Jacob Evertzen** in cuius ventriculo Guamajacu adhuc inreger fuit inventus. Piscis autem illius caro cocta & à viginti hominibus comepta fuit, qui omnes statim post manductionem male se habuerunt, & vix post multos dies sumtis alexipharmacis convaluerunt: aestima hinc malignam qualitatem guamajacu piscis.

Alium talem accepi, cuius longitudine erat pedalis, altitudo quatuor ditorum, cuius totum corpus tectum erat testa meris figuris sexangularibus constante, fragili in recenti pisce, & quæ pisce Soli exposito in hexagona corpora dissoluebatur. Os angustum, denticuli oblongi latentes, inferius quinque, superius undecim. Oculi ampli, rotundi, magnitudine grossi misnici, pupilla crystallina, cætera coloris umbra cum argenteo mixti. Cauda duos & semi-digitos longa, teres extra testam prodens, molli cute vestita, habens pinnam duos digitos longam & totidem latam, quasi quadratam, sed in lateribus lunatam. Pinna ut in aliis hujus speciei. Totus erat coloris albicantis cum gryseo mixti. Quodlibet latus versus posterior desinebat in pinnam.


Caret fere carne ac cavus est, solam spinam secundum longitudinem habens, cui per membranas intestina adhaerent. In ventriculo multum inveni arenæ.

ANNOTATIO. Agit de hoc pisce Aldrovandus lib. de piscibus I v. cap. ult. & dat duas illius Icones. Observavi autem (nam multi ejusmodi pisces siccati, utriusque speciei, ad nos è Brasilia & America afferuntur) figuræ quibus cutis insignitur plurimum inter se differre, & in quibusdam se habere instar tessulati pavimenti.

GVACCVIA Brasiliensis: Monoceros piscis: Vespertilio Aquaticus posset appellari. Corporis figura anterius est instar vomeris: corpus octo digitos longum, quinque latum in

medio, ubi latissimum: medietas autem corporis posterior rotunda est & versus caudæ pinnam fastigiatur in conum: medietas autem anterior vomeris seu lati cordis figurâ obtinet. Pisces autem non crassus, sed latus; caput vix prominet scorsum à corpore, est que illi inter oculos supra os cornu im-

positum, durum, duos pene digitos longum, conicum. Oculos habet nummi misnici magnitudine, pupilla crystallina lenticulari, reliqua pars variegata maculis & lineis flavis albisque. Oris hiatus castaneam potest capere, ipsum edentulum est. Supra os carnea prominentia est instar tonsillæ humanæ fere. In utroque latere in medio piscis, brachium eminet, quatuor digitos longum, una junctura constans; inferior medietas brachii duos digitos longa, plus uno lata, exterior pinna duos digitos longa est, unum lata in infimo ventre inter brachia duas habet pinnas sesquidigitum longas, quæ quasi pedes sunt. Cauda constat pinna duos digitos longa, sesquidigitum lata, ac fere quadrata. In inferiori corpore, sesquidigitum interstitio à cauda etiam pinnulam habet parvam & talem etiam in dorso, trium digitorum intervallo à cauda. Cuta tegitur, non squamis, quæ superius fusca est, multis tuberculis duris, per dorsum insignita versus anticam partem, & utrumque latus. In utroque autem latere undecim nigras habet maculas lentis magnitudine & figurâ, binas ac binas juxta se positas. Prope insertionem utriusque branchii etiam multas ejusmodi maculas nigras habet & ibidem in quolibet latere foramen parvum in corpus. In summa, in lateribus, circa oculos, in extremis branchiis, mire variegatur punctulis albis, nigris, lineisque itidem albis & nigris, ut vix exprimi possit à pictore. In toto autem inferiori corpore egregiū miniati est coloris, atque ibi cutis æqualis, verum ad tactum paulum hispida.



C A P . II.


Tajasica. Paru. Pira acangata. Acarauna. Guaperva. Piranema. Acarapucu.

TAIASICA Brasiliensibus. Piscis octo aut novem digitos longus, corpore obterete & pyramidalis, extenuatur enim versus caudam. Caput est illi grossiusculum & compressum: oculi eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habet pinnas; nimurum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam breviorem: unam in medio dorso aliam longiorem versus postremam dorsi partem, & è regione hujus unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre, quæ ex pallido subflavescunt. Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus, ideoque capitur pedibus, eos ponendo super arenam ubi latet. Coctus atque assus bene sapit & convenient cum Hollandorum Post / est enim carne albissima & friabili.

P A R U Brasiliensibus: Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa ac totidem lata: latitudo piscis septem digitorum. Pinnas obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos; unam in dorso, alteram in ventre, quæ utrobique ad caudam extenduntur; habentque quævis pinna in fine prominentiam instar funiculi, ea videlicet quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet laterе etiam pinna est duos digitos longa, unum lata; & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. Capite est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris: oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidius numerus niger est, dimidius autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videatur. Circa branchias flavedo est & in initio pinnatum, post aures macula flava in quilibet. Piscis est edulis.

P I R A A C A N G A T A Brasiliensibus, id est, piscis duro capite: Percæ mediae seu **Harders** magnitudine, septem aut octo digitos longus, ore haud amplio, oculis nigris, circello nigricante auro & ruffo colore mixto. Pinnas habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas in infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorsi longitudinem usque ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet. Pinna dorsi argentea transplendens & maculis fuscis insignita. Pinnæ laterales albæ, quæ in ventre cærulescentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulescit. Est edulis.

A C A R A U N A Brasiliensibus. Piscis magnitudine exæquat Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pone utramque branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pinnam utrobique extensem, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os par-



Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. Oculi haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lacerare: quilibet aculeus fere digitum longus ossè piscino constans.

Piscis est edulis.



G V A P E R V A Brasiliensibus. Piscis corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Os parvulum, denticulis minimis. Pinnas habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, que in acumen desinunt, fimbriæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digitum lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum ora (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnæ sunt nigrae. Circa os linea crassa purpurea est coloris, & illi perpendiculariter altera supposita. Corpus tres lineæ latæ ambient, quarum duæ per latus & posticas pinnas extenduntur. Caudam

etiam talis secat linea & ejusdem coloris; una pro fimbria ipsi est oculorum pupillanigra, circulo aureo.

P I R A N E M A Brasiliensibus: piscis mediocris carpionis seu percæ magnitudine; novem, decem aut undecim digitos longus; latus, ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius. Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimum prominentiis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo albo splendente, qui superius ad dimidiā partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnæ digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudâ exortum usque pinna protendit tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per universum dorsum ab occipitis fine ad exordium caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulo plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protendit sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plus quam sesquidigitum longam. Color totius piscis est argenteus laccatus laca florentiva. Squamulas habet minutillas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenteo minus laccæ intermixtum cernitur.

Capit in mari & boni est saporis, edulis.

A C A R A P V C V Brasiliensibus, fluvialibus piscis, in sesquipedalem longitudinem excrescit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum. Os acuminatum circiter duos digitos longum, haud amplum labia abscondere & contrahere potest ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. Oculi magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. Pinnas habet septem: unam pro dorsi longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: postbranchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendet squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculæ cœruleæ rufescentes, non ita conspicuæ. Pinna dorsi & cauda dilute cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flaveſcent paulum, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

C A P. III.

*Pudiano vermelho. Pudiano verde. Furuncapeba. Jaguaruca.
Carauna. Cururuca. Guaibiaya.*




P V D I A N O vermelho vulgo, sed rectius Bodiano: Brasiliensibus *Aipimixira* & *tetimixira*. Piscis mediocris Perca magnitudine. Latitudo corporis, ubi maxima, duorum digitorum,
T prope

prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere aequalis latitudo est. Caput parvum, os acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. Oculos habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. Pinnas habet septem: nimurum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam, duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item talem in dorso, tres & semis digitos longam: & septimam pro cauda, qua est quadrata, digitum longa & lata. Tegitur pescis squamis subtilibus, ita arcte complicatis, ut ad tactum glaber esse videatur. Color totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas autem capitidis & totum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorsalis pinnae purpurei est coloris egregii cum lacca mixti: extrema ora pinnae majoris in ventre versus caudam etiam purpurascit ut & pinnae illi junctae totaliter: reliquæ pinnae flavæ cum aureo colore mixtae, ut & totum reliquum corpus. Pars ultima pinnae majoris in dorso etiam flava ut & cauda. Pescis est edulis.

PUDIANO VERDE Lusitan. Pescis oblongus, nimurum decem digitos ab oris extremo ad caudæ initium; corpus tres digitos latum, circa caudam autem sesqui. Os acuminatum, haud amplum, anterius in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos, & seriem denticulorum minimorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minutorum candidorum. Oculos habet parvos, pupilla nigricante, circello primum aureo, dein exterius albescente. Pinnas obtinet septem, nimurum unam per dorsi longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidiata latam, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiam unam, duos digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudæ exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, qua est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata.


Totus pescis vestitur squamis latis, qua ita compositæ sunt, ut meri cubi sibi appositi videantur, lutei seu aurei coloris ac per totum ambitum linea seu fimbria elegantissima azuri seu cœrulei coloris. Caput superius aureum est cum magna macula colotis ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albicantibus striis variegatum. Pinnae duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicanter, in lateralí ambitu cœrulea lineola praeditæ. Pinna dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cœruleis secundum longitudinem notata, qua in ventre major ex ruffo ad brunnum vergit colorem, striis itidem cœruleis secundum longitudinem. Cauda rufescit striata thalassino ac cœruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virescit. Pescis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

IVRVVCAPEB A Brasiliensisibus:
aut etiam ITAIARA dictus. Pescis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: ore satis patulo, & ex triangulari rotundo, lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exterius circinatam: subter has, duas in inferiori ventre junctas; paulo post occipitum incipit pinna, anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, qua tendit secundum longitudinem dorsi ad caudam usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. Cauda constat




constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata, & quadrata. *Squamatus* pescis, sed squamis ita complicatis ut laevis esse videatur. Pescis universi color egregie ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem constanter maculas habet puniccas, nigras, varias, maiores & minores. Pinnae omnes sunt rubræ & nigro maculatae.

Pinguis est pescis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parvus irccens appensus noctu toto corpore clare lucet.



JAGUARACA Brasiliensibus. Pescis mediocris *Percæ* magnitudine, ore acuto, edentulus. Oculos habet magnos, pupilla crystallina nigra, magna & ampla, circulo coloris argentei, & superius maculam sanguineam habente. Pinnae habet in lateribus & infimo ventre similes praecedenti pesci: per dor-

sum vero secundum longitudinem extendit pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevar & substernere pro libitu: atque non solum componere sed & abscondere in rima cui pinna infidet. Hanc sequitur alia contigua, unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. Caudæ autem pars reliquo corpori subtena subrotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam furcatam, cuius pars inferior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum pinna dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularium latitudo aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unum digitum longa. Totus pescis tectus est squamulis eleganter dispositis; & qualibet squamula in ambitu minutissime est ferrata. Color totius corporis est argenteus, in ventre plane albicat. Caput superius incarnati est coloris, & hispidæ testa munitum. Pinnae omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta prope spinas auro est umbrata. Caro pinguis & boni saporis, præsertim si pescis assetur. Capitur in mari inter scopulos.



CARAVANA Brasiliensibus: Pescis hic magnitudinem & figuram habet ut *Turuucapeba*, differt tamen capite & colore corporis. Pinnae quoque eodem modo positas habet ut ille. Os autem obtinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minutos: Branchias amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. Oculi versus summitem capitum in lateribus positi non longe ab invicem, haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in universum vestitur lunatis, coloris miniati per totum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris insparsa habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: estque edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

CVRVRVCA Brasiliensibus: Species *Corvine*; pescis fluvialis, sesquipedem longus, corpore oblongo; ore satis amplio, oculis mediocribus, nigris. Pinnae habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam fere protensam, quæ divisæ est & prior pars latior, tres digitos ferme; & totidem longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exilior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas, cum aureo & subfusco paucis mixtas, præsertim in dorso & lateribus. Pinnae in dorso & lateribus ac cauda, cinerea: in medio ventre flavescunt & fuscescent. Edulis est.


GVAIBAYA Brasiliensibus, est *Sargus*, convenient enim optime cum descriptione Gesneri.

CAP. IV.


Guatucupa juba. Pacamo. Petimbuaba. Pira jurumenbeca.

GVATVCUPA IVBA Brasiliensibus pescis in duorum pedum longitudinem excrescit, dorso paulum incurvato. Os habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. Oculos magnitudine stuferi Hollandici, pupilla magna, nigra, splendente circulo rubro. Pinnae habet molles sine spinis in lateribus: nimurum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas in ventre subter illas unica spina munita: & unam prope anum digitum longam ac laram, unica quoque spina armata. Ante medium dorsum versus occiput, incipit pinna desinens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata, quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos penes digitos longa,

unum lata , pinnam habet plus uno digito longam & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus , coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescens secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens linea tendit. Caput ex argenteo, rufo, flavo mixtum. Pinnæ albæ sive argenteæ , caudæ penna rufa: venter albus. Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longe optimi ut in Carpione.



P A C A M O Brasiliensibus , Lusitanis *Enxaroco* , marinus piscis qui capitur inter scopulos; carne est boni saporis , cute & colore ut nostrates Aalrupe: longus est totus fere undecim digitos. Corpus autem versus posteriora paulum gracilescit. Caput illi est magnum, latum & crassum , instar orbis, ricu ranæ. Os lunatum , amplum & in eo in utraque maxilla unus ordo dentium non acutorum quidem sed solidorum; in inferiori maxilla vero , antica oris parte , ordo est duplex. Oculos habet haud magnos , nigros , non longe ab invicem distantes , prominentes & supra quemlibet oculum eminentiam quandam cutaceam, instar corniculi, quemadmodum & in qualibet gena & circa os inferius , quatuor. Post branchias (quas carnosas habet & molles, angustasque) pinnam obtinet mollem cutaceam in quolibet latere , duos digitos longam & plus uno latam: in ventre etiam subter has duas cutaceas pinnas angustas, sesquidigitum fere longas, figura instar lumbri, conspicuas. Pinnae ab ano & à medietate dorsi ad caudam desinentes vix prominent, suntque cutaceæ ac molles. Cauda pinnam habet plus uno digito longam cutaceam item & mollem. Cutis est glabra & in utroque latere à branchiis ad caudam quadruplicem habet ordinem punctularum alborum. Pinguis est piscis & valde bona carne. Cutis illius facile destrahi potest. Assatus tamen melior est quam coctus.



Ā N N O T A T I O . Aldrovandus lib. III. de Piscibus cap. 64. Scribit ranam marinam seu piscatricem in Lusitania vocari *Emxaroco*; sed Icones quas dat multum differunt ab hac nostra.



P E T I M B V A B A Brasiliensibus; vulgo *Tabac-pijpe* à figura dictus: Piscis tres aut quatuor pedes longus , corpore instar Anguillæ. Os edentulum acuminatum , superiori mandibula breviori quam sit inferior: estque longitudine oris sesquidigitum , amplitudo , ubi maxima, vix unius. Caput novem digitos longum est ab oculis ad oris extremum , crassities ejus post oculos quinque digitorum , hinc paulatim minuitur , ita ut prope os sit trium tantum digitorum. In summa autem longitudine capitum à fine branchiarum ad oris extremum est unius pedis & unius digiti. Oculos habet satis magnos , magnitudine nucis avellanæ & pene figura , pupilla splendida cæruleescens , quam tunica ambit argentea , in parte anteriori & posteriori macula miniata notata. Post branchias in utroque latere , pinna directe protenditur à latere sesquidigitum lata & longa rufescens coloris: hinc sex & semi digitorum intervallo versus posticam corporis partem , duas pinnae parvae rufescunt in quoilibet latere una , sed magis versus ventrem. Post has pedis intervallo sequitur pinna rufescens duos digitos longa , sesquidigitum lata : sub hac autem ejusdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à fine ha- rum intervallo fere quinque digitorum sunt adhuc duas pinnae rufescentes paulo minores superioribus , una sursum , altera deorsum clata: & inter has ortum sumit cauda instar murena tenuis , teres , sex digitos longa. Corporis autem longitudine à fine branchiarum ad caudam initium est duorum pedum & trium digitorum. Cuta est instar Anguillæ glabra , coloris in toto corpore & lateribus ab ore ad caudam , hepatici , in dorso triplici , in capite dupli , in lateribus unica serie macularum cærulearum magnitudine nummi misnici fere: ha maculae à medio corporis in lateribus ad caudam usque in lineas coeunt: inter omnes autem maculas

cæru-

caruleas ordine intercedunt maculae virescentes. In inferiori corpore tam sub capite quam ventre albescit & videtur aliqua rubedo inspersa. Corpus autem universum non exakte teres est sed compressum & latiusculum, ventris enim latitudo prope secundum par pinnarum ubi latissimus, duorum digitorum, crassities ibidem totius corporis sex digitorum. Hinc paulatim attenuatur donec prope exortum caudae sit sesquidigitum paulo plus aut minus crassum. Edulis est piscis.

Acus piscis vocari potest de quo vide Gesnerum.


A N N O T A T I O. Aldrovandus lib. 1. de piscibus, dat aliquot icones Acus piscis, sed nulla illarum convenit cum hac quam Auctor accurate delineat, quamque & coloribus suis pictam vidimus; nisi forte Acus minor Bellonii, excepto quod haec nostra ad caudam pinnam non habeat, ut illa.

P I R A I V R V M E N B E C A Brasiliensibus; vulgo *Bocamolle*, quia molli ore & aquis extractus statim moritur: vivit in mari in cæno: oblongus pescis haud latus: novem aut decem interdum pedes longus, duos & semis latus, ubi latissimus. Os habet elevatum; quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. Septem habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas: unam post anum firma spina suffultam: sextam per totum dorsum extensam & bisectam; anterior ejus pars plus sesquidigitum longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigitum lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigitum lata, figura pentagoni cuius basis inserta in corpus. Squamas habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis; in dorso viridis & aureus color transplendet: Pinnæ argenteæ & in medietate exteriori aureæ. In quolibet latere linea tendit paulum clata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus. Edulis est & boni saporis.

C A P. V.

Nhamdia. Guapervia. Curuata pinima. Tamoata.

N H A M D I A Brasiliensibus, *Bagre do Rio* vocatur à Lusitanis, pescis corpore oblongo, obeso, ventre molli, versus posteriora angustiori. Capite compresso & ore parabolicae figuræ & denticulis minimis praedito. Est autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longū, duos & semis altum, ubi altissimum. Oculi parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, circulo ex auro & umbra mixto. Branchiae satis ampleæ, & barba sex filis constans, duobus supra & quatuor infra os; corum que supra os versus latus stant quodlibet crassitatem habet



fili quo litera obsignatur,

quinq[ue] digitos longum & post cujusque exortum fovea est oblonga, in quam barbae initium incumbit, vertendo illam postica parte, ut semper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & semis digitos longum, interius sesquidigitum; suntque inferiora fila barbae non ita crassa ut superiora. Pinnas habet septem & octava est pro cauda: nimurum post quamlibet branchiam unam oblongam, firmissima & acuta spina munitam. (quemadmodum & in exortu ipsius post branchiam os durum est triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: versus caudam in inferiore ventre unam fere quadratam & in extremitate circinatam: in summitate dorsi magnam quadratam multis spinis suffultam, & post illam unam longam angustam, cute carnosâ constantem, qua & corpus est testum. Cauda bisecta est & quilibet pars in exitu circinata. Cute tegitur non squamis. Caput dura testa testum, osque superius totum umbræ coloris: dorsum & latera cinerei cum pauxillo caruleo mixti: venter albus: penna dorsalis prior prope exortum ejusdem

coloris, cætera in totum nigri, spinis cincrcis: posterior ejusdem coloris cum dorso & lateribus: pinnæ postbranchiales totæ nigrae: barba nigra, uti & pinnæ ventris & cauda, licet in exortu paululum rufæ. A summitate branchiarum per quodlibet latus tendit in medio linea rubra usque ad caudæ initium.

Capitut in fluiis, & est optimi saporis, vulgoque comeditur.

GVAPERA Brasiliensibus, piscis cuius longitudine ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus ducrum digitorum (reperiuntur tamen & duplo maiores;) corporis medii crassities, ubi maxima, trium: laterum quoilibet unum digitum altum.


Caret omnino branchiis: os habet fatis amplum & clatum, projectum instar canis, minutissimis denticulis; loco lingua lapidem habet instar Carpionis: ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregii turcoidis. Inter ocellos in medio superioris labii seu in fronte corniculum gerit sursum erectum & paulum retrosum versus, & ante illud corniculum etiam filum tenue & dimidium ferme digitum longum versus anteriora directe protensum, paululum tamen elevatum, cui appendiculum adhaeret ut in Liliis: filum hoc retro recondere potest: nam post corniculum fovea est in vertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad unius digiti longitudinem pinna in dorso porrigitur quadrantem lata. Cauda pinnulam habet plus semidigitum longam: à cauda interstitio aliquo versus anteriora circa ani regionem iterum pinnula est semidigitum longa & duæ parvulae in inferiori corpore sub peccore. In medio autem fere corpore, magis tamen versus anteriora, in quolibet latere brachium obtinet, desinens in pinnam duas trientes digitum longam, & pene ita latam, pinna autem brachiorum octo constat spinis quæ per pinnæ longitudinem disparguntur & anterius prominent instar octo unguiculorum acutorum. Brachium quoilibet unica constat junctura ac versus anteriora deflecat ut ita naturæ piscis commodius serviat. Caret in totum squamis sed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspera & scabra, ut in Tiburonibus.

Color cutis est obscure rubricans, cui fuscus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnæ & brachia etiam ejusdem sunt coloris cum fusco mixti. Sed pinna in dorso in quolibet latere quatuor habet maculas nigras maiores: cauda vero & omnes pinnæ minores eleganter variegatae sunt. Ventriculum habet duos digitos longum, cum orificio tres digitos longo & duos circiter amplio, quod in ipsas fauces inseritur: Vnde ventriculum inflare instar utriculi potest. Caro ejus non comeditur. Ad orbium classem pertinet. Vescitur squillis: natans egregie explicat pinnas & inflat se ut in instar orbis seu pilei appareat rotundus. Habui alium tantum colore differentem, duos & semiis digitos longum, qui totus erat coracini coloris splendentis, & se inflabat.

Cutis horum piscium facile detrahi potest & tomento impleta servari.

A N N O T A T I O. In descriptione nostra Americæ lib. xv. cap. 12. Iconem dedimus hujus piscis sub nomine *Pira-Vtoewah*, quia eo nomine ad nos erat missus, quod hic revocandum duximus.

C U R V A T A P I N I M A Brasiliensibus, Lusitanis *Bonto*. Piscis est Cordcovadi magnitudine, vel etiam major, corpore oblongo, fatis tamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret squamis & tegitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam



cujuilibet lateris medium à branchiis usque ad caudam permeat lata linea aurei coloris, hinc à branchiis incipiens alia parallelæ superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc hæc parallela fecat oblique auream, & pergit parallelæ usque ad caudam: linea hæc parallela aureæ anterius & usque dum auream fecat, dupli squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra; postea parte ubi fecat auream & infra itidem dupli serie squamarum notata, sed majorum, & linea ipsa non est glabra ut anterius, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color pis-

lor pescis in dorso & lateribus subvirescens, in ventre albus & splendens. Pinnas habet septem, nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora junctas in infimo corpore: unam in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unam magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinna continua, haud lata, acuta utrobique abit ad exordium caudæ: quæ furcata est. Capitur frequentius in mari, & boni est saporis.

A N N O T A T I O. Gesnerus scribit Thunnum vel Thynnum veterum, à Lusitanis appellari Bonito: item & Amiam ab aliis Boniton appellari è Rondeletio. Sed nulla iconum quas ille dat, satis cum hac nostra convenit.

T A M O A T A Brasiliensibus, Lusitanis *Soldido* (quia armatus) pescis fluvialis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipito ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudine capitidis unius digiti; latitudo paulo major. Crassithecis corporis; ubi maxima, nimi-



rum post occipitum, trium, circa caudam duorum. Caput latum rahnæ ferme modo; os haud amplum; ad cuius quodlibet latus filum habet unum digitum longum instar barbae, os edentulum. Oculi minimi crystallini, magnitudine feminis papaveris, circello aurato cincti. Pinnas obtinet octo, ad quamlibet branchiam unam, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensa: duas in infimo ventre, non ita firmas at ejusdem magnitudinis: unam in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimam: unam parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, coeunt partes seu squamæ loricæ in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color totius pescis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Pescis hic aqua carens in fluvio ubi est, tempore sicco, per terram abit ut aquam quærat.

C A P. VI.

Puraquæ. Acara pinima. Pira pixanga. Innominatus.

P U R A Q V E Brasiliensibus, *Piexe viola* Lusitanis, ob figuram quam cum cithara communem habet qualidunt Lusitani. Pescis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo ejus ab initio capitidis ad finem caudæ unius pedis & novem digitorum. Ab initio seu acumine capitidis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis lati figuram habet uti pingi solet, latitudo ejus, ubi maxima, septem digitorum, excurritque ibi in latere in pinnas instar Raijæ, estque pene transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. Caput in coni figuram desinit. Ab acumine capitidis tres digitos & semis retro numerando occurunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominentes, mediocris avellanae magnitudine, pupilla nigra,

la nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti apicem capientem, per quam aquam evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitum quantum oculi, sesquidigitum amplum,




edentulum, & duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: in quolibet latere quinque incisuras habet ut Rajae & Tiburonis. Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquum corpus teres, aliquantulum tamen compressum, & ibi latum tres digitos & in quolibet latere habet pinnam mollem, tres digitos longam & sesquidigitum latam: hinc angustius sit corpus usque ad caudae pinnam, ubi digitum est crassum. Caudae pinna ferme duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior quam inferius ut in Tiburonibus. Inter duas autem illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis; ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, insperataque egregia varietate puncta ex albo cœrulecentia. Pinnæ quoque glutinis habent colorem ac in lateribus aliquid rufescens mixtum. Acumen capitatis cartilaginis colorem obtinet, qua etiam constat. Per totius dorsi longitudinem ad tactum spina dorsi quasi tuberculis minimis eminet. Caput illius recens lucet noctu. Caro ejus non comedatur. Sed si comedatur, afflent pescatores, per tres horas semifatuos reddi homines, dein sponte ad se redire. Vnius attactus, crepitum articulorum manus & brachii causat, qui tamen statim desinit: & si in medio tangatur artuum tremorem efficit. Capitum mensibus pluviosis, quando tempestuosum est in Bibiribi fluvio, longe ex terra adveniens, cum Rajis & Pastinacis.

A CARA P INIMA Brasiliensibus:

Piscis latus dorso incurvato, sex aut septem digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpionis figura aut verius Perca misnica. Os habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos satis magnos pupilla nigrante transplendente, circulo rubro, fusco & albo: Pinnas septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriora minus uno digito latam, versus posteriora latiorem: hujus pinnæ medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere, posterior non habet spinas neque illam potest recondere: post branchias in utroque latere unam duos digitos longam, haud latam: in medio ventre duas junctas semidigitum ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudam inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquam sesquidigitum longa, totidem lata. Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septem magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitatis lata stria nigra descendit, ad cuius oram aliquid carulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimurum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinna lateris seu oram branchiarum. Omnes pinnæ & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

P I R A - P I X A N G A Brasiliensibus, Belgis nostris **Gat-wisch** / quia in initio antri inter scopulos degit in mari. Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. Cauda duos digitos longa. Os sesquidigitum amplum, minutis sed acutissimis denticulis præditum. Caput haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoidis optimi, circulo nigro, cum aureo & sanguineo mixto. Branchiae in triangularem figuram desinunt, amplæ & acuta spinula prædictæ. Pinnas habet septem: unam per totius dorsi longitudinem extensam, unum ferme digitum latam, & in postica parte latiorem, cuius prior medietas undecim firmis spinis sustinetur, posterior est mollis. Post branchias in utroque latere unam, duos digitos




digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas angustas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam: Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis friceretur. Totum corpus, caput, pinnae, cauda ex albo flaveant: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris diluti, rotundis, magnitudine seminis cannabis: quædam etiam in ventre maiores. Pinnae eodem modo maculatae in ambitu suo obscurius rufescunt. Figuram fere Aurata habet. Edulis est ac boni saporis. Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor situm erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediastinum; minimum utique & vix granum tritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

Piscis hic (*quem Auctor non nominat*) in septem digitorum longitudinem excrescit; figura similis illi quem vulgo Harder appellamus; pinnis tamen aliter formatis: duæ enim quæ in infimo ventre anteriore sub branchiis sunt, magna & latæ, duæ post branchias in lateribus parvæ; in dorso duæ mediores, & in inferiori ventre posteriori parva. Cauda constat pinna furcata. Os parvum, oculi magni. Cutem habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroque latere quatuor nigricantes maculae magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. Pinnae nigricantes cum violaceo mixtae; & duæ illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis coloris piscis quando natans videtur. Viicit venenatis illis Besaenien.

C A P. VII.

Sallema. Uubarana. Piraaca. Capeuna.

SALLEMA seu *Salema* Lusitanis (Salpa Græcis & Latinis, de qua vide Gesnerum) piscis in pedalem magnitudinem excrescit, paulo minor Sargo, cum quo figura, ore, dentibus,



pinnis plane convenit, ut & squamarum ordine: colore tantum differens à Sargo, qui argenteus quidem est, at superius in capite paulum fuscescens, in lateribus flavescentes. In utroque

V autem

autem corporis latere secundum longitudinem novem strias flavas seu aureas habet à capite ad caudam usque extensas: itemque in medio duorum digitorum intervallo ab oculis supra pinnas postbranchiales maculam nigrā grossi misnici magnitudine. Pinnæ, ut in sargo, fere ex argenteo cinerescunt. Venter totus argentei coloris. Optime sapit ejus caro: capitur in mari & in fluminibus.

A N N O T A T I O. Icon Salpæ minoris quam dat Gesnerus, bene convenit cum hac nostra, nisi quod striae illas novem non habet. Vide & Aldrovandum lib. 11. cap. 20. qui & Iconem dat Salpæ, verum cum nostra hac neutquam convenientem & admodum crassè expressam.

V U B A R A N A Brasiliensibus, piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitiei, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadrate cylindraceo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum,

haud magnum: oculi stuferi magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exterius argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In



medio dorso unicam habet pinnam duos pene digitos longam, unum anterius latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiora parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinna furcata, instar harenzi plus duobus digitis longa. Squamulas habet ordine linearie secundum longitudinem corporis positæ, ita affabre ut ad tactum quaquaversus glaber videatur. Superne si aspiciatur olivacei est coloris, at minus aut lateraliter si intueraris plane argenteus ac splendens videtur & dorsum carulescit ex argenteo: venter plane albus: branchia ita glabrae sunt ut laminæ argenteæ videantur.

Affatus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem disperfarum.

P I R A A C A Brasiliensibus: Monoceros piscis Clusii (lib. 6. cap. 28.) *Piexe-porco Lusitanis* (multos autem hoc nomine vocant ob figuram capitis) ab initio oris ad exordium caudæ plus tribus digitis longus, duos latus, ubi latissimus:


corpore lato & compresso, lateribus latitudinem facientibus, non ventre aut dorso. Os plane exiguum, figura porcinæ & anterius in inferiori mandibula duos habet dentes latiusculos ut orbis habere solent, in superiore plane parvulos: oculos satis amplos flavescentes, pupilla nigra. Supra oculos in dorso paulum versus posteriora corniculum erectum fert paulum versus posterioram partem corporis incurvatum, minus uno digito longum, rotundum, crassitie mediocris fili & duplicem ordinem habens denticulorum seu spinarum acutarum, cuspidibus versus dorsum vergentibus, per membranulam quandam tenuem quasi sustentatur, quæ transversim dorso

anneccitur. Non potest autem corniculum deponere ut Clusius putat. Ab ore superiorius versus in altum adsurgit caput usque ad corniculum, quod quasi colliculo insidet, dein recto tramine dorsum fertur & iterum in collum Camelij similem assurgit, ibique pinna tenuis, angusta sumit initium qua paulo plus unius digiti spatio extenditur in dorso, quod ibi descendit versus caudam: in opposita parte corporis inferioris similis pinna est. Porro ab oris quoque inferiori parte descendit corpus, ac primo sub utroque oculo in quolibet latere rimulam habet branchiarum loco & sub rimula parvam pinnulam parallelogrammi pene figura: corpus autem ipsum inferioris extenditur in crassam & plusquam sesquidigitum latam & unum longam pinnam, quæ firma spina in ipsa cute latitante sustentatur; & hæc versus extremitatem habet etiam corniculum parvulum spinosum. Cauda exortus quadratum refert, habens pinnam tribus lateribus quadratam, extremitate arcuatam, duas digiti partes longam & unam fere latam. Cutem haber ad tactum scabram, ut cutis est panapanæ, coloris obscure flavi seu umbræ, uti & pinnae & cornicula & cauda. Pinnis tamen aliiquid auræ admixtum; ut & ipsi cuti versus



versus dorsum; ut plerumque habere solent omnes Orbis species: Nam Orbis speciem deputo, quum ventrem aliquo modo possit inflare.


CAP. VNA Brasiliensibus: Piscis est corpore oblongo non lato, qui in septem digitorum longitudinem excrescit. Os illi obtuse acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stuferi magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. Pinnae obtinet septem; in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre; unam post anum firma spina muniam: unam per dorsi longitudinem excurrentem, cuius anterior medietas spinis munita, quam recondere potest, posterior mollis & sine spinis: cauda bicornis, molli pinna. Tegitur squamulis parvis argenteis, in quibus aliquid aurei transplendet. In quolibet latere habet duas lineas crassas aurei coloris, unam à summitate oris per oculos & medium latus tendentem ad caudam, alteram magis superiorius per dorsi latum pergentem. In summitate capitidis liveat. Pinnae omnes sunt cinereæ: venter albus ut & ejus pinnæ. Coctus boni est saporis. Capitur in mari inter scopulos.



C A P. VIII.

Acarapitamba. Jaguaca guare. Pirametara.

A CARAPITAMBA Brasiliensibus: piscis oblongo corpore ut in nullus seu barbus, in duorum pedum aut etiam majorem longitudinem excrescit: os habet minutum & dentes;




oculos amplos, pupilla crystallina, circulo miniatu: Pinnas septem; unam à summitate dorsi tendentem ad exortum caudæ fere, spinis suffultam, digitum latam aut paulo amplius: post quamlibet branchiam unam tenuem & longam; subtus in ventre duas junctas, & prope anum unam: cauda constat pinna quinque digitos longa, que in duo obliqua cornuta desinit. Squamis totus vestitur modo Carpionis, eleganter ex purpureo cæruleis. In utroque latere in medio ab oculis ad caudam tendit linea sesquidigitum lata, aurei coloris, per totum autem dorsum & latera usque ad hanc lineam puncta aurea majuscula habet: sub linea in lateribus subtiles lineas aureas seu flavas, secundum longitudinem. Venter albicat. Pinnæ laterales & ventris ex albo flavescunt. Dorsalis pinna & tota cauda aurei sunt coloris. Optime sapit assatus, & melius quam coctus. Pinnae ejus lucent noctu. Capitur in mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalculo vexatur, sesquidigitum longo, digitum crasso, figura oblonga, ut cauda Gammari & codem modo formato & crustato: constat autem septem juncturis, & habet quatuordecim brevia crura, unguiculis acutis prædita, in quolibet latere septem: anterius corpusculum paululum ampliatur. Corpus molle est sub crusta instar cochlearum lenta cute obductum: nec oculi nec os apparent. Hoc animalculum ori piscis se ingredit & unguiculis suis arce fauibus inhæret, nec umquam piscis se ab illo liberare potest. Postero die adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo; in totum albi est coloris.

A N N O T A T I O. Habis apud Gesnerum Iconem pediculi atque etiam pulicis marini, sed quæ cum hac non conveniat, quæ pisci, convexa & prona parte, subjecta est: quanquam hoc animalculum quod Author describit, meritissimo pediculum marinum appellari posse judico, aut forte etiam cimicem, nam forma, licet ovalior, non abludit. Vidi crufras satis amplas quas pediculi marini esse asserebant nautæ nostri, quarum figura plane cum hac congruebat, sed crusta minutis veluti squamulis ex viridi & albo mixtis erat contexta: quæ paulatim decidunt.

I A G V A C A G V A R E Brasiliensibus: *Iagueta* Lusitanis, id est, interula, à colore, quia nigritæ ejusdem coloris amiciuntur. Piscis instar *Percæ* nostræ latus & obrotundus, ad summum octo digitos longus, quinque aut sex latus. Os habet parvum, cum minutulus dentibus ordine digestis: oculos mediocres crystallinos, circulo fusco: Pinnas porro septem, unam à medio dorso ad exortum cauda protensa, spinis suffultam, anteriori quidem parte semidigitum latam, posteriori latiorem & in trianguli figuram desinentem. Duas postbranchiales, duas in inferiori ventre, unam post anum latiusculam: caudam denique duos digitos longam, parallelogrammi figura, quæ in duo cornua definit. Squamis vestitur, instar percæ, majusculis, quæ è cinereo cœrulescunt. A dorso autem per latera latæ linea descendant ad ventrem nigrae, in quolibet latere quinque. Superius caput quoque nigrescit; venter vero albescit atque cœrulescit. Pinnae omnes è cinereo cœrulescunt & quodammodo nigrant versus extremitates. Totæ denique cauda nigra est. Edulis est pisci.



A N N O T A T I O. Hic pisci haud male convenit cum *Mormylo* sive *Mormyro* Gesneri, nisi quod Icon in eo differat, quod in *Mormylo* Gesneri plures linea nigrae vel pullæ à dorso ad ventrem per latera descendant.


C V R I M A T A Brasiliensibus:

Piscis carpioni, figura, colore, carne valde similis: sesquipedem longus, quatuor & seini dgitos latus: capite Carpioni, ore rotundo & edentulo: corpore oblongiori, & squamis majusculis. Pinnas habet septem praeter caudam; nimirum duas postbranchiales, duas in medio ventre inferiori, unam post anum, & unam plane parvulam parallelogrammam huic oppositam in dorso; unam denique in medio dorso, magis longam quam latam. Totus pisci coloris est argentei ut *Carpio*, & ejusdem saporis.

Non capitur nisi in dulcibus aquis.

P I R A M E T A R A Brasiliensibus, Lusitanis *Salmoneta*; pisci quinque digitos aut circiter longus, totidemque crassus, ubi crassissimus. Caput habet haud magnum, quod statim deprimitur ab oculis ad os, quod illi parvum, lunatum, & minimis denticulis præditum: in inferioris mandibulæ extremitate barbam habet constantem duobus quasi funiculis crassissulis, duos digitos longis, & ab exortu ad medietatem incarnati, reliqua flavi coloris. Oculi nigri splendentes, circulo flavo. Pinnas obtinet septem; duas in dorso sesquidigitum longas & latas; duas postbranchiales angustas, sesquidigitum longas: & subter has duas in infimo ventre junctas ejusdem magnitudinis, unam parvam in infimo ventre subter secundam & posteriorem in dorso. Cauda furcata constat pinna duos digitos ferme longa. Squamas habet instar *Brasem* nostratis. Color universi pisci, in corpore, capite, cauda, pinnis, dum vivit, plane sanguineus est, nisi quod cauda in fine auream habeat fimbriam: in utroque autem latere, macula nigrae ordine positæ, magnitudine stuferi nostratis: quando vero per bihotium est mortuus color ille sanguineus mutatur in aureum & flavum sanguineo sparsim mixtum. Pisci est edulis.

A N N O T A T I O. Mulli est species; de qua videndum Matthiolus commentario in Dioscoridem



ridem lib. 11. cap. 21. nam duas species recenset, utrasque à Venetis appellari *Barboni*: à cæteris autem *Triglia & Barbone*: Hispanis *Salmoneta*. Vide & Gesnerum. Aldrovandus autem prolixus de illis agit lib. 11. & sequentibus. Quia autem icon apud hos omnes reperitur, hic nullam addimus.

C A P. I X.

Tareira d' Alto. Tareira do Rio. Piratiapia. Ceixupira.

TAREIRA d' Alto, id est, marinus, piscis tereti corpore, decem digitos longus (reperiuntur & maiores) quinque crassus, ubi crassissimus, nam versus posteriora sensim minui-



tur. Caput habet colubrinum, supra oculos in duo tubera elatum: oculos pupilla nigra, circulo flavescente; os acuminatum satis amplum, interius flavum, denticulis acutissimis munatum, quales & lingua habet. Pinnas obtinet octo, nimurum in quolibet latere post branchias unam, uno plus digito longam, trientem latam, directe à latere protensam: post has interstitio pene sesquidigitum in infimo ventre duas junctas figura trapezii, duos digitos longas & totidem fere latas in extremitate: versus caudam in infimo ventre unam duos digitos longam in corpore extensam, sed plane angustam; supra hanc in dorso parvula est instar cuspidis cultelli: in medio dorso una pene quadrata, duos digitos lata, plus uno longa: Octava est cauda vix sesquidigitum longa & furcata. Pinnae autem omnes instar foliorum papaveris sunt tenues, & mollibus spinis suffentantur. Squamulis vestitur peltatis, ita affabre compositis ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera & dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas & virides. Oræ squamarum circumcirca brunnae sunt, & videntur quasi rhombi ordine positi essent brunni lineis circumscripsi, & ac si per unum ordinem tenderet linea flava, per latera viridis. Pinna in dorso secundum longitudinem strias habet brunnas reliqua flavas. Cauda itidem striata brunno. Caput superius maximam partem brunnum. Piscis assandus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.





TAREIRA do Rio (id est, fluvialis) oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos & inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulae & quatuor tales in superiore: mordet vehementer. Oculi satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra, cætera nigri. Caput Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim, aut sedecim digitos. Pinnas habet sex: nimurum duas oblongas post quamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura, unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. Cauda parallelogramma pinna constat, duos & semi digitos longa, sesquidigitum lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squamis satis magnis, fuscis in dorso & lateribus; verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. Caput tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. Pinnae omnes fuscæ, sed nigro undulata transversim ut Nisi cauda: itidem & cauda. Capitur in flaviis; edulis est, sed multas habet spinas.

PIRATIAPIA Brasiliensibus piscis est oblongo corpore & satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit ut quinquaginta libras æquet: oris pars inferior longior superiori. Denticulos habet acutos, inordinate positos & tota oris cavitas cum lingua est rubra. Oculi prominentes, pupilla crystallina ovali & circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. Branchiae desinunt in trianguli figuram, & sunt amplæ. A summitate dorsi ad caudam usque extenditur pinna, que ad medietatem anteriorum spinis surrigitur, reliqua medietas est molliis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mollem habet obrotundam: in quolibet latere post branchias unam, & duas in infimo ventre junctas, oblongas. Cauda fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. Squamis vestitur parvis. Dorsum &

infimus

infimus venter cinnabrii sunt coloris, latera ex gryseo fuscescunt. In totum præterea est maculatus, & in dorso quidem maculas habet majores nummo misnico, ex gryseo fuscas, in lateribus vero & infimo ventre minores ejusdem coloris. Pinnae omnes cinnabrii coloris, in extremis oris lineam albissimam habentes, adque eam fimbriam latam nigerrimam. Postbranchiales pinnae totaliter cinnabriæ sunt fine fimbria nigra aut alba. Dorsalis pinna medietas anterior tota rubra, reliqua fimbriata albo & nigro ut reliqua. Optimus saporis carnem habet si coquatur.

C E I X V P I R A Brasiliensibus: pescis hic magnitudinem acquirit interdum novem aut decem pedum, atque crassitudinem corporis humani; corpore oblongo & capite atque figura cor-



poris Tuberoni haud absimilis. Quem describo tantum duos pedes erat longus cum semisse. Erat illi caput compressum & latum, septem digitos longum & fere quinque latum: os haud ita amplum pro mole corporis, parabolicæ figuræ, edentulum, prominentiis tamen acutissimis confertim repletum: lingua lata: oculi albi haud magni, paulo maiores duplo stuero Hollandico, pupilla crystallina. Branchias haber fatis amplas: Pinnae septem, nimurum post quamlibet branchiam unam, directe à latere protensam, triangularem, semipedem longam, duos & semis digitos latam, ubi latissima. Interstitio fere sex & semis digitorum ab occipito in medio dorso incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc sensim minuitur & ad caudam ferme pertingit, ibique triangulo definit. Huic opposita est ejusdem figuræ una in infimo ventre, undecim digitos longa, definens cum superiore, sed non cum illa incipiens. Infra duas postbranchiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & semis digitos longam & sequidigitum latam. Septima pinna est cauda, incipiens duorum digitorum interstitio à fine dorsalis & ventris, bicornis, superius cornu fere octo digitos longum, inferius paulo brevius, nimurum septem digitorum.

Pinnae omnes anterius spinas habent sed molles. In interstitio inter occiput & dorsalem pinnam, octo osseos triangulares aculeos prominentes obtinet quos recondere in carne & erigere potest, ac pro armis usurpare. Ante quemlibet oculum, intervallo unius digiti foraminulum habet duplex. Caput ossium & glabrum. Totum corpus exiguis squamulis vestitur, ita ut totus pescis glaber videatur. Colore totus est niger, excepto tamen ventre, qui albissimus instar crete; in lateribus (inter album & nigrum) paululum canescit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. Pinnae omnes nigrae, exceptis duobus infra postbranchiales in infimo ventre quæ albæ sunt, oris nigricantibus. In utroque latere pescis linea quædam profundior reliquis squamulis tendit ad caudam usque, ejusdem cum corpore coloris. Pescis gravis ac pinguis est, ac pro optimo habetur inter omnes in Brasilia, præsertim quando adhuc mediocris est magnitudinis. Capitur in Mari.

C A P . X.

Guamajacu guara. Piquitinga. Araguagua. Cannuri.


G VAMAIACV GVARA Brasiliensibus, Lusitanis *Pêixe porco*, & *Diabe*: orbis est species. Longitudo ejus ab initio oris ad pinnae exortum in cauda quatuordecim digitorum: pinnae caudæ

caudæ longitudine plus duorum digitorum. Rotundo est corpore & crassities ejus duorum & viginti digitorum. Caret squamis, tegitur cute, per totum corpus ex fusco ochræ coloris pallidi, in ventre albi. Totum corpus aculeis munitum est, qui in lateribus longiores, in reliquis partibus breviores (longiores autem sunt duorum digitorum) teretes, in extremitate valde acuti & singuli tribus insertionibus, quasi triquetris, cuti infixi. Inter aculeos cutis ubique maculis nigris scatet excepto ventre. Oculos habet magnos eminentes: os parvum obrotundum,


edentulum: pinnas tantum quatuor, duas in lateribus duos & semis digitos longas: unam in dorso versus caudam ejusdem magnitudinis & minorem sub ano.

Orbis muricatus dici potest Gefneri pag. 745, quia aculei ipsius referunt murices.

Habui alium minorem vivum mensē Februario anni 1639, item alios duos mensē Septembri vivos. Cutis eorum erat è fusco virescens, in ventre nigricans: aculei ut prioris & plane similis figura corporis: prope quamlibet pinnam, maculam habebant nigram, ut & utrumque ad latera prope os. Pinnarum color erat flavus: oculorum pupilla nigricans, circulo luteo. Supra utrumque oculum cornu exile, satis longum, molle, cutacea substantia conflans, quod præ se fert natans, quando autem extra aquam est flavescit. Inflare se potest & iterum considerere. Sonum edit Vlch ulch. Si velis ut se inflat, trahe pinnam quæ in dorso est.



P I Q V I T I N G A Brasiliensibus: Pisciculus est duos, aut paulo plus, digitos longus, figuræ pene ut Parabucu à quo non multum differt ut dicam. Os habet parvulum, sed quod ample aperire & rotundare potest: oculos satis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: pinnas sex & septimam pro cauda: nimirum duas postbranchiales, triangulares, inferius positas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularem in medio dorso, unam post anum: cauda constat pinna furcata. Color capitidis argenteus splendens superius olivaceo imbutus. Tegitur squamulis albis, in dorso tamen olivaceus color transfluet. Per utriusque lateris medium tendit linea recta, lata, argentea, splendens usque ad caudam. Pinnae omnes albæ. Differt à Piabucu, quod ille paulo major evadat, & linea illius ad caudam non splendeat, cum reliquum corpus splendeat, quod in hoc contrario se habet: Piabucu etiam pinnam habet in dorso prope caudam, qua hic caret. Cæterum caro similis, edulis,



A R A G V A G V A Brasiliensibus: Gladius Scaligeri in commentariis ad Histor. Animalium pag. 227 Græcis Xiphias, Belgis Sweert-visch, junior erat quem describo. Corporis longitudine ab occidente ad pinnam caudæ unius pedis & septem digitorum; crassities maxima (nimirum inter duas laterales pinnas anteriores) novem digitorum. Capitis longitudine duorum & semis digitorum; quod cordis figuram habet, compressum, nec crassum. In hujus medieta parte paulo tamen versus anteriora in quolibet latere oculus stufieri magnitudine & post quemlibet digitum fere intervallo spiraculum, per quod aquam evomit, & sub hisce, in inferiori tamen parte, os duos digitos amplum, labii instar limæ acutis, sine dentibus (quod & Scaliger notat.) In extremo autem capitidis versus ensem, in inferiori parte duo sunt spiracula, substantiae interius instar branchiarum, quibus sine dubio gladium regit, nam inter has branchias ensis oritur, novem digitos longus, sesquidigitum fere latus, in extremo paulo angustior, constans substantia ossæ, habetque in quolibet latere octo & viginti dentes ordine oppositos, sesquidigitum ferme longos & acutissimos. Pinnas habet septem; videlicet duas ad latera, quæ duos digitos post spiracula incipiunt, duos & semis digitos longas, paulo plus tribus latas: & quatuor digitorum interstitio post has in lateribus iterum duas sesquidigitum longas, totidem latas,

latas, supra has in dorso unam, ejusdem magnitudinis: deinde in extremitate corporis fere in dorso itidem talem & septimam pro cauda, quæ superius quatuor digitos longa, inferius duos & semis, duos lata, ubi latissima, ut in Tuberonibus.

Corpus subteres est, angustum versus posteriora, cute vestitum ut *Panapana* ad tactum dura & scabra, quando sicca, coloris in superiori parte & lateribus leucopæi, in ventre albican-
tis. Inter duas pinnas majores in ventre & versus latera, in quolibet quinque habet incisuras ut *Panapana*.

Æstimari facile magnitudo piscis potest, nam habui quorum enses duos & semis pedes lon-
gi erant cum septem & viginti dentibus utrimque: item quorum ensis similis longitudinis cum
viginti dentibus utrimque: quinetiam quorum ensis quinque pedes erat longus, cum quatuor
& viginti dentibus utrimque. Carnem habet bonam, præfertim junior adhuc, instar Raijæ
vel paulo meliore.


A N N O T A T I O. Xiphias Græcorum alias piscis est, qui quidem gladium habet mucrona-
tum, verum in lateribus minime dentatum, de quo vide Rondeletium lib. viii. cap. xv. Ad
eundem modum describitur à Gesnero.

C A M V R I Brasiliensibus; Lusitanis *Robalo*, piscis duos pedes longus, Lupo nostro figura corporis similis atque etiam ore, crassus plus uno pede, ubi crassissimus: caput sesquipedem pene longum: os semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia ejus fiat tredecim digitorum: oculos habet dupli stuferi magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: Pinnas octo; nimirum duas in dorso, priorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentata, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis desitutam, nec habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latus; unam talem post anum; octavam pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. Squamas habet ut *Carpio*, coloris argentei, splendentes; in dorso autem & lateribus aureus admiscetur: Venter plane albicat: Pinnæ sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtum est; in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

C A P . X I.

Guaracapema. Mucu. Abacatuaja. Acarapeba. Miúvipira.

G V A R A C A P E M A Brasiliensibus; Dolfijn Belgis: Mas est doradæ. Piscis compresso cor-
pore & latus, licet non ita crassus. Caput desinat in figuram quadratam, estque in fronte



ita in aciem eductum, ut facilius fluetus maris natando secare possit. In sex aut septem pedum longitudinem ex crescere: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. Os habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra os & quidem versus ejus interiora oculi positi inferiori loco, ne nimirum in aquis imperiose ageret, qui alias linceus. Oculi autem sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, cæterum argentei coloris. Branchias habet amplas: Pinnas septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totum dorsum extensam usque ad caudæ exortum, latam in medio septem aut octo digitos, quæ sensim minuitur, constans membrana ad tactum coriacea, & spinis molibus interius sustentata: hanc natans in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinnæ protenditur, sed vix unum digitum lata, in exitu triangulata: post utramque branchiam pinnam habet oblongam octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. Cauda circiter sesquipedem longa in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur; ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi

viridi & argenteo mixtus, uti & in pinnis, in ventre vero albcat. Per totum autem corpus (nimurum latera, dorsum, caput) maculis est variegatus cœruleis, variæ magnitudinis, milii, grani hordeacei, ervi. Carnem habet sicciam, bonisaporis.

Velocitate natandi superat Toninhas seu porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisces longo vulgo *Petumbo* appellato.

ANNOTATIO. Aurata vera plene describitur à Rondeletio lib. v. de piscibus cap. 11. ubi & Iconem dat quæ cum hac nostra minime conuenit.

MVCV Brasiliensibus; pisces tereti corpore, ut Enneopthalmus, vulgo *Lampreda*, Germanis *Neunauge*, nec crassiori: circiter duos pedes fit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os item parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Caret pinnis. Totus fuscus, obscurius tamen in dorso, venter epatici coloris: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per me-



dium laterum in vicem facientes. Edulis est & capitur in lacubus & paludibus.


ANNOTATIO. In descriptione Americæ lib. xv. cap. xii. Iconem dedi pisces sub nomine Ubirre uti acceperam, quam & hic reponendam curavi; quia me monuerat Emanuel de Morais, verum illius nomen esse *Mucu*. Verum descriptio Auctoris cum iconè non satis convenit, nam præterquam quod dentium non faciat mentionem, scribit pinnis carere cum hic noſter prolixissimam habeat in dorso, & ad utrumque latus itidem unam; quare in animum induco *Mucu* diversum esse ab Ubirre, licet Morais aliter censuerit. Quinetiam qui Icōnem mihi subministravit, marinum pisces dicebat, cum *Mucu* palustris sit.



Ile in dorso ante pinnam dorsalem. Caret squamis, sed tegitur cute levissima, splendente, coloris argentei; totusque est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet bonisaporis, & sepe comedì.

ANNOTATIO. In Descriptione Americæ lib xv, cap. xii. Iconem dedimus hujus pisces sub nomine *Awah katroe* sive *Iahwe*, quo nomine Icōnem acceperamus à perito pictore, quod corruptum esse appetet. Fabri iconem dat Gesnerus sed quæ cum hac nostra neutiquam conueniat: Vti & Aldrovandus, sed plane rudem; & descriptio quoque multum ab Authoris nostri descriptione ablidit.

ACARAPEBA Brasiliensibus, quibus & *Acaratinga* vocatur, Belgis *Brasem*; magnitudine




ABACATVAIA Brasiliensibus: *Peixe gallo Lusitanis*. Faber & Gallus marinus, de quo vide Gesnerum. Passeris magnitudinem haber, altus & latus instar illius, subrotundus, neque illo crassior: os illi est haud amplum, edentulum: oculi nigri, circulo argenteo. Pinnas habet quinque, unam in dorso, unam in ventre, utramque descendenter & continuam ad caudam usque: idem post branchias utrimque unam: Cauda constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi filia in longum extensa ab inferiore corpore, & unicum ta-

vero fere ut **Bleþ** Pomeranorum. Nimirum pīscis corpore lato , squamis majoribus in totum argentei coloris splendens : pedalis circiter longitudinis, quinque digitos latus, ubi latissimus. Os habet edentulum, haud amplum, acuminatum, quod extendere & contrahere potest; oculos dupli stuferi magnitudine argenteos, pupilla magna crystallina nigricante. Pinnam in dorso extensam habet ad caudam fere , anterius duos digitos altam , firmis spinis sustentatam & sensim angustiorem: in quolibet latere post branchias unam, tres digitos longam , plus uno initio latam & triangularem. In infimo ventre tres , duas videlicet junctas versus anteriora , crassā spina firmatas , & unam prope anum , initio firma spina sustentatam & ad caudam fere protensa , sed sensim minutioram. Cauda constat pinna furcata , tres & semis digitos longa & in exortu antequam dividatur , pene duos lata. Pinnae omnes albi sunt coloris transplendentis. Edulis est pīscis.

MIVIPIRA & PIRABEBE Brasiliensis , *Peixe volador* Lusitanis. Pīscis volans, vel Hirundo pīscis: variae est magnitudinis : major erat Halece, quem hic describo , & formae rario-ris. Figuram corporis habet (instar Zandar Pomeranorum) teretem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudi ab ore ad finem cauda tredecim digitorum ; crassities, ubi maxima , nimirum circa exortum alarum , septem fere digitorum , ad exortum autem caudæ duorum. Caput crassum habet , superius compressum & latum, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum , os non ita magnum , edentulum , at ossa ejus paulum serrata instar limæ. Oculi magni, rotundi , stufero Hollandico aequales, pupilla nigra, circulo flavo , & exterius altero fusco. Pinnas habet sex cum cauda; duas in dorso , unam parvulam in medio , paulum tamen versus anteriora , alteram post hanc duos digitos longam , sesquidigitum latam , tenuem , at octo spinis suffultam ; duas robustas in infimo ventre , subter illa, duos & semis digitos longas , firma spina constantes sed angustas , & unam parvam in inferiori corpore ex opposito majoris in dorso ; septima est cauda , duos digitos longa , totidemque latea & furcata. Præterea habet duas alas magnas , in quolibet latere unam , habentes exortum siuum sesquidigitum fere post oculos , post branchias paulum ; et que alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno , in extremitate sex digitorum: constant alæ tenui membrana instar chartæ puræ (**Post-papir**) ex albo seu cinereo subfuscæ-coloris : habent autem aliquot plicas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramque alam in initio ejusdem parva quasi ala exit , duos & semis digitos longa , sed plane angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorsi , (ab ore nimirum ad quinque digitos numerando) vestitur testa ossæ , dura , quæ versus suum finem dupliciter divisæ in duos aculeos desinit quasi spinas. Branchiae autem ad duos digitos extenduntur in aculeos usque sub alis. Totum autem corpus vestitur squamulis elegantibus , ordine dispositis , quæ in ventre triangulares , in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventre autem ita dispositæ sunt ut pīscis ad tactum glaber videatur : at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum , ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, præsentent lineas rectas , elatas , tuberculatas. In toto ventre albicat , in lateribus & dorso subfuscus , & splendens ut Harengus. Spinae quæ alas sustinent & per eas extenduntur etiam alblicant. Alæ ipsæ ex cinereo fuscescentis sunt coloris, maculis nigricantibus variegatae. Volat hic pīscis super aquas instar Hirundinis per spacium quantum sclopetero pertingi potest: nimirum usque dum siccessant alæ , tunc enim iterum aquæ se immitit alas humectandi gratia & denuo volat. Natura autem huic pīsci alas dedit ut se salvare possit dum hostis ejus Dorada magna caterva ipsum persequitur. Sæpiissime mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropicis interjecto : interdum etiam volando incident in naves , ut nobis etiam factum memini. Caro boni est saporis cocta.

A N N O T A T I O. Vide de his volatilibus pīscibus Aldrovandum lib. 11. cap. 5. & 6. & Rondeletium lib. x. cap. 1. de Hirundine; plerique de Pīscibus commentantes ejus meminerunt, nihilque magis Nauticos homines exercet. Dabitur alias de his dicendi occasio , nam figura horum pīscium , & præsentim alarum valde est diversa , reperiuntur enim quibus alæ sunt duplo longiores verum angustiores.

C A P.



C A P. XII.

Guabi coara. Acaramucu. Guaperua. Cucuri. Piraya.

GV A I B I C O A R A Brasiliensibus, Buraco de Velha Lusitanis; pescis est corpore latiusculo; dorso elevato & à capite arcuato; duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus. Caput & os acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla seriem minimorum denticulorum, linguam conspicuum; qua una cum cavitate inferiori oris, sanguinei est coloris: Oculos stuferi magnitudine crystallinos, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. Pinnas obtinet septem, nimirum post branchias in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in infimo ventre duas junctas: unam post anum duplice spina munitam: per dorsum autem una extenditur, cuius medietatem anteriorem undecim spinæ ergunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. Cauda constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. Squamas habet mediocres, instar *Percæ*, argenteas, quæ per horas sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: in occipito & dorso summo squamae ex argenteo cærulefcunt, & per horas itidem sunt melini coloris. Totum autem caput superius & ad latera est aurei coloris, striis cæruleis secundum longitudinem variegatum. Pinnæ omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in infimo ventre, quæ magis albescunt: per latus autem utrumque versus dorsum secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudam usque. Pescis boni saporis coctus. Capitur in mari inter scupulos.

A C A R A M U C U Brasiliensibus: pescis est corpore compresso nec crasso verum oblongo; decem enim digitos longus est, quatuor latus; ubi latissimus. Os illi parvulum, angustum, rotundum, apicem minimi digiti admittens, ut pescis triangularis. Superius & inferius in anteriori parte oris utrimque dentes triangulatim acuti. Oculi stuferi magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distant oculi ab ore duos digitos & semis plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissuram habet oblique factam, unum digitum longam, trapezii figura. In dorsi summitate directe supra oculos,



instar filii majoris seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriores, quatuor digitos longum & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimque pinnam habet tenuem tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti laram, quæ desinunt circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habetque pinnam sequidigatum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed tegitur cute glabra, parum tantum hispida, ut *Xiphia*, coloris albicans, cui gryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinnæ quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu musci marini multum inveniebam: Pariet appensus noctu clarissime lucebat in tenebris.

G V A P E R V A Brasiliensibus, *Peixe porco* Lusitanis (*Græcis κάπρος*, Latinis Aper vocari potest aut capriscus, de quibus Gesnerus pag. 70. & 214.) Ab ore ad initium cauda quindecim digitos longus, in medio, ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso ac lato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis: octo in qualibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulae aliis quasi brevioribus sustentantur. Os subrotundum, angustum: qua-


tuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi , sesquidigitum à se invicem distantes , maiores grossò misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crystallina , circulo aureo maculato

cæruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam , plus uno latam. In dorso tres penne digitos post oculos , duo habet cornua , unum pennam olorinam crassum , tres digitos longum , quod versus posteriora paulum inclinatur , alterum par-

vum per membranam alteri adnexum , utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est , in initio ferme triangularis , hinc magis magisque angustatur ad caudam fere , quinque digitos longa , initio paulo plus duobus latam : & è regione in infimo ventre talem , initio duos & semis digitos latam , magis magisque arctatam versus caudam. Cauda quadrata figura à corpore extenditur & pinnam habet quatuor digitos latam , duos longam , quæ in duo cornua dilatatur , ut totius longitudi sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet pinnam & ante eam cornu sesquidigitum longum. Pinnae omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris , venter albicat. Squamis vestitur elegantibus , in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis , in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad pinnas postbranchiales , semilunari figura , duas lineas crassæ cæruleæ , unius digitii intervallo , ducuntur. Comeditur assatus , coctus non valet.

A N N O T A T I O. Tam capri quam Caprisci icones quas dat Gesnerus non bene convenient cum Auctoris nostri , uti nec descriptiones , quare hunc nostrum illius quidem speciei , alium tamen judico.


C V C V R I Brasiliensibus : *Cassao Lusitanis* (caniculae species vide Gesner. pag. 201.) ex genere Tiburonum : pescis duos & semis pedes longus , capite in hyperbolam definente , & ore longe inferius stante : & unum tantum ordinem minimorum denticulorum habet , quare nōcere non potest : oculi illi sunt majoris pisi magnitudine , nigri : Pinnae septem plane ut Tibu-



roni , duas nempe post quinque illas incisuras , triangulares ; in medio infimo ventre duas parvae , & in ultima medietate inferioris corporis item parva triangularis ; in medio dorso magna triangularis erecta : & parvula ejusdem figuræ ad caudam ; quam habet instar Tiburonis , uti & similem illi per totum cutem , ejusdemque coloris : nimirum totum inferioris corpus album , dorsum & latera cinerea , quibus argentum transplendet : pinnae omnes cinereæ , exceptis parvulis in inferiori corpore , quæ albæ : cauda cinerea. Hic quem describo , tres catulos perfectos in ventre habebat , unde liquet animal edere. Carnem habet sicciam sine spinis , ejusdem fere bonitatis cum *Corcovado*. Sæpius commedi.

P I R A Y A & P I R A N H A Brasiliensibus : Pescis pedalis longitudinalis , lato corpore circiter sex digitos , ubi latissimus : dorso incurvato , capite obtuso ut Dorada. Oris hiatus parabolicus , quod exacte claudere potest , habetque labia parva quibus dentes tegit ; obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangulatorum , alborum , acutissimorum , quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morsu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere , quasi novacula esset abscessa. Si quis ingrediatur aquam vel saltem immittat pedem vel manum statim ab illo laedi potest , ita sicut est sanguinis & cupiens

& cupiens carnis humanæ, quare caute ab illō cavendum. Oculos habet rotundos, parvos, crystallinos pupilla nigra, & inter illos duo foraminula seu spiracula: branchias amplas, exterius duras & osscas: sex pinnas & septimam pro cauda; duas nimurum postbranchiales, paucum elatas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvulas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit pinna & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posteriora, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interstitio à parvulis in infimo ventre incipit pinna, firma spina anterius munita, cætera mollis & maximam partem squamulis testa & paulo plus duobus & semis digitis longa, extenditurque ad exor-



tum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. Squamulis tegitur: tota summitas capitis, dorsum & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali pinna ad medium pinnæ squamosæ, coloris est cinerrei diluti cum paucō cæruleo mixti, ac squamula qualibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuri, ut & capit is inferior pars, ac pinnæ postbranchiales & omnes infimi ventris. Pinna dorsalis & cauda coloris est è cinereo cærulescentis. Edulis est & carnem habet albissimam, paululum sicciam & boni saporis. Sæpiissime comeduntur. Hæc species maxime gaudet cœnoso fluvii fundo.

Pirayæ alia species hic reperitur magnitudine & figura plane similis priori, excepto quod parvulum adhuc pinnam habeat squamatam inter dorsalem & caudam, & quod colore differat: nimurum summitas capitis, totum dorsum & laterum superior pars eo usque si linea ducatur à pinna postbranchiali ad medium pinnæ squamosæ, coloris sunt aurei ac rubri cum cincere mixti, & cæruleo transplente. Capitis inferior pars, reliquum laterum & infimus venter insigni colore croceo fulgent, cui aureus persplendet. Ejusdem coloris croceo-aurei sunt pinnæ postbranchiales & infimi ventris. Dorsales duæ & cauda cinerei diluti cum paucō cæruleo mixti, ut & dorsum. Hæc species magis gaudet arenoso fluvii fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia Pirayæ species alba, figuræ ut antecedentes, solum caput non ita obtusum, sed os paulum prominet figura conica: color ventris & laterum argenteus: dorsum & caput argentei coloris cum paucō cæruleo transplente: pinnæ omnes argentei coloris cum gryseo mixti. Dentes habet parvulos triangulares ordine dispositos, nec ita mordet ut cæteri. Paulo minor quoque est reliquis speciebus, cæterum non minus edulis quam illæ.

C A P. X I I I.

Punaru duæ species. Amore duæ species. Pastor sive Harder. Guacari.

PUNARU Brasiliensibus: pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassissculo, & anterius obtuso. Os habet parvum; in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicilarum: oculos superius & in fronte positos, pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo rubra fila brevia, prominula, branchias amplas; utpote quæ una ei est



è duabus conflata: Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paullo post occiput incipit pinna quæ ad caudam usque producit, spinulis prominulis suffulta.

In medio infimo ventre incipit similis, ferme ad caudâ usque pertingens. Cauda autem longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fusca, & pinnæ sunt ejusdem coloris.

Reperitur hic & alia *Punaru* species, figura corporis priori similis; sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula exten-

ditur usque ad exortum caudæ quæ mollibus texitur spinis non prominulis. Postbranchiales habet fere ut prior; ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscure purpureis. Vtraque species inter scopulos vivit & intrat etiam testaceorum domicilia.

A M O R E G V A C V Brasiliensibus; in semipedis longitudinem excrescit; corpore oblongo, capite crassissimo, branchiis amplis, minutissimis in ore denticulis: Oculi illi parvi nigri circello aureo. Pinnas habet septem: nimirum duas postbranchiales oblongas, quasi triangulatas; duas sub his junctas; duas in dorso, anteriorem minorem posteriore; & è regione posterioris unam in infimo ventre. Cauda oblongiuscula, parallelogramma, in extremitate circinata. Tegitur squamis pro sua magnitudine majusculis. Piscis in totum ferrei coloris, in ventre tamen paululum è ferreo albcat. Est edulis.

A M O R E P I X V M A Brasiliensibus, vulgo corrupte *Amorea* Piscis magnitudine Tamoaæ, capite lato, ore ampio, & edentulo, corpore oblongo ita ut fere Tamoatam referat. Coloris est obscure ferrei; in ventre, qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octayam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca & bona ut Tamoaata.

A M O R E T I N G A Brasiliensibus piscis est ejusdem plane figura cum *Amore gñacu*, sed tantum minor: habetque squamas in totum albantis seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis ut *Tajafica*. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.




PASTOR Belgis

Harter (*nomen Brasiliense ab Autore non proditur*) piscis est mediocris. Truttae magnitudine cuius & figuram habet; oculis ellipticis, squamis albanticibus seu argenteis, mediocribus instar percæ, lineari ordine dispositis, & inter ordines squamarum, linea gryseæ media sunt intertextæ. Pinnas habet septem omnes majusculas & longas; duas nempe post oculos (caret enim branchiis) duas sub his junctas in inferiori corpore, his oppositas tamen magis versus posteriora: in summitate dorsi unam maximam omnium; in infimo ventre circa anum unam, & itidem unam illi oppositam in dorso. Cauda in duo ampla cornua est divisa. Pinnae omnes sunt albiantes.

A N N O T A T I O. Piscis nauticus hominibus notissimus, quorum nostrates hoc nomen illi dederunt, quod Auter noster Latinum fecit. Cæterum Gesnerus judicat esse Mugilem vel mugilis speciem, & squamis satis magnis testum esse, & lineis à capite versus caudam aliquot, instar Thymalli distinctum. Dat autem plures Mugilum icones, quarum nullæ cum hac nostra quam Auter noster ad vivum delineavit, convenient: omnes quoque habent branchias, quibus hic piscis caret.

G V A C A R I

Brasiliensibus: piscis subrotundo seu pyramidalis corpore, pedalis vel paulo majoris longitudinis; octo digitorum crassissiei, ubi maxima est. Caput inferius planum, lateribus ellipsis describit, superius subrotundum. Os parvum rotundum habet subter in plano capitum: loco dentium in utroque latere processus habet quasi setis equinis factos: inferius labium explicatum, lunatum, membrana constans, quæ in lateribus oris in suis extremitatibus in cirrhum definit, tritem digitum longum, qui cirrhi pro barba servint. Oculi parvi, rotundi, nummi misnici magnitudine, cinerei fusco maculati, superne positi & inter quemlibet foramen, distans dimidium digitum ab oculo versus anteriora: Branchiae angustæ inferius versus & ante quamli-



quamlibet proxime corpusculum parallelogramnum , semi ferme digitum longum , quod extendere & recondere potest, ita ut reconditum vix videatur. Continet illud corpusculum in extremitate denticulos acutos setaneos , quibus alios pisces pungit. Et post branchias in quolibet latere inferius ad planum , triangularem quasi pinnam , quatuor digitos longam pene , plus uno latam , oblongam , spina ossa in extremitate laterali sustentatam & aliis minoribus secundum longitudinem discurrentibus : spatio autem sesequidigitum versus posteriora directe post has jam descriptas , iterum duas inferius pinnas habet quadratas , in quolibet latere unam, duos & semis digitos longas , duos latas , eodem modo spinis hispidis officis sustentatas. Post anum in infimo ventre angusta est pinna , parallelogramma , duos digitos longa. In medio dorso penna est , quatuor digitos longa , duos lata , spinis hispidis ordine dispositis sustentata , ac anteriorius spina dura crassiore fulta , post hanc prope exortum caudæ superius parva quedam est penna , membranosa , qua anterius corniculata spina fulcitur. Cauda constat penna tres digitos longa inferius , duos superius , bicorni , spinis firmis suffulta . Totum caput testa vestitur dura , ad tactum hispida : totum corpus squamas triangularibus , versus anteriora majoribus , ordine positis. Sunt autem squamae omnes ad tactum asperæ , quasi exsculptæ , quælibet in sui medio extuberantiam habens : scilicet totum corpus loricatum est , & quælibet pars loricae habet quatuor angulos , & in quolibet existit tuberculum ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. Color totius pisces croceus dilutus , in ventre saturior ; ac per totum maculatur maculis rotundis , magnitudine semenis sinapi , fuscis. Maculae haec in lateribus & pinnis paulo sunt maiores , in capite minores , ac in summitate capitum maculae ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. Pinnae omnes ut corpus coloratae & maculatae , excepta pinnula prope caudam , qua constat membranula nigra , corniculata autem illius spina crocea est & maculata ut reliqua.

Diu vivit extra aquam , ad quinque horas. Editur defracta lorica , sed paucam habet carnes : intestina longissima , aequalis omnia crassitie , instar crassioris filii quo vela considunt. Habebat unus pisces quindecim digitos longus , intestina viginti octo pedes longa , qua dimensionis sum.

Reperitur & hic Guacari , magnitudine & figura plane similis priori , qui in flumine S. Francisco capit solo colore differens & bonitate carnis : est enim totus umbræ coloris obscuri & per totum maculis adspersus obrotundis , nigris , semenis sinapi magnitudine ; Caro hujus boni est saporis.


C A P. X I V.

Piraumbu. Acara aya. Timucu. Guamajacu atinga. Acara. Guariguaru. Cugupu-guacu. Maturaque. Carapo.



PIRAUMBUS Brasiliensibus ; Chayquarona Lusitanis ; pisces carpionis magnitudine & figura : decem digitos longus ab ore ad initium caudæ , paulo plus quatuor digitis latus , ubi latifimus : versus caudam angustior & aequalis latitudinis , duorum nimirum digitorum . Os habet instar Carpionis , oculos magnos prominentes , pupilla crystallina , circulo aureo cum albo mixto . Pinnae obtinet octo , nimirum unam in medio dorso , paulo plus tribus digitis lon-

gam & unum latam , quam in rimam recondere potest , & erectam novem firmis spinis sustinare : huic contigua est alia tres fere digitos longa , minus uno lata nullis innixa spinis : post utramque branchiam unam habet tres digitos longam , unum latam in exortu : in infimo ventre duas junctas , duos digitos longas , vix unum lata , firma spina munita ; post anum unam , digitum latam , dimidium longam , itidem firma spina sustentatam : octava est pro cauda , tres digitos longa , totidem lata & furcata. Squamas habet maiores , instar carpionis , argentei splendentis coloris , pauxillo aureo mixti : quælibet autem squama medianam partem usque ab insertione sua coloris est feuiemort : sub capite & ventris priore parte magis argenteus est. Omnes pinnae dilute cinerei sunt coloris. In ore superiori & inferius lapidem habet , denticulis minimis præditum , vix sensibilibus. Edulis est ac boni saporis.

ACARA AYA Brasiliensibus : vulgo corrupte Garanha : Piscis qui trium pedum longitudinem



dinem adipiscitur, figura Carpionis. Dentes in inferiori mandibula habet acutos, instar aciculorum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi vix sensibles. Oculi ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primum, hinc argenteo. Pinnam longam habet per dorsum longitudinem expansam, cuius medium partem versus anteriora spinis surrigere & in rimam recondere potest: reliquas quinque pinnas communas habet cum aliis piscibus: septimam pro cauda, quae lata & pene bicornis est. Squamis vestitur argenteis, mediocris magnitudinis, quae sanguineo colore umbratae sunt, ita ut maximam partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente: in ventre totus est albus, ut & sub fauibus. Pinnae omnes sanguinei coloris, exceptis iis quae sunt in infimo ventre, quae albæ sunt, in extremitatibus tamen sanguineæ. Edulis est pisces; Sale etiam conditur & servatur.




T I M V C V Brasiliensibus; Peixe agulha Lusitanis: pisces duos pedes longus, corpore tereti instar anguillæ. Rostrum habet osseum, tres vel quatuor digitos longum, acuminatum, utrobique dentibus minimis reservatum: inferior rostri pars paulo longior superiori, & id quod prominet molle, non osseum; ciret lingua. Oculos habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam quae fere ad exortum cauda porrigitur & similem huic oppositam in dorso; Cauda pinna quasi bisecta constat. Caret squamis, sed tegitur cute. Summitas capitii & rostri ac dorsi cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus secundum longitudinem linea tendit virescens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt. Edulis est. Capitur in mari & fluviis falsis. Boni est saporis, præsertim fritius butyro; caro ejus non est spinosa.

GVAMAIACV ATINGA Brasiliensibus, mihi orbis muricatus Ranæ riœtu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum: os Ranæ simile, & loco dentium tam superius quam inferius, os durum: oculos magnos, rotundos, protuberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitum admittens & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitum longam, duos latam: in extremitate dorsi versus caudam etiam pinnam oblongam, haud amplam, & è regione hujus similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus tegitur cute spinosa quae in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constat duris ossibus & acutis: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen fulcescit, inferius totum ex albo subflavescit, ut & spinæ totius corporis. Pinnae omnes flavescent. Post utramque pinnam postbranchialem maculam habet nigerrimam stuferi magnitudine & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriora aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnae dorsalis etiam similem habet: parvulas item sub oculis & ore. Vtris modo se inflare potest.

Non est edulis. Capitur in mari.

A C A R A Brasiliensibus: pisces palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut Perca. Os habet angustum, & dentium loco limam: oculos haud magnos, nigros, circulo aureo: Pinnas obtinet sex: nimirum sub qualibet branchia unam longam, triangulum acutum re-




ferentem:

ferentem: à summitate autem dorsi pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudæ exortum desinens. Cauda oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso & lateribus ita umbra mixtis ut fuscus videatur. Venter albicat. Pinnæ omnes & cauda fuscæ sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigræ, ut & prope exortum caudæ. Edulis est pescis, & capitur in fluiis dulcibus.




G V A R V G V A R V Brasiliensibus, pesciculus est minutus, nunquam major sesquidigitio, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eldrix*. Capitulum habet compressum: ocellos nigerrimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtus fere in infimo ventre,

& unam in posteriore medietate dorsi: cauda constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis; & totum caput superius, & dorsi anterior medietas sunt fuscæ coloris, posterior & latera aurei, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendens ut mater perlarum: pinnula flavæ: prope caudam utrimque maculam habet nigræ. Edulis est & capitur in lacubus & stagnis.




C V G V P V - G V A C V Brasiliensibus, Lusitanis *Meros*, Belgis Jacob Evertzen: ingens fit pescis: habui quorum corpus cum capite quinque pedes erat longum & cum cauda sex: corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. Caput & os magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, edentulum: oculos mediocres, pupilla crystallica nigricante, circulo flavo: Branchias in ambitu rotundas, medio autem in triangulum desinentes: Pinnas quinque; nimirum unam à summitate dorsi incipientem & non ita longe à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam; posterior autem medietas lata est & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam ejusdem figuræ, cum medietate posteriore dorsalis, sed dimidio minorem: post branchias prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. Cauda magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latiorem, quam in exortu. Squamas habet parvas. Totum caput, dorsum ac latera cinerei sunt coloris cum umbra mixti, & versus dorsum paulo saturioris. Venter albicat. Pinnæ omnes cum cauda dilute brunneæ. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas postbranchiales maculæ parvæ nigræ, seu puncta frequentissima dispersa. Venter vero & reliquæ pinnæ cum cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.



M A T V R A Q V E Brasiliensibus: Pescis corpore oblongo & ferme parallelogrammo, figura scilicet Tamoxata. Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus. Caput habet latiunculum, dura testa tectum. Oris pars inferior paulo longior superiori: & in inferiori sex

denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos: Branchias satis amplas: oculos rotundos, nigros, circello aureolo, exterior fusco: Pinnas sex, nimirum duas postbranchiales oblongas, haud latas: duas tales in medio infimi ventris & unam post anum trapezii figura, & similem in medio dorso: Cauda constat pinna quadrata unum fere digitum longa, in extremitate circinata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscure canescit. Pinnæ omnes nigræ. Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluiis. Boni saporis est, sèpe comedunt.

CARAPo Brasiliensibus, Prima species, corpore oblongo, figura cultri: dorsum nimirum crassum & obtusum, venter acutus ut culter: posterius autem corpus definit in acumen: unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. Caput acuminatum, sed compres-



sum, inferius labium paulo longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minutorum, superius nullos habet. Oculi minimi, nigri, vix grani papaveris magnitudine. Branchiae angusta & post quamlibet parvula pinna oblonga. Vnus fere digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna tenuis, angusta & per totum ventrem æqualiter porrigitur ad finem corporis: nam caudam nullam habet nec ullam aliam pinnam in toto corpore: Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco & paucō rubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta & sub hac linea macula nigra per corpus dispersa, seminis sinapi magnitudine. Capitur in lacubus & est edulis.

In Flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint & in extremitate acuminati instar subulæ, ad trium digitorum longitudinem squamu-las paryas habent.

CARAPo secunda species, priori figura, colore & lineis lateralibus similis, excepto quod dimidiæ tantum sit latitudinis, nec ulla maculas habeat. Capitur in lacubus. Caro spinosa, sed boni saporis.

C A P . X V .

Piaba. Piabucu. Nhaquunda. Guebucu. Guara tereba.

PIABA Brasiliensibus: magnitudine nostratis Eldrize (vide Gesnerum de Phoxino) pis-ciculus duos aut tres digitos longus(interdum quatuor aut quinque quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamu-lis vestitur. In medio dorso pinnula erecta triangu-laris: post quamlibet branchiam unam habet oblongam; duas in medio infimo ventre & post has unam, quæ ad caudæ exortum protenditur: cauda est furcata. Caput ad latera auro & argento splendet: totum dorsum argenteo viridi & multo Indico: medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtum: Venter aureo & argenteo & paucō Indico. Post quamlibet branchiam maculam rotundam satis magnam Indici coloris & statim post hanc ejusdem coloris maculam lunæ corniculatae figura, ejusdemque coloris oblongam in quolibet latere ad caudæ exortum. Pinnae omnes & cauda aurice coloris, quæ in infimo ven-tre rubrae. Capitur in omnibus fluviis dulcibus currentibus Brasilia ac summa vi contra aquæ cursum nititur. Brasiliani involvunt foliis arborum & cineribus condunt, desuper ignem imponentes; sic præparatos commedunt. Saporis sunt haud contempnendi: saepius comedunt.



PIABUCV Brasiliensibus: pis-ciculus sex digitos longus, sesqui-digitum latus, ubi latifimus; ventre paululum extuberante, oculis elegantiibus, pupilla cry-stallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. Septem habet pinnas, octavam pro cauda furcatam: nimirum postbranchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione hujus in dorso parvulam. Tegitur squamu-lis argenteis splendentibus. Per medium laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata non splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viri-




cui viridis hyacinthinus persplendet. Pinnae albæ. Capiuntur facilime aciculis, vel corbe aut olla immissa in aquam, cui parum farinhæ de mandioса aut mica panis intrita. Cocti comeduntur & frixi: Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro vel ulcusculum tenens aquam ingrediatur, statim hic pisces vulnus petit mordendo, ita sitiens est sanguinis humani.

N H A Q V V N D A Brasiliensibus; mas & foemina reperitur. Mas corpore est oblongo, fere ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: caput & os fere Lucii habet; superius labium extendere & oris hiatum rotundare potest; dentium loco habet lamas, linguam tenuem, branchias amplas: oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septem pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos fere digitos longam; sub his

in infimo ventre duas junctas, & post anum unam pene quadratam. Ab initio fere dorsi una protenditur pene ad caudæ exortum, tres digitos longa, unum ferme lata, æqualis, mollibus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum definit. Cauda testa dura tegitur nigra. Totum corpus squamis mediocriſ magnitudinis vescitur, ac totum dorsum & latera obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendentie. Venter albus. In utroque latere unum ordinem habet macularum, rotundarum, nigrarum, pisæ magnitudine, & inter has dispersa punctula multa cærulea. Pinna omnes aureæ ut & cauda: & pinna dorsi insuper variegatur per totum punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superiori branchiarum, & ad regionem finis pinnae dorsalis desinens, & semidigiti fere interstitio sub hujus fine, alia linea incipit ac in medio exortus caudæ desinens. Lineæ hæ clatæ sunt ac aureæ. Capitur in flaviis ac boni est saporis.

Fœmina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituatur & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.



G V E B V C V Brasiliensibus: Lusitanis *Bicuda*; pisces rostratus; oblongo & ferme testa est corpore, ut *Dorada*: capite porcino; rostrum, cauda in duo cornua diuidita ut *Albacara*; rostrum acutum, osseum; durum: partis superioris longitudine sedecim digitorum, inferioris decim. Crassitex totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem mouere potest. Branchias habet amplas: os interius orbicularis figuræ, in medio sui hyperbolico foramine, lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. Oculos habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertione caput in altum assurgit, ut in *Dorada* mare: est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudine ab occipito ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis; in medio autem corporis decem digitorum & prope caudam duorum. Cauda in duo cornua extenditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum; ad cuius exortum in quolibet latere due auriculæ membranacea. Pinnae habet sex: proxime post quamlibet branchiam unam, directe à latere protensam, dura membrana constante ut in *Tiburon*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubi latissima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilliformia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia: dura, plane ut os *Sepia*, quodlibet novemdecim digitos longum: utrumque junctum, in rima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ven-


nem ventris facta est ad caudam usque. Intersticio duorum pedum à fine hujus fissuræ seu ano, in infimo corpore pinnam habet triangulatam sex digitos longam, latere anteriori firma spina munitam; etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: octo digitorum intersticio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem, & è regione hujus similem & æqualem in superiori corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima autem omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ protenditur per dorsum in trium pedum longitudinem, constans membrana pergameni æmula, costis intertexta; hanc quoque totam demittere potest ac in profunda rima condere: lata est sesquipedem, ubi latissima, & versus posteriora paulum angustatur. Cuite crassa, subaspera vestitur, tota sub fusca: spinulis oblongis, trientem digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscurè fuscum, ut & caput superius & rostrum; reliqua rostrum cinerescit flavo. Pinnae omnes cum cauda ex cinereo argenteo fuscescent, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, nummi misnici magnitudine insigniter est variegata, illa post anum paulum undata maculis fuscis. Carnem copiosam habet, non spinosam, pingue, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem quam caro Marsorum. In ventriculo interiore multos integros pisces pedales inveniebam.

G V A R A T E R E B A Brasiliensibus;
Piscis magnitudine septem aut octo
digitorum: capite obtuso, oculis cry-
stallinis, circulo aurco: os denticulos
habet minimos: Branchias amplas:
dorsum incurvatum, unde &
Corcovado minor potest appellari. Pin-
nas obtinet septem: post quamlibet
branchiam, unam longam: sub his
duas junctas in infimo ventre: in me-
dio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula conjunguntur; & post has triangula-
rem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extendit: in summitate dorsi triangularem
mediocrem, & post illam aliam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porri-
gitur. Cauda in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein
oblique deorsum vergit & direcet usque ad caudam porrigitur: hæc posterior lineæ medietas
hamulis posteriori versis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ mi-
nimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Coloris est in dorso & lateribus usque ad medi-
tatem longitudinis ex hyalino cœrulescens: reliquum laterum & venter albicat, sed aureus
color transplendet. Pinnae ventris albæ, reliquæ cum cauda aurei sunt coloris. Edulis est
piscis.

I P E R V Brasiliensibus, Tiberaon vel Tuberaon Lusitanis, Belgis *Hene*: Canis carcharias
vel lamia. Longitudo totius corporis usque ad caudam sex pedum. Longitudo caudæ (quæ
pinna est lata, divisa seu furcata, cuius pars superior longior inferiori) duorum pedum. In
ore habet triplicem ordinem dentium magnorum triangularium, instar dentium majoris ser-
ræ, & quilibet dens iterum minoribus est dentatus vel ferratus: numeravi in uno *cxxii.* den-
tes. Oculi elati. Pone foramina seu spiracula tres habet in quolibet latere rimas, spithamales
quasi incisuras. Totum corpus tegitur cute ad tactum hispida, qua siccata ligna expoliri pos-
sunt. Crassities corporis duorum pedum. Sex alias pinnas habet præter caudam, duas maxi-
mas sesquipedem longas & septem digitos latas, in quolibet latere unam post incisuras direcet
à latere protensa: unam in medio dorso erecte stantem, duas minores in infimo ventre, &
unam omnium minimam proxime caudam in inferiori corpore. Carnem habet albissimam
quidem, sed nimis sicciam. Comeditur à nauticis sociis & bajulis. Iuniores satis bene sapiunt.
Vidi plusquam vigesies ingentem canem absuntum fuisse à Tiburone in Bibiribi. Vidi sapientius
duo posteriora crura cum natibus uno morsu cani ablata. Hominibus infestissimus est & faci-
le aliquem dilacerat si incautius aquam ingrediatur.

A N N O T A T I O . De Cane carcharia vide Aldrovandum lib. iii. cap. 32. Sed observa, quod
ille in Iconibus in utroque latere exprimit quinque incisuras, cum Author noster tantum tres
ipsi tribuat. Habeo autem sceleron oris, in quo tam in superiori quam inferiori mandibula sex-
tuplex ordō est ejusmodi dentium, subtilissime ad latera serratorum, & numerari possunt
dentes supra trecentos; præter alios minutos: ita ut terribilis sit rictus.

Tiburonis species minor, Belgis *een Crupshepe* à figura, convenit cum majore, excep-
to capite, quod habet triangulare seu ut cor vulgo pingitur. Oculi parvi ad latera ipsius capi-
tis. Os



tis. Os parvum triangulare longe infra positum; cum triplici ordine dentium minorum; nec ita potest nocere; os enim habet angustum. Caro melius sapit quam majoris.

Reperitur & alia species, quam Brasilienses vocant *Vrumaru*: Lusitani *Lixa*; Græcis *Pinn*, Latina *squatina*, Belgis een *Schoerhepe*.

C A P. XVI.

Bagre diverse species. Rayæ diverse species.

BA G R E piscis oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato; capite acuminato seu conico, quod dura testa est tectum ad initium elevationis dorsi: pedalibus longitudinis: Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores fœtoidigitum longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquunt. Pinnas obtinet septem, octavam pro cauda: nimis rursum




duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortè aculeum, dentatum, ossum: unam in summitate dorsi elevatam, & ante illam item aculeum fortè, æqualis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio fere infimi ventris, magis tamen versus anteriora; unam membranaceam sine spinis versus caudam, & huic oppositam mediocrem mollibus spinis suffultam. Cauda constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. Pinnae omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudam usque constituta ex 77. protuberantibus. Oculi nigri satis ampli; os parvulum, edentulum, labii elevatis. Piscis est edulis; si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur & magnos patitur dolores.

Alia *Bagre* species (quem describo, longitudinem habebat duorum pedum & trium digitorum) corpore oblongo, capite compresso & plano; ore inferius parabolicae figuræ, obtuso,



edentulo. Caput octo digitos longum, testa dura punctulata testum. Oculi parvi, rotundi, crystallini, quatuor fere digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnae, octava pro cauda: una nimis in summitate dorsi, firma spina anterius munita, erecta, tres digitos longæ, totidem lata: dua postbranchiales, itidem firma spina munitæ, quatuor digitos longæ, duos latæ; intersticio sex & semis digitorum post branchiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) dua junctæ, tres digitos longæ, duos latæ, in ambitu circinatae: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosæ, fœtoidigitum longa, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita: & sub hac in infimo ventre alia paulo major: cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua diducta, crassa sed molli membrana constans duos & semis digitos longa, in qualibet cornu duos lata. Totum caput superius & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiam ventris usque, candidi cum diluto flavo & aureo mixti est coloris; in testa capitidis etiam aliquid viridis transplendet: Pinnae omnes & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris: Ca-

ris: Caret squamis sed vestitur cute. Bona satis est carne, meliori quam Camarupi, cuius magnitudinem fere æquat.




BAGRE alia species figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos, & latiusculis instar ligulae, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & post branchiales pin nas eodem modo: cætera similis præcedenti.

BAGRE alia species: Belgis nostris vulgo *Clipbagre* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: capite lato & compreso: ore parabolico, edentulo. Barba constat sex cirrhis quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, cærulescentes; quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsi tegitur testa dura ossea; & post branchias in quolibet latere pyramidalis testa angusta tegit latera. Pinnas habet septem, & octavam pro cauda: nimirum unam in summitate dorsi, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, anterius spina ossea crassâ duplitter ferrata, duos & semi digitos lata sustentatam. In medio ventre infimo duas parvas: in fine pene dorsi, carnosam, parvulam, angustam & è regione hujus inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda divisa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsi & lateribus ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbra dilutioris, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albcat. A testa latiore fine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam rectam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius veròrum qui clypeo duro serrato in medio insunt, nam anguli obtusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7. Edulis est, sed pauca carne, quæ non magnificat.

BAGRE alia species, præcedenti similis, & maculis numini misnici magnitudine variegatus: verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos & sex longiores quam alter. Hæc species habet carnem bonam & pinguissimam.

BAGRE alia species, figura &




magnitu-

magnitudine similis illi quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constantem, duobus nimis longis octo digitos & latiusculis instar ligulae, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa; & ad post-branchiales eodem modo; cætera per omnia similis illi quem diximus; nam & ventrem ita protuberantem habet.



prehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. Os inferius habet, haud amplum, edentulum; incisuræ quasi parabolice. Cute tegitur in superiori corpore ferrei coloris & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili aestimatur in cibis.



cedenti similis, excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam defitit. Color totius corporis superius umbræ, punctulatus per totum maculis nigris, feminis sinapi magnitudine: cauda aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperiuntur hic & Rajæ, quarum caudæ tres & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos & in fine plane acuminatæ, plena tuberculis nigricantis in totum coloris, flexiles ut scutica.


NARINARI Brasiliensibus; sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus appellatur *Narinari pinima*: Lusitanis *Raja*, Belgis *Pijsteert* vel *Seicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, ferme triangulare: constans ad utraque latera latissima pinna trianguli, carnosæ: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas, æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet mediocris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. Os triangulo subrotundum, compressum paulo & in promiscidem desinens: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promiscidis versus ventrem: amplitudine oris duorum & semis digitorum; edentulum, sed loco dentium os habet linguæ figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile os superius, transversim positum, duos digitos longum & totidem latum. Inferius os constat è septemdecim ossibus, albis, duris literæ U figuram habentibus, quæ arcte per membranas conjunguntur, hisce alia septemdecim subjacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius os constat quatuordecim ossibus literæ J figura, quæ eodem

AJEReba Brasiliensibus Rajæ species, piscis planus, circinatus, unum pedem & novem digitos longus, & totidem latus (reperiuntur & duplo majores.) Quatuor digitorū interstitio ab anterio-ri circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digitos ab invicem distantia; prope caudæ exortum orbicularis incisura est in quolibet latere: cauda teres, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas of-feas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula ap-

IABEBIRETE
Brasiliensibus; Rajæ species, ejusdem magnitudinis cum Ajereba, figura autem obtusi vomeris ad la-tera extuberantia: se-
tiones prope cau-
dam ut in illa, & præ-
terea duo corpora cy-
lindracea digiti cras-
sicæ protuberantia.
Cauda longa. Color
pisci superius è cine-
reo fuscus, inferius
albus; carne probata
est & bona.

Reperitur hic & a-
lia Rajæ species præ-

codem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, iisque etiam alia quatuordecim ossa superjacent: duo autem illa ossa per membranas annexuntur aliis ossibus capitis. Cranii cavi-




tas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum latet. Promuscis tantum constat cartilagine. Oculos habet parvos, nummi misnici magnitudine: post oculos in quolibet latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacent: ad latera inferius à fine capitis in quolibet quinque oblongas incisuras. Color totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersis, magnitudine nummi misnici; inferius totum album. Cutis tota glabra lavisque. Corporis longitudine ab occidente ad exortum caudæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangulare, trium pedum & decem digitorum. Pinnarum prope caudam longitudine septem digitorum, latitudo quatuor. Capitis longitudine decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. Caudæ longitudine quatuor pedum & trium digitorum; crassities in exortu quinque digitorum, qua sensim gracilescit. Paulo post exortum caudæ superius parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longam, & mox post eam duos hamulos sibi invicem super erectos, pescatoris hamulis similes & incurvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni saporis est, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

C A P . X V I I .

Piracoaba. Corocoro. Guaticupa. Virbaco. Niqui. Guarerua.

PIRACOABA Brasiliensibus, pescis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut Zandat Pomeranorum. Os habet acuminatum, amplum, edentulum: mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars oris prominet in rotundum conum è cartilagine constantem: oculi illi satis ampli, pupilla crystallina, circulo aureo. Pinnas habet octo: nimurum duas in dorso triangulares erectas, intersticio sesquidigitum: post quamlibet branchiam unam oblongam, angustam: duas his brevioreas in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangulatam; octava est cauda furcata. Sub qualibet pinna postbranchiali barbam habet sex pilis crassiusculis constantem tres digitos fere longis, estque ejus exortus prope exortum pinnarum, vergens retrosum. Toton vestitur squamis mediocris magnitudinis argentei coloris, & in dorso ac summitate capitis paulum canescit. Pinnæ quoque omnes



omnes cani seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt. Barba alba. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

COROCORO Brasiliensibus. Piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso; pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias fatis amplas, quarum anterior pars in spinam desinit acutam: sex pinnas: nimirum in quolibet latere post branchias unam tres digitos longam, subitus in infimo corpore duas triangulares fere, sed in extremitate circinatas &



anterius firma & acuta spina suffultas, post annum unam crassa, dura & acuta spina nixam, cui parvula spina antistat. A summitate dorsi pinnas incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis suffunctata, hinc desinit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & pene ad exortum caudæ protenditur. Cauda duos digitos longa, quatuor lata. Squamis majusculis vestitur,


totus argentei coloris, sed in toto dorso & ejus summitate diluta umbra mixta & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo striæ digitum latum crassa ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnæ. Pinna dorsalis, postbranchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixta. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rima potest recondere. Capitur in mari & est edulis.

GVATVCVA Brasiliensibus, *Balabolla* Congensis, *Corvina* Lusitanis, Piscis corpore oblongo, dorso paulum, ventre minimum curvo: longitudinem duorum pedum non raro adipiscitur. Os habet acuminatum, cuius inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; dentes minimos, linguam conspicuam, branchias amplas; oculos

stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo argenteo: Pinnae obtinet septem; post quamlibet branchiam unam oblongam, duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partem; unam post annum

triangularem: unam triangularem ac altam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alteram in posteriori parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atque ad exortum pene caudæ protenditur. Cauda constat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotundis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendentis, cui tamen in dorso aureus transplendet, & ad tactum videtur lævis. Pinnae & Cauda ut & venter albican. A summitate autem branchiarum per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari; ac optimi est saporis, ut *Schelvisch* nostratum. Sæpius comedendi.

VIRIBACO Brasiliensibus, Piscis dorso incurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos longus, quinque aut sex altus, ubi altissimus. Caput & os obtusum, conum referens triangularem: dentes parvuli, acuti: lingua lata: branchiae amplæ in triangulum desinentes: oculi dupli stufieri magnitudine: pupilla crystallina, circulo argenteo, cui aliquid




cinnabri mixtum est. Pinnae habet sex, nimirum post quamlibet branchiam, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas

Z

trian-

triangulares, anterius firma spina munita: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinata, molliusculis spinis per medium suffultam, anterius autem dura & acuta spina: à summitate autem dorfi ad exortum fere cauda tendit pinnæ latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis sustentata: Cauda itidem lata in duo veluti cornua distenditur. Veitatur squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabrii transflueret. Pinnæ laterales & infimi ventris albæ seu argenteæ, dorsalis & cauda plus cinnabrii quam argentei habent. A summitate denique branchiarum ad caudam usque, (paulum arcuatim) tendit linea rubra & supra eam in posteriore parte corporis, in utroque latere, maculam habet nigrum magnitudine grossi misnici. Capitur in mari: Edulem habet carnem & bonam.


N i q u i Brasiliensibus, nostrates vocant **Pieterman**: Piscis capite crassò, ore ranæ amplio, edentulo, crassa lingua & inferiore mandibula paulo longiori quam superiori. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & teres: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus anterius quidem scsquidigatum aut paulo latior: Ocelli ipsi parvi quidem sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo ècinerco fusco. Branchias habet amplas & post quamlibet pinnam unam, digitum longam & latam, in ambitu circinata: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio dorso pinnæ ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui respondet similis in infimo ventre: Cauda plus digitum longa, minus lata, parallelogrammi figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnæ dorsalis duos habet aculeos fortes & supra postbranchiale utramque unum acutum. Tegitur cute, cuius color ex nigro & umbra, gryeoque mixtus, nimurum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus; Venter albicat, & in lateribus etiam plus albi quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, punctula nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.



In arena absconditus jacer prope littus Maris, ac incidentes vulnerat.

Edulis est si jecur & fel bene separatur, alias lethalis ut Payucu.

G V A R E R V A Brasiliensibus, piscis corpore lato, compressoque, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus, ore parvulo, denticulis minutis. Pinnas habet sex: nimurum postbranchiales duas, parallelogrammi figura; duas oblongas & latas in superiori dorso & infimo ventre posteriore, quæ in acumen desinunt, figura subulæ. Cauda quadrata, seu potius parallelogramma, unum digitum longa, & duas tertias partes digitii lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarum oræ (quarundam tantum non omnium) fimbrias habent flavas instar semilunarum. Pinnæ omnes nigrae. Circa os autem linea crassa est ferrei coloris & alia illi perpendiculariter superposita: Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum due per latas & posticas pinnas extenduntur; (caudam etiam talis linea fecit & ejusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. Oculorum pupilla nigra, circulus aureus.




C A P . X V I I I .

Araber. Guarapucu. Corororoca. Camaripu guacu. Piratia pua. Ipera quiba & Pira quiba. Curema. Parati. Aramaca. Tiburon minor.

A R A B E R I Brasiliensibus, *Sardinha Lusitanis, Belgis Spott*, pisciculus magnitudine Go-bii vel interdum major, & ejusdem figuræ; squamulis autem parvis argenteis, splendentibus instar argenti, in dorso tamen paululum è cœruleo virescit instar Harengi. Oculi illi argentei, pupilla nigra: os parvum, edentulum, cuius inferior pars paulo longior superiori; narium foraminula duo: caret branchiis. Pinnas obtinet septem; in quolibet latere unam, in summo dorso unam oblongiusculam, versus anteriora: duas junctas in infimo ventre medio: unam post anum: septima est cauda in duo veluti cornua diducta. Edulis est.

G V A R A P V C V Brasiliensibus, *Cavala Lusitanis, Nostratisbus Coninghvisch*: piscis corpore longo,

tongo, fere æqualis ubique crassitiei, excepto versus posteriora, ubi magis magisque attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrescit: & crassitatem corporis humani. Caput & os habet acuminatum, dentes acutos, rotundos, ordine positos: oculos magnos




crystallinos, circulo argenteo: Pinnae octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triangularem, directe à latere protensa: unam tenuem angustam fere in initio dorsi: post hanc unam in eodem dorso triangularem erectam, sub hac in infimo ventre triangularem, duas mediocres triangulares in infimo ventre subter postbranchiales. Cauda conflat magna pinna in duo cornua ample extensa. A pinnis autem triangularibus, tam in dorso quam infimo ventre, parvulae ordine pinnulae oblongae sunt dispositae usque ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum cœrulei, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis contorta describitur ad caudam usque. Boni est saporis.

Scomber Latinis, vide Gesnerum.

ANNO TATIO. Verum Scombro icon, quam dat Gesnerus, cum hac nostri Authoris minime convenit, propius accedit Icon Thunni, quam Venetiis missam se accepisse scribit Gesnerus. Vide & Aldrovandum lib. 11. cap. 53.

COROROCA Brasiliensibus, Lusitanis vulgo *Peixe Serra*, verum rectius *Peixe Sarda*; Piscis figura corporis, pinnis ac colore precedenti plane similis, excepto quod multis fuscis maculis per ambitum laterum variegetur. Boni quoque saporis, multum tamen cedit *Cavale*, nam caro hujus nimis sicca est. Singulari astutia & audacia escam pescatoribus subducere novit & evadere.


CAMARIPVGVACV Brasiliensibus; Piscis dorso recto, ventre paululum extuberante; pinguis ad tactum & revera. Caput habet anterius acuminatum, os amplum, edentulum, quod in rotundum diducere potest, nimirum superiore mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos juxta se vel etiam humanum caput possit admittere. Linguam habet conicam, crassam: superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut



clausum os superius habeat: oculos latiores imperiali, rotundos, crystallinos & argenteos; branchias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitatem viri: Pinnae obtinet septem; duas haud procul dissitas à branchiis, in lateribus proxime ventrem anteriorem, longas, triangulares; cuiuslibet harum parvula subest, quæ tamen natando vix videri potest: in medio inferiore ventre itidem duas conjunctas triangulares, latiores prioribus, sed breviores: has versus posticam partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pinna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, pretenditur ad caudæ fere exortum: in dorsi altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicem habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiore, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ sexta est & in amplam extenditur

tenditur furcam. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, majoribus imperiali, in dorso tamen minoribus: materia squamarum alba, pellucida instar marris perlarum: sunt autem arte sibi impositae squamae, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet ante aliam prominet pars figura lunæ bisecta, qua argento obducta est (revera representat argentum) & rivulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campo; ita totus pescis argento obductus videtur, praeterquam in dorso ubi cæruleus est, argento tamen translucere. Pinnæ omnes argenteæ, præter dorsalem, qua eundem colorem habet cum dorso. Carnem habet lentam quæ diu coqui debet; multæ in carne spinæ, sed satis crassæ ut facile inter edendum extrahi possint. Magis aspectu quam esu pescis delector: comedì sapientius ejus carnem, sed lenta est & tantum famelico conveniens. Os superius ossa habet duritie & qualia ossibus alicuius animalis.


PIRATIA PV A Brasiliensibus: Pescis hic ingentem adipiscitur magnitudinem, ut *Capuripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori: dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & medii in inferiori: os ampliare amplissime potest in rotundum foramen. Oculos obtinet non ita amplus pro corporis mole, pupilla crystallina: Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore autem est oblongo, dorso paulum incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplio. Pinnas habet septem: Vnam à summitate dorfi (incipientem versus capitis fere exortum) ad caudæ usque initium



protenfam, quoad medietatem anteriorem spinis suffultam, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio autem sui angustiorem, anterius latiore, posterius adhuc magis latam & quasi circinatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam & in extremitate circinatam, cætera quasi quadrata: sub his in insimo ventre duas propinquas sunt oblongæ, haud late, firmis spinis nixa: prope anum unam habet amplam satis, itidem circinata fimbria posterius, uti ea quæ in dorso. Corpus posterior quadrata extenditur & continet septimam pinnam pro cauda, quæ ampla est & figura pene quadrata. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiam si antrorsum mulceatur. Coloris est per totum corpus ex obscurō aureo epatici, qui tamen obscurior in dorso & summo capite: huic autem colori per totum retis in modum cinerei coloris liturae obtenduntur. Pinnæ omnes ejusdem cum corpore coloris, laterales autem præterea fimbrias habent aureas, reliquæ epaticas.

Carne satis probata est, si junior sit, nimirum sex, septem aut octo pondo; & assatus magis quam coctus, nam pinguis est: adulterio vero ducentorum aut plurium pondo carnem habet probajulis, nec delicatiorem carne *Camarupim aſu*, nimirum lentam, tenacem ac difficilis coctionis. Capitur in mari.

I PERV QVIBA & PIR A QVIBA Brasiliensibus, Lusitanis *Pixe pogador* & *Pixe piolho*, nostratis **Hunger**, quia Tiburoni adhæret suggens. Octodecim digitos longos, fere teres, quatuor



digitos crassus, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. Os habet triangulare, cuius pars superior brevior inferiori: etiam linguam. Caput superius ad dorsum usque duos digitos longum, circiter planum & figuratum ut palatum alicuius pescis striis transversis; hac parte Tiburoni firmiter adhæret in ventre & capto illo simul capitur. Oculi parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. Dentes nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiae. Post branchias utrobiusque pinnam obtinet triangularem, duos & semis digitos longam; subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius quam inferius, etiam pinna extenditur angusta usque ad caudam, quæ pinna constat sequidigitum longa. Cute tegitur per totum corpus cinerei coloris.

A N N O T A T I O. Describitur hic pescis ab Aldrovando lib. 111. cap. xxii. sub nomine *Remoræ*,

mox, & addit Iconem Imperati & suam; Auctoris nostri Iconi similem.

CUREMA Brasiliensibus, species Tainha grandis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinem excrescens, corpore oblongo, fere cylindraceo; more Trutæ fluviatilis, crassa & præpingui. Caput in conum obtusum definit, superius compressum & latum, durum, squamis duris testum. Os pro mole corporis parvum, parabolicum, labio superiori conspicuo, mobili, inferius autem os triangulare, obtusum discubabit, & paulo brevius est superiori; edentulum. Oculi magni, rotundi, anterius positi, nigri, circulo argenteo. Duo narium foramina supra os. Branchiae semilunares, haud amplæ. Pinnae habet septem (octavam pro cauda, quæ in duo cornua desinit) nimirum duas postbranchiales, triangulatas duas, magis versus posteriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, & illi oppositam in dorso ejusdem fere magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color totius piscis in summitate capitis, dorso & medietate laterum obscure cinereus, cui hyalinus transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinnæ ventris; reliqua pinnæ cum cauda ejusdem cum dorso coloris.

Præpinguis est & coctus vel assatus sine oleo vel butyro comedи potest. Salitus & in Sole siccatus ad servatur magna copia. Salitur quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

PARATI Brasiliensibus, Lusitanis *Tainha*, Belgis **Harder**, piscis est in longitudinem pedis excrescens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine & quod circum aureum habeat circa oculos. Carne est sicciori & que inter coquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur & reconduntur. Capiuntur rebus, ut & *Curema*, transiliunt autem retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exsiliunt.


ARAMACA Brasiliensibus, *Lingoaada* & vulgo *Cubricunha* Lusitanis, Soleæ est species compresso corpore & figuram habens Soleæ quam Belgæ vocant **Tonge**. Os denticulis acutis præditum: caret lingua: oculos habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum; pisi magnitudine, unum prope latus posterius oris, alterum superius & magis versus posteriora vergentem; pupilla lunata, crystallina, hyalino colore transplendente. Branchiae satis amplæ; in quolibet autem latere post branchias est pinna una, duos digitos longa, angusta, superius in pilum tenuem definit, ad branchiarum finem in infimo corpore sunt duæ parvæ pinnæ junctæ. Per totum autem corpus tam superius quam inferius secundum longitudinem habet pinnam usque ad caudam extensam, tenuem, vix semidigittatum latam; cauda fere quadrata constat pinna tenui. Vestitur squamulis parvulis, & in toto sinistro latere, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi; vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.

TIBRONIS species minor. Belgis *een Crupshape*, à figura. Convenit cum majore, ex-



cepto capite quod triangulare habet seu prout cor vulgo pingitur. Oculi parvi ad latera ipsius capitis. Os parvum, triangulare, longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, os quippe habens angustum. Caro melius sapit quam majoris.

ICON PIRAMETARA quæ supra cap. VIII.
fuit omisſa. Vide pag. 156.



CRVSTACEI PISCES.

C A P . X I X .



Guaja apara, Cancer maximus, & variae aliae Cancrorum species.

GUAJA APARA Brasiliensibus, Cancer maximus elegantissime variegatus. Corporis figura est Luna bisecta similis, in latitudine habens tres digitos, in longitudine duos & semis (quamquam & maiores reperiantur.) Testa, ut dixi, lunata est, in utroque latere posterius exsecta, & in acumina desinens. Anterior pars testae ultra medietatem coloris est obscure brunni & variegata maculis ex albo flavescentibus, & quasi solis punctulis constantibus, ac in sui medio maculam brunnam habentibus: posterior pars ex albo flavescit, striis brunnis, secundum longitudinem ornata. Pedes habet octo; singulos quatuor internodiis constantes, subrotundos, ex albo flavescentes: brachia duo, quodlibet duos & semis digitos longum & sesquidigitum latum, quodlibet parva forcipe praeditum, quibus non ita arte comprehendere potest, ut alii cancri. Est autem quodlibet brachium superius armatum & dentatum instar crista galli, ita ut quando vivus brachia corpori applicatis ea componit, uti aptissime potest, cristas duas galli sibi invicem appositas esse appareat. Tenacula repräsentat rostrum galli, brachium itaque totum rostrum galli cum sua crista. Brachia autem etiam ex albo flavescenti & maculis brunnis sunt variegata. In aquis natans per os aquam exsuffiat, quasi ex fonte exsiliret.

Gesnerus Gallum Marinum vocat & pro Cancro Heracleotico Bellonii habet.

GUAJA alia species. Corpus rotundum, paulo oblongum, juglandem cum suo viridi cortice aquat, octo habet pedes cancrinos: duo brachia, quodlibet ferre duos & semis digitos longum, at exilia; in parte extrema corporis tres haber aculeos obtusos, & oculos plane exiles. Color rotius corporis, brachiorum & pedum est albus; ac tota testa dorsi egregiis maculis brunnis ordinatim distincta, in summitate majoribus, at in lateribus, minoribus: Brachia parvulis maculis ex rufso purpureis sunt variegata: pedes albant in totum, ut & venter.

GUAJA alia species quæ rarius capitut. Corpus ellipticæ figuræ, latum, tres digitos & tandem longum aut paulo minus; testa tectus est elliptica, in ambitu multis corniculis prædicta, superius autem convallibus: ocelli parvuli ut alii: in quolibet latere pedes quatuor cum quatuor juncturis. Crura subhirsuta, & in extremitate unguem nigrum corniculi figura habentia. Anterior autem crus tres digitos longum, reliqua semper breviora unum altero. Brachiorum cum forcipibus, cujuslibet longitudine trium digitorum, crassis humani digiti, forcipe sesquidigitum longa & satis crassa. Ipsæ extremitates forcipis paulo plus sesquidigitum longæ, rostratae & exterius versus dentatae, quasi denticulis humanis, & ita apte sibi invicem quadrantes complicatae, quasi quis rostrum dentatum clauderet; in una tenacula forcipis, quæ moveatur seorsim.



tur seorsim, in medio etiam est dens albicans. Color totius cancri vivi saturate rubens, ut



pruna nostratia majora esse solent, in medio corpore saturior, reliquis partibus dilutior: extremitas tenicularum rufi cum brunno mixti, ut cerasa nigra tingere solent. Coctus retinet colorem.



GVAIA MIRI Brasiliensibus, cancerulus in falsis fluviis degens, numquam excedit pruni magnitudinem; testa illius est ellyptica, anteriore parte in multos angulos desinente: ocelli parvi, breves: brachia duo, dextrum paulo minus sinistro: crura octo, quatuor internodiis constantia, & brevibus pilis hirta: color testae ferrugineus: brachiorum & crurum obscure violaceo-purpureus. Pili crurum pallidi; inferius forcipum latus albacat.

ARATVPEBA Brasiliensibus: Cancer marinus, corpore rotundo & figura pomi. Crura habet octo: duo brachiola exigua: oculos elatos. Totum corpus tegitur testa, anteriori parte dentata, ex rubro, brunno, viridi, cæruleo, albo mire mixto colorata & punctulata, in cuius medio macula rubra, instar pyramidis fere & ad quolibet latus globus ruber depictus. Crura & brachia flavescunt ex albo, multis striis brunnis variegata. Oculi cærulescunt. Boni est saporis.



CIRI APOA Brasiliensibus: Cancer marinus, testa quasi ellyptica testus, que in medietatis anterioris ora dentata, & in quolibet latere in acutum desinit angulum; mediocris magnitudinis. Brachia habet duo mediocria, itidem dentata: sex crura & septimi & octavi loco posterius duos remiges planos, quatuor internodiis, circumcirca pilosos, quibus utitur natans. Oculi longe a se invicem distantes, parvuli, cylindracei, crassiusculi, non tamen longi & ad quemlibet cirrulus eminent instar pili. Totius testæ color fuscus seu nigricans, in qua diverso fusco cordis figura, aliisque depictæ. Brachia fusca, forcipes ex cæruleofcente albent. Crura ad medietatem internam viridi & albo mixta: medietates exteriores cæruleæ: remigum extrema pars, que lata est, cærulea, reliqua viridis & albo mixta. Corpus interiorius etiam cærulescit. Boni sunt saporis. Ciri ordinarie

ordinarii in fundo aquæ saltem ambulant, interdum tamen ad littora prodeunt cum decremente maris, sed rarius. Capiuntur maris refluxu.

C I R I O B I Brasiliensibus: ejusdem cum præcedenti est figuræ, solo colore ex parte differens: testa enim est obscure cinerei coloris, maculis olivaceis: crurum extremitas cærulea, remiges cinnabrii coloris. Brachiorum & forcipum interiora latera dilute, tenaculæ forcipum insigniter cæruleæ. Corpus inferius albicans cinnabrio mixtum.

M A R A C O A N I Brasiliensibus; cancer parvus, in locis ambulans quæ refluxu maris sicca evadunt, alio enim tempore è latibulo suo non prodit: corpore est fere quadrato, digitum longo & lato, anterius tamen paulo latior: oculi prope sibi invicem appositi, longi plus semidigitæ: tenues instar aciculae crassioris, quos erigere & apte in rima recondere potest. Os habet amplum & majus quam ceteri cancri: crura octo, quatuor interordines. Brachium dextrum ipsi maximum, tres digitos longitudine superans, satis crassum, & se totum post illud potest abscondere: forceps autem brachii latior, haud crassus, referens forcipem fætorum, extuberantiis haud acutis loco dentium prædictis; superficies brachii etiam parva tubercula habet: brachium sinistrum minimum, minus uno è pedibus, forcipula minima instar scorpionis. Crura raros habent pilos fuscos. Coloris est in testa fulvi, ut & in pedibus & minore forcipe, atque in inferiori corpore: extremitates pedum magis rufescunt. Brachium dextrum è fulvo obscure rufescit. Est edulis.


C A R A R A V N A Brasiliensibus: Cancer parvus, cuius corpus quadratum refert, cuius singuli anguli transversim abscissi, cæterum compressum, magnitudine semi digitæ. Oculi prominenti, haud longi, nigri, in angulis abscissis consistentes. Brachia brevia, forcipibus obrotundis crassiusculis: crura octo haud crassa, sed compressa. Testa cum cruribus epatici coloris, seu instar hepatis tostæ: brachia itidem: forcipes brunni coloris, qualis succus cerasorum nigrorum. Crura minutulis pilis hinc inde vestita, ejusdem cum cruribus coloris.

A G V A R A V C A Brasiliensibus: Cancer maritimus, qui mari refluentè in littore discurrit, ambari grysei, quod interdum ejicitur, admodum cupidus. Corpus quadratum, magnitudine juglandis: oculi prope invicem positi, crassiusculi, cylindracci, haud longi, paulum curvi, flavi, pupilla nigra. Crura octo, pro magnitudine illius longiuscula, haud crassa, sed magis compressa, quorum medietas pilosa. Brachia parva, dextrum paulo minus sinistro. Testæ dorsalis color cinereus & circumcirca pallide flavo umbratus: reliquum corpus, crura & brachia pallide flava: forcipes albi coloris, pili crurum pallide flavi.

C A P . X X .

Vca una cancer palustris: terrestres aliquot. Potiquiquya. Tamaru guacu.

V C A V N A Brasiliensibus: cancer in palustribus degens: corpus ejus ellipticum, superius convexum, juglandis cum suo cortice magnitudinem æquans vel etiam superans. Crura habet octo, quantu[m] juncturis: anteriora longiora, posteriora breviora: oculos haud longe distantes, cylindraceos, haud longos, quos erigit & recondit, coloris pallide flavescentis, pupilla hyalina. Brachium dextrum ipsi maximum, interius multis tuberculis acuminatis præ-



ditum,


ditum, uti & forceps: sinistrum parvum. Colore testæ superius olivaceus, flavo in extremitate intermixto. Corpus inferius pallide flavescit. Omnia crura & brachia castanei sunt coloris, forcipes etiam superius, cætera pallide flavescentia una cum tenaculis. Crura omnia inferius vestita sunt copiosis pilis longiusculis obscure castanei coloris. Carne sunt bona.

UCA GVA CV Brasiliensibus, figura & conformatio[n]e sua plane convenit cum antecedente, excepta magnitudine & colore, hic enim longe est major.



CVNVRV Brasiliensibus, fœmella est Uca una, figura & colore conveniens, solum magnitudine corporis & brachiorum differt, minor enim est quam mas & brachia habet parva, brachio maris sinistro vix æqualia, sinistrumque paulo grandi[us] dextro; raros quoque habet pilos, cum Uca una tota sit hirsuta.

GVA NHVM I Brasiliensibus: Cancer terrestris: corpus illi rotundum, sed paulum compressum: magnitudine Auriaci mali. Pedes habet octo, quinque digitos longos, quatuor internodiis: crura longis pilis vestita: os magnum & ad latera oris utrimque latitudine unius digiti hirsutum, ut & corpus: Brachia duo, dextrum magnum, sinistrum parvum; magnum longum octo digitos, latum plus duobus; parvum vix quartam partem illius æquat. Oculibini, quos instar parvæ pilæ erigit & iterum in longa cavitate abscondit: circa os quasi duo brachiola quæ recondere potest & iterum depromere, & usque ad oculos deducere. Celerrime currit, & quidem transversim, ita ut oculos ad latus convertat & branchium majus elevatum gestet. Maximo numero in silvis paludosis oberrant. Carnem habent bonam.



ARATV & ARATV PINIMA Brasiliensibus: Cancer terrestris, quadratae figuræ, corpore haud magno, testa multiplici colore picta, brunno, cœruleo, albo, rubro punctatim varie intermixtis. Oculi prominentes longe distantes, nigri, in angulis rostri positi. Crura octo, quatuor internodiis, compressa, ruffa, ac per totum maculis purpureis, nigris ac albis distincta: Chelæ duæ non ita magnæ, æquales, ruffæ, in extremitate ex albo flavescentes. In ventre etiam flavescit. Crura raris pilis nigris vestiuntur.

CIECIE ETE Brasiliensibus: *Cranguerinho des Manges Lusitanis*: corpus ad quadratam figuram accedit, & totum vix superat majoris avellanæ magnitudinem: oculi prominentes longiusculi, quos recondere potest. Crura octo: brachium sinistrum ipsi maximum, non tamen crassum, forcipis tenacula tenuia & longa, æqualia, sine dentibus: dextrum brachium tenuissimum. Testa coloris hepatici: reliquum totū corpus cum cruribus obscure flavum ex pallido. Edulis est; & Brasiliani illo curant morbum quem vocant Mia.

CIECIE PANEMA Brasiliensibus, cancer precedentis planè similis, excepto quod forcipis tenaculum inferius brevius est superiori.


POTIQVIQVIYA Brasiliensibus. Locusta marina, Belgis *Zeekreest*. Longitudo corporis à fronte ad exortum caude septem digitorum; caudæ sex: latitudo testæ dorsi septem, ventris duorum & semis: totius corporis ambitus novem digitorum & semis; caudæ ambitus quinque, quæ constat sex tabellis, septem juncturis sibi invicem appositis: & habet cauda ad quolibet latus inferius quatuor pinnas, unum digitum longas: caudæ autem finis desinat in quinque pinnas, sesquidigitum longas, unum latas: extremitates laterales cuiusque tabellæ desinunt in cornu acutum: in quolibet latere quinque habet crura, quinque internodiis constant; primum par crurum sex digitos longum, alterum novem, tertium pedem, quartum septem digitos, quintum quinque: Quodlibet autem unguem habet incurvum, acutum, pilis multis flavescentibus hirtum, instar penicilli pictorum: crus anterius crassitie digitum æquat, reliqua graciliora. Testa corporis varie tuberculata, frequentibus eminentiis instar

Aa

corni-




corniculorum rectorum , acutorum , anterius scatet . Oculi prominentes cylindracci , & post eos duo cornua surrecta antrorum inclinata , digitum longa : ante oculos supra os qua-




tuor cirri exortum sumunt , & primo duo magni pollicis humani crassitie in exortu , ubi quatuor internodiis constant , longi sesquipedem & undique spinosi ; inter hos duo minores , quatuor internodiis , teretes sine spinis , ac ultra medietatem bisecti , decem in totum digitos singuli longi .

POTI QVI QVY I X E Brasiliensibus , Squilla lata vocari potest . Vide Gesnerum .



TAMAR V G V A C V Brasiliensibus : Camaron de Salgado Lusitanis . Locusta marina species , novem digitos longa , vel paulo plus . Capitis longitudine duorum digitorum : latitudo corporis prope caudam , ubi latissima , duorum digitorum ; versus caput magis magisque angustatur . Corpus autem habet undecim quasi juncturas , quemadmodum cauda in Gammaris : in posteriora parte corporis ad quolibet latus duos habet processus subhirsutos . Totum corpus testatum est crux cancrina , albidente , splendente instar cornu politi , ad juncturas autem subnigritat aut purpurascit ; pedes in quolibet latero tres , nimurum ad tertiam , quartam & quintam junctu-

juncturam à collo numerando; exilia, duos circiter digitos longa. Caput triangulare, oliva magna sub testa albicante splendida latet, duos digitos longa. Pone caput ad quodlibet latus habet brachium unum, septem digitos longum, quatuor juncitatis constantes, estque ex-



tremā pars brachii ab ultima junctura incurvata instar falcis majoris & novē dentibus actissimis prædita: his brachiis ferit, & qui vulnerati sunt ægre sanantur. Oculos habet prominentes, oblongos: barbam cancerinam octuplam: prope oculos duas prominentias retrosum versas, digitum longas, lèves, at in extremitatibus hirsutas: infra caput adhuc octo prominentias, duos digitos longas, quæ in extremo lata tuberculata gerunt. Versus posticam corporis partem inferioris multas latas quasi pinnas habet, quæ natationi haud dubio inserviunt, & quasi folia complicata ventri inferiori adjacent. Non comeditur.

A N N O T A T I O. Male meo iudicio Auctor refert ad Locustas, cum potius ad Squillas sit referenda, neque multum differt à squilla quæ *μαύλης* dicitur, & à Rondoletio describitur lib. xviii. cap. xi. in eo tamen differt, quod in anteriori parte corporis pedes non habeat, & brachia illius non sint interius serrata.

C A P. XXI.

Guari curu. Carara pinima. Potipema. Paranacare. Potiatinga. Potiguacu.

GUARI CURV Brasiliensibus, *Gammarus* vulgo Camaraon; quatuor digitos longus: crura habet sex, tribus internodiis constantia, cum unguiculo in extremitate: anterius par crurum quasi suras habet, crassius reliquis & vicem brachiorum fungens; paulo plus duobus digitos longum: medium pars sesqui-digitum longum, ultimum paulo plus uno: omnia aculeata seu spinosa. Cirrhos processos prodeentes habet sex, duos longissimos, nimirum tres digitos singulos, verius posteriora reflexos; duos unum digitorum, & duos semidigitum: sub ore parva tenacula quatuor crassiuseula, & quatuor tenuiora, quibus cibum tenet. Oculi similes reliquis. Color totius fuscus. Cocti eduntur.

CARARA PINIMA Brasiliensibus; *Marinheiro Lusitanis*, quia arbores scandit. Cancer parvus, licet paulo major *Cararauna*, arbores manges dictas ascendens, acutissimos enim unguiculos habet, sed breves. Figura pene est ut Maotia pebuna, sed paulo major & longiori corpore atque compresso. Crura octo compresa latiora quam illius. Brachia eadem cum altera, ut & oculos. Differt colore. Testa nigra multis punctulis flavis variegata, pectus circa os etiam nigrum, refert textum panni subtilissimi linei. Oculi nigri punctulis flavis variegati, haud longi. Crura pallide flavescientia, fimbriata circumcirca miniatu colore, & minutissimis pilis fuscis vestita: brachia rufescunt & forcipes pilis nigris crassis vestiuntur.

POTIPEMA Brasiliensibus: *Gammarus* prælongis brachiis: corporis longitudo quatuor digitorum, eadem crassities, ubi crassissimus: cauda plus quatuor digitos longa; sex constantes juncitatis. Crura sex: brachia duo, novem digitos longa, subrotunda, circiter digitum humanum crassa, quinque juncitatis constantia, sexta est tenaculum, pene duos digitos longum & aliquot minutulus dentibus munitum ex adverso stantibus: Ante hæc brachia, adhuc duo paria brachiorum habet. Barba illi octupla, quælibet sex pilis constantes tenuibus & ternis sibi invicem appositis, duabus autem singulatim positis, quarum quilibet pilus novem digitos

longus,

A a 2

longus, suntque duo crassiores reliqui: inter oculos ferrata eminentia est: dorsum autem planum, uti & cauda. Carnem habent bonam. Color totius testæ pallidus, crassis striis cincis secundum longitudinem variegatus: brachia sunt inferius cinerea, superius obsoleti coloris instar ligni querri veteris. Oculi nigri; cirrhi albi.

P A R A N A C A R E Brasiliensibus: Gammarus in concha degens, haud edulis: tres digitos longus: brachia habet duo cum forcipibus: crura quatuor longissima, nimirum tres digitos longa & post hæc quatuor plane brevia; caudam sesquidigitum longam instar aliorum gammarorum; oculos longos & prominulos: duos cirrhos pro barba. Corpus testa obscure castanei coloris; ejusdem coloris est & cauda, nigris striis secundum longitudinem variegata, corpus inferius & exortus crurum & brachiorum interius cærulescunt, uti & oculi & barba; per totum corpus habet pilos ochreæ coloris. Concha quam inhabitat ferme quatuor digitos longa, turbinata coloris pallide subflavescens. Varia autem magnitudinis reperiuntur: plane parvulae, magnitudine minoris pruni, turbinatae & variis tuberculis acuminatis præditæ, pallidæ, rufescentes, nigrae, ad littus prope fluvium Paraiba.

A N N O T A T I O. Cancelli in variis testis habitant, de quibus vide Rondoletium libro XVIII. cap. XII.

P O T I A T I N G A Brasiliensibus; gammarus tres digitos longus, annularem digitum crassus. Crura habet duodecim, brachiola plane exigua: duos cirrhos ipso animali longiores: oculos nigros: cornu acutum & dentatum in capitib summitate. Color totius candicans & punctulatis minimis hepatici coloris per totum variegatus. Comeduntur cocti. Capiuntur magna copia pluviosis mensibus, nimirum Iunio, Iulio & Augusto.


P O T I G V A C V Brasiliensibus est præcedenti plane similis, excepto colore, qui in hoc est nigricans; brachia quoque eadem, verum tantum filii crassioris crassitie.

C A P . X X I I .

Reri. Reri apia & Zoophyta quedam.

R E R I Brasiliensibus, sunt ostrea. Duæ autem hic reperiuntur species. *Reriete*, Lusitanis *ostræ dos mangues*; & *Reripa*, Lusitanis *ostræ de pedras* aut *do fundo d'água*. Maxime autem ac omniū optimæ inveniuntur copiosissime in fluvio Senembia aut S. Michaelis, & guaritiba portu Fluminis S. Francisci, ut pote quas in quinque aut sex partes scindere oportet antequam edantur. Potyipeba etiam habet, sed mediocres: Itamaraca parvas ad Tapecima. Paraiba etiam parvas. Nhamdias ad R. Grande mediocres.

R E R I A P I Y A Brasiliensibus, vulgo *Langhals*; Hydrum vocari posse puto. Orientur è pice navalí subter naves immediate adhærentes tabulis innumera copia: corpus est autem unum aut duos digitos longum, teres, æqualiter crassum, crassitie dupla pennæ anserinæ: huic annata est conchula figuræ ovalis, magnitudine olivæ, major aut minor, constatque quinque partibus, albi coloris, sed ubi partes coaluerunt crocei, non dura sed molliuscula est conchula: in uno latere rimam habet, per quam capitulum suum exserit, constans multis elegantibus quasi tornatis filamentis, lunatis, semidigitum longis: color corporis est fuscus seu nigricans, ut & filamenta capitis. Immediate autem pici inhærent, quasi corpus abscissum est & agglutinatum abscissa parte, nec unquam à navis se possunt solvere, nisi vi abstrahantur.



hantur. Multa millia s̄epe uni navi adh̄erent, pr̄sēritim proram versus inferius, & navis cursum retardare dicuntur. Vivunt multas horas detrācti extra aquam.

Reperitur & hic alia *Reri apya* Brafiensibus, *Craca de navios* Lusitanis. Navibus & aliis etiam conchis annascuntur variae figuræ testæ duræ è gryseo subrufescentes, in quarum qualibet latet informis massa alba, prominentias longas subflavescentes habens, instar cirrhorum cancerorum; superius tegitur testa triangulari pallida, quam secundum medietatem aperit, & cirri illi videntur, movet enim se.

S T E L L A Marina, Zoophyton est serpens in arena in fundo maris. Radiis novem erat hæc

quatuor & semis digitos longis, semi-digitum fere latis in exortu, in fine acuminatis: corpus rotundum pataci magnitudine: radii in ambitu brevibus & acutis aculeis cinguntur: totius color superius cinereus & tuberculis quadratis albicantibus præditus, in lateribus radii sunt ochræ coloris, inferius tota stella è flavo albescit. Substantia illius nec caro nec cartilago nec os, sed cartilaginis æmula, frangitur tamen instar panis Maizii. In medio corporis inferius seu in centro, foraminulum habet rotundum pisi magnitudine, per quod nutrimentum suum attrahit, intus ubique cava & composita quasi spinæ essent piscium, sed non sunt. Vivebat adhuc quando piscator afferebat.

Aliam quinquangularem habui stellam, cuius radius quilibet erat se-

mipedem longus; superius rotunda concha & quasi in quinque tubera elata, inferius magnam habens cavitatem. Per totum tuberculis insigniebatur elegantibus, qua cuborum quasi angulis ordine erant disposita, & in tuberculata linea, quasi rete obductum fuisset.


A N N O T A T I O. Hæc itaque fuerit *Stella reticulata* seu *Cancellata* Rondoletii; cuius & Gesnerus meminit; apud quos videre est accuratas icones.

Z O O P H Y T O N aliud hic reperitur (*Stella arborescens* Rondoletio & Gesnero) nautis vulgo een *Zeesonne*. Ex centro, quod æquabat grossum misericordum & cavum erat, ac in sui medio quinquangulare, habebat foramen instar Stellæ, tenuissimis quasi denticulis donatum: quinque rami crassi prodibant, qui deinde instar arboris in multos alias ramos minores dispergebantur, varie inter se inflexos, omnes rotundi & quasi coraliformes, ita ut orbem facerent; materia fragilis instar stellæ.

Z O O P H Y T O N aliud hic visitur, quod *Ren marinus* possit vocari à figura, est enim figuræ ellipticæ, quinque digitos longum, compressum, interius canum, in exteriori superficie fere æquale, nisi quod superius punctulatum in aliquot angulos leviter fastigiat. Fragile est. In medio inferius foraminulum habet. Coloris est in totum offe canescens.

Z O O P H Y T O N aliud, imperialis magnitudine, vel etiam duplo aut triplo majus, circinatum, grossi misericordiæ crassitie, fragili materia constans, albissimi coloris. In sui medio stellam quinquangularem subtilissimam quasi insculptam monstrat, & è regione quatuor extremitatum stellæ (non quinque) cylindricum est foramen pervium: quintum foramen non est è regione quinti anguli, sed è regione inter duos angulos stellæ obtusos.

A N N O T A T I O. Animalia quæ hic ab Authore nostro inter Zoophyta describuntur, ab aliis Scriptoribus non inter Zoophyta, sed inter crustata referuntur, illa enim non habent testas. Iconem autem stellæ arborescens Auctoris nostri non addidi, quia accuratissima extat apud Gesnerum.





GEORGI MARCGRAVI
HISTORIAE NATURALIS
BRASILIÆ
LIBER QVINTVS,
Qui agit de Avibus.

Vix credo ullibi elegantiores Aves reperiri quam in Brasilia, si varietatem plumarum & colorum species; verum nulla fere suave canit, ita ut cantu longe à nostris superentur.

CAPUT PRIMUM.

Nbanduguacu. Iacana, variae ejus species. Curicaca.

NHAN DVG VACV Brasiliensibus, *Ema Lusitanis*; *Struthio Avis*. Ingentes hic reperiuntur, minores tamen aliquanto Africanis. Longa illi crura, inferiora sesquipedem, superiora pedem circiter longa. Tres habent in pedibus digitos anterius versos, unguibus nigris, crassis, haud acutis præditos; posterius unum digitum, sed rotundum, grossum, unde difficulter in area lævi aut tabulato possunt incedere, sed facile labuntur. Collum gestant incurvatum ut cignus vel ciconia; longitudine circiter duorum pedum: caput anserinum, oculos nigros habent pulchros; rostrum compressum, non admodum latum, duos & semis digitos longum. Alas habent parvas & ad volandum ineptas, quarum tamen unam instar veli erigentes citissime cursum promovent, ut vix ac ne vix quidem à cane venatico superari possint. Plumas habet gryreas per totum corpus ut grus, in dorso longiores & elegantiores, & corpus plumis testum fere rotundum appetat. Caudam non habet ejusmodi criftis præditam ut vulgo pingitur, sed plumæ sunt per dorsum expansæ ad anum usque. Tesseras luforias aliaque fermenta lubenter deglutit, sed non concoquit, at integra per anum reddit: vescitur fructibus & carne. Frequens in Capitanie Serigippo campis, itemque in Capitanie Rio Grande. In Pernambuco non visitur. Caro illius bona ad commedendum.

IACANA Brasiliensibus, gallina aquatica, *Waterhun*, diversæ reperiuntur illius species, colore differentes. Hæc elegantissima, magnitudine columbae, sed cruribus multo longioribus, flavi coloris cui viriditas immixta. Crura inferiora plus quam duos digitos longa, superiora (maximam partem nuda ut aquaticis) paulo minus: quatuor habet in pedibus digitos, quorum medius è tribus anterius versus, duos digitos longus, reliqui duo paulo breviores, quartus retroversus versus, pedem aut etiam amplius longus: omnes autem unguibus semidigitum longis & flavis armantur. Cauda brevis ut gallinæ silvestris; pennæ in dorso, alis & ventre ex viridi & nigro mixtae, sub cauda alba; versus collum & in toto collo & pectori ejusdem coloris cum plumis que in collo pavonum aut columbarum quarundam visuntur. Caput habet parvum, ut Gallina silvestris, quod tegitur membranaceo quadam tegumento rotundo coloris ut gemma Turcois: rostrum rectum gallinaceum, plus uno digito longum; ab initio ad medietatem egregii miniati coloris, reliqua pars eximi flavi, cui aliiquid viriditatis admixtum. Frequentissima in



palustri