

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Aa bis Alaun

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1774

Illustration: Ackerdrösel.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10786



Naturl. I B.



Uckeley, der klebrichte. m) Seine Blättchen sind bey-
 nahe in drey Lappen zertheilt, der Stamm ist haarig
 und ziemlich entblößt; er trägt auch meistens nur eine
 Blume. Die ganze Pflanze, welche bey Montpellier
 wild auf dem Felde wächst, ist ohngefähr anderthalb
 Hände hoch und überall mit klebrigen Haaren bekleidet.
 Die dreyfache Wurzelblätter haben gestielte Blättchen,
 die bis an den Stiel dreyfach getheilet sind. Selten fin-
 det man hier mehr Stammblätter, als eines, das ebens-
 falls dreyfach und mit lanzenförmigen Blättchen be-
 setzt ist.

Uckeley, der rosenförmige. S. oben Uckeley, der
 Gärten.

— — wilder oder gemeiner. S. oben Uckeley.

Uckeleyblumen. Hanov. }
 Uckeleyglöcklein. Gled. } S. Uckeley.

Uckerbacillen. S. Meerfenchel.

Uckerbeeren. S. nördländische Hindbeeren.

Uckerbetonien. S. Zeisigkraut.

Uckerbohnen. S. Saubohnen.

Uckerchamillen. Streichblumen. S. Krötendill.

Uckerchondrille. S. Chondrille.

Uckerdistel. S. Scharrenkraut.

— — gemeine. S. Distel.

Ackerdrossel, die rosenfarbige, mit fliegendem Feder-
 busch. Sall. Die rosenfarbige oder fleischfarbige Am-
 sel

m) *Aquilegia viscosa*, caule subnudo, subunifloro, piloso, folio-
 lis subtrilobis. Tourn. *Aquilegia hirsuta*, flore viscoso.
 Tourn. S. *Onom. Bot.* I. 672.