

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Entomologisches Taschenbuch für  
Schmetterlings-Sammler**

**Müller, C. L. von**

**Breslau, 1800**

**VD18 12297070**

April.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-7932**

6. Sph. Elpenor. L. Entschlüpft zu Ende dieses Monats der Puppe, und zeigt sich des Abends im Fluge.
7. Sph. Porcellus. L. Kommt ebenfalls schon oft in diesem Monate aus der Puppe.
8. Bomb. Pavonia minor. L. Das Männchen fliegt am Tage.
9. Bomb. Hicifolia. L. Kommt in diesem Monate bey warmer Witterung zum Vorschein, und verbirgt sich in den Ritzen der Bäume.
10. Bomb. Versicolora. L. An den Stämmen und Zweigen der Birken, Erlen und Weiden.
11. Bomb. Nubeculosa. Esp. In Waldungen an Baumstämmen.
12. Bomb. Cassinia. Esp.
13. Noct. Lolii. Bomb. Esp. An Zäunen und Mauern.
14. Noct. Rumicis. Esp.
15. Noct. Erythrocephala. Esp. Ende dieses Monats an Baumstämmen.
16. Phal. Diversata. Borekh. In Föhren-Waldungen, wo sie gemeiniglich platt auf der Erde sitzt.
17. Phal. Pascuaria. Borekh. Auf Wiesen und lichten grasigten Plätzen in Wäldern.

## April.

1. Pap. Cardamines. L. In lichten sumpfigten Waldungen.
2. Pap. Aegaeria. L. Am häufigsten in sumpfigten Erlen-Brüchen.
3. Pap. Polichloros. L. In Gärten und an Häusern.
4. Pap. Polixena. W. W. Zeigt sich in einigen warmen Gegenden Deutschlands; das eigentliche Vaterland ist Ungarn und Frankreich. 5.

5. Hesp. Minimus. Pap. Esper. Auf dem Vorsaum der Wälder.
6. Sph. Elpenor.
7. Sph. Porcellus.
8. Bomb. Rubi. L. Gegen Ende dieses Monats zeigt das Männchen sich am Tage im schnellen Fluge.
9. Bomb. Lucifera. W. B.
10. Bomb. Roboris. Esper.
11. Bomb. Curtula. Esper. Zeigt sich zu Anfange dieses Monats.
12. Bomb. Cossus. L. An Weidenstämmen.
13. Bomb. Anastamosis L. Zu Ende des Monats.
14. Bomb. Argentina. W. B. Zu Ende dieses Monats an Eichenstämmen.
15. Bomb. Palpina. L. An den Stämmen der Weiden, Espen, oder den daran nahe gelegenen Säunen und Mauern.
16. Bomb. Hamula. W. B. Auf Espen, Eichen, Weiden und Birken.
17. Bomb. Sricula. W. B. Zu Ende dieses Monats auf Buchen, Eichen, Schlehen und Weiden.
18. Bomb. Lupolina. Esp. An Säunen und Gemäuern.
19. Bomb. Nemorosa. Esp. In lichten Waldungen im Grase.
20. Bomb. Fuliginosa. L. An Säunen und Mauern.
21. Bomb. Terifica. W. B. An den Stämmen der Pappeln.
22. Bomb. Chaonia. W. B.
23. Noct. Parthenias. L. Zu Anfange dieses Monats in lichten Laubwaldungen, wo sie sich im hervorsprossenden Grase gern niederläßt.

24. Noct. Glyphica. L. Fliegt am Tage, und nährt sich von dem Saft der Blumen.
25. Noct. Mi. L. Zeigt sich in Gesellschaft der Glyphica.
26. Noct. Fimbria. L. An den Stämmen der Bäume und Gartenmauern.
27. Noct. Puella. L. Im Grase in Laubwaldungen.
28. Noct. Pallens. Esper.
29. Phal. Margaritaria. Hübn. Auf Eichen und an den Stämmen derselben.
30. Phal. Vibicaria. Esp. Im Grase in lichten Laubwaldungen.
31. Phal. Dolabraria. Fabr. Auf Eichen.
32. Phal. Consobrinaria. Vorkh. Auf italienischen Pappeln.
33. Phal. Pascuaria. L. Auf Wiesen und lichten grasigten Plätzen in Wäldern.
34. Phal. Prodromaria. W. V. An den Stämmen der Linden, Weiden, Eichen und Birken.
35. Phal. Hirtaria. Fabr. An den Stämmen der Linden, Pappeln, Weiden, Ulmen, Kirschbäumen und allen Arten Pflaumenbäumen.
36. Phal. Zonaria. W. V.
37. Phal. Murinaria. Fabr.
38. Phal. Marginaria. Fabr. An den Stämmen der Linden und Birken.
39. Phal. Atomaria. L. Auf Wiesen und grasreichen Stellen in Wäldern, auch auf den niedrigen Gesträuchen.
40. Phal. Glarearia. Vorkh. Zeigt sich in Gesellschaft der vorigen.

41. Phal:

41. Phal. Diversata. Vorkh. In Föhren-Waldungen.
42. Phal. Garpinata. Vorkh. In niedrigen Gebüsch.
43. Phal. Hexapterata. Fabr. An den Stämmen der Pappeln, Ahorn und Rüstern.
44. Phal. Derivata. Fabr. In Gärten und Gebüsch.
45. Phal. Tristata. L. In Gärten und Wäldern, an Säunen, Bretterwänden und Baumstämmen.
46. Phal. Euphorbiata. L. Im Grase in Waldungen und Wiesen.
47. Piral. Purpuralis. L. Auf Weidungen im Grase.
48. Piral. Ptybridalis. Hübner.

## May.

1. Pap. Sinapis. L. In lichten Laubwaldungen, wo niedrige Gebüsch stehen.
2. Pap. Medea. Herbst. Auf freyen Grasplätzen an Waldungen.
3. Pap. Dejanira. L. In Waldungen und Haiden.
4. Pap. Levana. L. In freyen Waldungen.
5. Pap. Lucina. W. V. In lichten Waldungen.
6. Pap. Eufrosine. Esper. In Wäldern auf freyen Grasplätzen.
7. Pap. Pamphilus. L. Auf Wiesen und Waldungen überall.
8. Pap. Hero. L. In lichten Waldungen, in gebirgigen Gegenden.
9. Pap. Eupheno. L. In den Gegenden von Marseille nicht selten.
10. Pap. Tarpeia. Esp. In Rußland und Kamtschatka.
11. Pap. Celtis. Esp. In Tyrol und Ungarn.
12. Pap. Machaon. L. Sucht sich zum Fluge freye Stellen aus.

13. Pap.