

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Entomologisches Taschenbuch für  
Schmetterlings-Sammler**

**Müller, C. L. von**

**Breslau, 1800**

**VD18 12297070**

July.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-7932**

## July.

1. Pap. Apollo. L. In verschiedenen Gegenden Deutschlands häufig.
2. Pap. Grataegi. L. In Obstgärten.
3. Pap. Prasticae L. In Kohlgärten.
4. Pap. Napi. L. In waldigten Gegenden.
5. Pap. Rapae. L. In Kohlgärten.
6. Pap. Maegaera. L. An Wegen und Mauern.
7. Pap. Galathea. L. Auf blumigten Wiesen.
8. Pap. Hermlone. Herbst. Auf freyen Plätzen in Waldungen, wo er sich mit flach niedergebognen Flügeln an den Baumstämmen fest.
9. Pap. Thitonus. Herbst. In großen Laubhölzern auf den niedern Gebüsch der Unterhölzer.
10. Pap. Panira. L. Auf Wiesen.
11. Pap. Cardui. L. Auf freyen Plätzen und feuchten Stellen der Wege.
12. Pap. Populi. L. In Laubwaldungen an den feuchtesten Stellen der Wege.
13. Pap. Sybilla. W. W. In Wäldern auf blumenreichen Plätzen.
14. Pap. Paphia. L. Auf lichten Stellen in Waldungen wo Himbeersträucher stehn.
15. Pap. Aglaia. L. In lichten Waldungen auf Blumen.
16. Pap. Lathonia. L. Auf Wiesen und in Wäldern.
17. Pap. Euphrosine. Esp. Auf freyen Plätzen in Wäldern.
18. Pap. Niobe. L. Auf freyen blumenreichen Stellen in Wäldern.
19. Pap. Tiphon. Herbst. Auf Wiesen so nahe an Wäldern liegen.

20. Pap. Arcanitus. L. Auf Grasplätzen in lichten  
Waldungen.
21. Pap. Camilla. W. V. In der Gegend um Wien  
und in der Schweiz nicht selten.
22. Pap. Tindarus. Esp. In der Schweiz.
23. Pap. Castar. Esp. 24. Pap. Pollux. Esper. Eben-  
falls in der Schweiz.
25. Pap. Arethusa. Esp. In Wäldern.
26. Pap. Clitie. Esp. Auf blumigten grasreichen  
Stellen in Wäldern.
27. Pap. Eudora. Esp. Einzeln auf Wiesen und Fel-  
dern so an Waldungen grenzen.
28. Pap. Cassioides. Esp. Auf den Wiesen der höchsten  
Alpen in Cärnten.
29. Pap. Melas. Herbst. Auf den höchsten Alpenge-  
birge.
30. Pap. Machaon. L. Auf freyen Stellen in Wäldern.
31. Pap. Podalirius. L. An freyen und offenen Derrern.
32. Pap. Sinapis. L. In und an lichten Laubwäldern.
33. Pap. Hyale. Esp. Auf Waldwiesen.
34. Pap. Rhamni. In Gärten und Laubhölzern.
35. Pap. Dejanira. L. In Wäldern und Haiden.
36. Pap. Antiopa. L. Auf Wegen und an Plätzen wo  
viele Weiden stehen.
37. Pap. Iris. Esp. 38. Pap. Iris, luteus. Esp. 39.  
Pap. Iris rubescens. Herbst. 40. Pap. Iliä. W. V.
41. Pap. Jole. W. V. Auf freyen und feuchsten  
sonnenreichen Plätzen in und an Waldungen.
42. Pap. C. album, L. In Gärten und auf Wegen.
43. Pap. Athalia. Esp. 44. Pap. Pilossellae. Esp.  
Zeigen sich gemeinschaftlich auf grasreichen  
Stellen in und an Waldungen.
45. Pap.

45. Pap. Dictinna. Esper. Auf lichten Waldplätzen.
46. Pap. Davus. Herbst. Auf Wiesen.
47. Pap. Lucilla. W. B.
48. Hesp. Ilicis. Vorkh. In Eichenwäldern, auf grasigten und blumenreichen Plätzen.
49. Hesp. Linceus. Vorkh. Um Schlehenstauden.
50. Hesp. Quercus. L. In Eichenwäldern und Gärten.
51. Hesp. Tiresias. Esp. In Gärten und blumigten Anhöhen.
52. Hesp. Virgaurea. L. Auf hochliegenden Wiesen.
53. Hesp. Thetis. Esp. Auf blumigten Anhöhen.
54. Hesp. Amphion. Esp.
55. Hesp. Hipponoe. Esp. In bergigten Gegenden.
56. Hesp. Biton. Esp. Ebenfalls in bergigten Gegenden.
57. Hesp. Helle. W. B. In freyen Waldungen.
58. Hesp. Xanthe. Vorkh. Auf Wiesen und in Waldungen.
59. Hesp. Alsus. Esper.
60. Hesp. Arion. Esp. In lichten Waldungen und Wiesen.
61. Hesp. Argus. Esp. An den Rändern der Waldungen, wie auch in Gärten und Wiesen.
62. Hesp. Argiolus. Esp. In Gesellschaft des vorigen.
63. Hesp. Hippothoe. L. Auf Waldwiesen.
64. Hesp. Thaumias. Vorkh. Zeigt sich in Gesellschaft des comma.
65. Hesp. Comma. L. In lichten Waldungen.
66. Hesp. Actaeon. Vorkh.
67. Hesp. Semicolon. n. Sp. In lichten Waldungen.
68. Hesp. Amphidamas. Vorkh.
69. Hesp.

69. Hesp. Sylvanus. Esp. In und an lichten Waldungen.
70. Hesp. Melicerta. Vorkh. In lichten Wäldern.
71. Hesp. Paniscus. Vorkh. In freyen Wäldern.
72. Hesp. Fritillarius. Vorkh. Auf Wiesen, Wegen und in Wäldern.
73. Hesp. Altheae. Vorkh. Auf Wiesen und in lichten Wäldern.
74. Hesp. Tages. Esp. In lichten Waldplätzen.
75. Sph. Fenestrina. W. B. Auf Wiesen, fliegt am Tage in heißer Sonne.
76. Sph. Pinastri. L. Unten an den Stämmen der Fichtenbäume.
77. Ses. Muscaformis. Vorkh.
78. Ses. Formicaeformis. Vorkh.
79. Ses. Tipuliformis. L. Auf den Blättern der Johannissträucher.
80. Ses. Vespiformis. Esp. Zur Mittagszeit auf den Blüten der Bäume.
81. Ses. Culiciformis. L. Am Tage auf den Blüten der Bäume.
82. Ses. Oestriformis. Esp. Auf Blumen in Wiesen.
83. Ses. Spheciformis. Esp. Auf den Blüten des Jasmins.
84. Ses. Asiliformis. Esp. Ebenfalls doch nur einzeln am Tage auf den Blüten des Jasmins.
85. Zig. Loti. W. B. Auf freyen Stellen, an Waldungen.
86. Zig. Scabiose. Esp.
87. Zig. Pilosellae. Esp.
88. Zig. Lonicerae. Esp. Auf freyen Stellen in Waldungen, auf Distelblumen.
89. Zig. Meliloti. Esp. 90. Zig.

90. Zig. Exulans. Esper. Auf den höchsten Schneegebirgen.
91. Zig. Statices. L. Auf Blumen in Wiesen und Wäldern.
92. Bomb. Flexula. W. B. In Eichenwäldern.
93. Bomb. Potatoria. L. Das Männchen zeigt sich oft am Tage.
94. Bomb. Quercus et var. L. Im Grase versteckt. Das Männchen zeigt sich am Tage im Fluge.
95. Bomb. Furcula. L.
96. Bomb. Castrensis. L. Gegen Mitte dieses Monats.
97. Bomb. Pythiocampa. Fabr. In Fichten und Föhrenwäldern.
98. Bomb. Caia. L. In Gärten an den Zäunen und Hecken.
99. Bomb. Maculosa. Esp.
100. Bomb. Villica. L. Zeigt sich, obgleich selten, am Tage im Fluge.
101. Bomb. Mendica. L. An Zäunen.
102. Bomb. Pulla. Esp. Im Grase auf Wiesen.
103. Bomb. Dromedarius. L. An den Stämmen der Weidenbäume.
104. Bomb. Purpurea. L. Sehr versteckt an Zäunen und an andern verborgnen Orten.
105. Bomb. Russula. L. Im Grase.
106. Bomb. Graminis. Esp. Bey Tage im Grase.
107. Bomb. Grammica. W. B. In lichten Waldungen an den Grasstengeln.
108. Bomb. Cuculla. Esp.
109. Bomb. Rosea. Esp. Auf den Blättern der Eichen.

110. Bomb. Flavia. Esp.
111. Bomb. Cucullatella. Esp.
112. Bomb. Dominula. Fabr. Bey Tage auf den Blumen der Disteln.
113. Bomb. Jacobaeae. Fabr. Auf den Blüten der Jakobsklumen.
114. Bomb. Rubricollis. Fabr. In Wäldern und Kornfeldern, an Grassängeln.
115. Bomb. Lacertula. W. V. In jungen Birkengebüsch.
116. Bomb. Hera. Fabr. Am Tage sehr lebhaft, und zeigt sich oft zahlreich in schattigten Wäldern, auf den Altig, oder andern schirmtragenden Pflanzen.
117. Bomb. Plantaginis. Fabr. In Wäldern im Grase.
118. Bomb. Velitaris. Esp.
119. Noct. Lusoria. Esp. Fliegt am Tage in Wäldungen.
120. Noct. Oo. Esp.
121. Noct. Sponsa. L. An den Stämmen der Eichen, Weiden und Buchen.
122. Noct. Promissa. Esp. An den Eichenstämmen.
123. Noct. Nupta. L. Zeigt sich oft in unsern Zimmern, wo sie in ruhiger Lage an den Wänden sitzt.
124. Noct. Paranimpha. L.
125. Noct. Pacta. Esp. An den Stämmen der Bäume.
126. Noct. Maura. L. In den schattigten Gebüsch der Erlen, wo gemeinlich die Bäche damit bewachsen sind.

127. Noct. Leucomelas. Esp. In Fichtenwäldern.  
 128. Noct. Nigricans. Esp. In Fichtenwäldern.  
 129. Noct. Pinastri. L. In Fichtenwäldern an den  
 Stämmen der Bäume.  
 130. Noct. Gamma. L. Am Tage im Fluge auf  
 Blumen.  
 131. Noct. Turca. Esp.  
 132. Noct. Tridens. Esp.  
 133. Noct. Linariae. Esp. Des Abends auf wohl-  
 riechenden Blumen.  
 134. Noct. Trigrammica. Esp. An den Stämmen  
 und Zweigen der Eichen, wo sie leicht durch  
 Erschütterung herunter fällt. Sie fliegt auch  
 am Tage, doch mehr des Abends auf wohlrie-  
 chende Blumen.  
 135. Noct. Strigula. W. V. An den Stämmen  
 der Bäume.  
 136. Noct. Glyphica. L. Am Tage auf Blumen.  
 137. Noct. Meticulosa. L. An den Mauern und  
 Gartenzäunen.  
 138. Noct. Plecta. L.  
 139. Noct. Psi. L. An Mauern und den Stäm-  
 men der Kastanien.  
 140. Noct. Argentea. Esp.  
 141. Noct. Diffinis. L.  
 142. Phal. Aestivaria. Hübner. Auf Waldwiesen.  
 143. Phal. Bupleuraria. Fabr. Auf Wiesen und  
 Hecken unter dem Getraide.  
 144. Phal. Viridata. L. Auf grasreichen Plätzen  
 in Wäldern.  
 145. Phal. Lineolata. W. V. Auf der Erde in  
 lichten Waldplätzen.

146. Phal. Palumbaria. W. B. Auf der Erde in Wäldern.
147. Phal. Virgaria. Vorkh. Auf grasigten Waldplätzen.
148. Phal. Aureolaria. Fabr. Auf Wiesen.
149. Phal. Angularia. W. B. In Laubwäldern.
150. Phal. Erosaria. W. B. In Eichenwäldern.
151. Phal. Quercinaria. Vorkh. In Laubwaldungen.
152. Phal. Lunaria. W. B. An den Stämmen der Obstbäume und Laubwälder, auch an den nahe gelegnen Zäunen und Bretterwänden.
153. Phal. Notataria. W. B. In Erlengebüschen.
154. Phal. Flavicaria. W. B. In Wäldern.
155. Phal. Apiciaria. W. B. In Wäldern.
156. Phal. Consobrinaria. Vorkh. An Italienschen Pappeln.
157. Phal. Piundularia. Vorkh. An den Stämmen verschiedener Bäume.
158. Phal. Ononaria. Vorkh. In Gegenden wo Hauhechel steht.
159. Phal. Atomaria. L. In Waldungen, im Grase und niedern Gebüsch.
160. Phal. Glarearia. Vorkh. In Gesellschaft der Atomaria.
161. Phal. Dentilinea. Vorkh. In lichten Laubhölzern.
162. Phal. Immorata. L. Auf Waldbwiesen und grasigten Mäsen.
163. Phal. Liturata. L. Auf jungen Föhrenstämmen.
164. Phal. Pusaria. L. In lichten Buschwäldern.

165. Phal. Exanthemaria. Vorkh. In Gesellschaft  
der Pusaria.
166. Phal. Dubitata. L. In Gärten an Bretter-  
wänden.
167. Phal. Rhamnata. Vorkh. An Hägen und  
in Laubwaldungen.
168. Phal. Consignata. Vorkh. In Gärten an  
Zäunen und Bretterwänden.
169. Phal. Undulata L. In Birken, Erleu, Saal-  
weiden, und Espengebüschen.
170. Phal. Rubricata. Fabr. In Grasgärten und  
andern grasigten Plätzen.
171. Phal. Badiata. W. B. In Laubgebüschen.
172. Phal. Plagiata. L. In Gärten und grasigten  
Anhöhen.
173. Phal. Rectangulata. L. In Gärten an den  
Bretterwänden.
174. Phal. Psittacata. Fabr. An Baumstämmen.
175. Phal. Olivata. Vorkh. An Birkenstämmen.
176. Phal. Chenopodiata. L.
177. Phal. Fulvata. W. B.
178. Phal. Associata. Vorkh. In Gärten an  
Baumstämmen.
179. Phal. Ocellata. L. In Gärten und Gebüschen.
180. Phal. Prunata. L. In Gärten an Bretter-  
wänden und an den Stämmen der Obstbäume.
181. Phal. Rubidata. Vorkh. In Gärten an Bret-  
terwänden.
182. Phal. Adaequata. Vorkh. In Gärten.
183. Phal. Cucullata. Vorkh. In Erlengebüschen.
184. Phal. Decorata. W. B. In Wäldern.
185. Phal. Ornata. Fabr. Im Grase in Gärten und  
lichten Wäldern.
- 186.

186. Phal. Auroraria. Borch. In Wäldern.
187. Phal. Farinata. Borch. In lichten Gehölzen, und trocknen Grasplätzen.
188. Phal. Dealbata. L. In grasreichen Wäldern und im Grase.
189. Phal. Temerata. W. B. In Wäldern.
190. Phal. Aversata. L. Auf Waldwiesen.
191. Phal. Remutata. L. In Gärten und Wäldern.
192. Phal. Inimutata. L. In Wiesen.
193. Phal. Sylvestrata. Borch. In Grase auf Waldwiesen und trocknen Waldplätzen.
194. Phal. Virgulata. W. B. In Wäldern.
195. Phal. Nemorata. Borch. In Wäldern.
196. Phal. Mobilata. Fabr. In Gärten an Säulen, Bretterwänden und Baumstämmen.
197. Phal. Scutellata. Fabr. In Gärten.
198. Phal. Bisetata. Borch. In Waldwiesen.
199. Piral. Rostralis. L. In Gehägen mit Höpfen verwachsen nicht selten.
200. Piral. Crassalis. Fabr. In Gärten wo viele Brennesseln stehen.
201. Piral. Proboscitalis. L. Ebenfalls in Kesselfeldern reichlichen Gegenden.
202. Piral. Pinguinalis. L. In kalten Häusern.
203. Piral. Atralis. Hübner. Bey Städten und auf den Straßen.
204. Piral. Porvicalis. W. B.
205. Piral. Punicealis. W. B. Auf grasreichen Plätzen.
206. Piral. Purpuralis. L. Auf sonnenreichen Grasplätzen.
207. Piral. Cespitalis. Hübner. Häufig in Wäldern.
- 208.

208. Piral. Sordidalis. Hübner. In Gesellschaft der  
Cespitalis.
209. Piral. Farinalis. L. In Gebäuden.
210. Piral. Lemnalis. W. B. An stehenden Ge-  
wässern.
211. Piral. Nivealis. W. B. In Gesellschaft der  
Lemnalis.
212. Piral. Nimphaealis. W. B. Gleichfalls an  
stehenden Gewässern.
213. Piral. Sambucalis. W. B. In Gegenden wo  
viele Hollundersträucher stehen.
214. Piral. Glabralis. Hübner. Auf Auen.
215. Piral. Verticalis. Hübner. In Nesselreichen  
Gegenden.
216. Piral. Verbascalis. W. B. In Wäldern.
217. Piral. Limbalis. W. B. Ebenfalls in Wäl-  
dern.
218. Piral. Forficalis. Hübner. Auf lichten Wald-  
plätzen im Grase.
219. Piral. Hybridalis. Hübner. Im Grase.

## August.

1. Pap. Hyale. Esp. Auf Anhöhen und freyen gra-  
sigten Gegenden.
2. Pap. Phoedra. Herbst. Auf Wiesen und in Wal-  
dungen.
3. Pap. Semele. L. Einzeln auf unangebauten Ge-  
genden und steinigten Dörtern, welche kahl sind,  
und etwas erhaben liegen.
4. Pap. Atalanta. L. Zeigt sich in diesem Monate  
am häufigsten.

5. Pap.