

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Entomologisches Taschenbuch für
Schmetterlings-Sammler**

Müller, C. L. von

Breslau, 1800

VD18 12297070

September.

urn:nbn:de:gbv:45:1-7932

135. Phal. Linariata. Fabr. Graubraun. An den Saamenknöpfen des Leinkrauts.
136. Phal. Miaria. W. B. Gelblichgrün. Auf Schlehen, Eichen und Kirschen.
- * 137. Phal. Hastata. L. Schwärzlichbraun. Auf Birken.
- * 138. Phal. Albicillata. L. Grün. Auf Himbeerstauden.
- * 139. Phal. Vibicaria. L. Gelblichweiß. Auf Besenpfriemen.
140. Tort. Atomana. Grün oder gelb. Auf Weiden, Pappeln, Birken, Eichen, Hagebuchen und Rothbuchen.

September.

- * 1. Pap. Machaon. L. Grün, mit schwarzen Gürteln. Auf Fenchel, Dill, Petersilie, gelben Rüben.
2. Pap. Crataegi. L. Braun. Auf Weißdorn, Schlehen, Birn, Zwetschen und Obstbäumen.
3. Pap. Brassicae. L. Gelblichgrau. Auf allen Küchen- und Kohlkräutern.
- * 4. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf Kohl- und Küchenkräutern.
- * 5. Pap. Rhamni. L. Mattgrün. Auf Kreuzdorn und Faulbaum.
6. Pap. Maera. L. Grün. Auf Schwingelgras und Mäusegerste.
7. Pap. Polichloros. L. Schwarz, mit orange gelben Seitenstreifen. Auf breitblättrichten Weiden, Feldulmen und Kirschbäumen.
8. Pap. Antiopa. L. Schwarz. Auf Weiden und weissen Birken.

- * 9. Pap. C Album. L. Schwarzbraun und weiß. Auf Nesseln, Heckenkirschen, Hopfen, Johannis- und Stachelbeeren.
- * 10. Pap. Lathonia. L. Braungrau. Auf Ackerweilchen.
- * 11. Pap. Levava. * 12. Pap. Prorsa. L. Schwarz. Auf Nesseln.
13. Pap. Atalanta. L. Grün, braun auch schwarz. Auf Nesseln.
14. Pap. Cardui. L. Braun auch schwarz. Auf Disteln, Nesseln, Cardobenediktenkraut und Artischocken.
- * 15. Pap. Jo. L. Schwarz. Auf Nesseln.
16. Pap. Janira L. Grün. Auf verschiedenen Grasarten.
- * 17. Pap. Maturna. Esp. Schwarz. Auf Teufelsabbiß, Wegerich und Ehrenpreis.
18. Pap. Napi. L. Grün. Auf Rübensaat und Kohlkrautern.
- o 19. Pap. Iris. L. 20. Pap. Iria. W. B. 21. Pap. Jole. W. B. 22. Pap. Iris luteus. Esp. 23. Pap. Iris rubescens. Herbst. Grün. Auf Wolfenweiden, Espen, Buchen und Eichen.
- o 24. Pap. Cynthia. W. B. Gelb. Auf spitzigem Wegerich.
25. Pap. Tithonius. L. Grün. Auf Gras, und zwar nur auf Poa annua. L.
- o 26. Hesp. Cyllarus. Fabr. Blaugrün. Auf Wirtelkraut und pfeilförmigem Geniste (Genista sagittalis. L.)
27. Sph. Ocellata. L. Grün. Auf Weiden, Espen, Schlehen und Apfelbäumen.
28. Sph. Populi. L. Grün. Auf Pappeln, Weiden, Birken und Espen.

- * 29. Sph. Pinastri. L. Gelblichgrün. Auf Föhren.
- 30. Sph. Porcellus. L. Braun. Auf gemeinem Waldstroh, Schottenweiderich, Labekraut, Springsaamenkraut, Gartenbalsaminen und Weinblättern.
- * 31. Sph. Ligustri. L. Hellgrün. Auf Hartriegel, wälschem Hollunder (span. Flieder,) Geißblatt, Zelängerjelleber, Weiden und Birken.
- * 32. Sph. Celerio. L. Braun. Auf Weinblättern.
- * 33. Sph. Tilliae. L. Grün. Auf Linden.
- o 34. Sph. Stellatarum. L. Grün; auch bräunlich. Auf Kohlkraut, Labekraut und Färberdthe.
- o 35. Sph. Bombiliformis. Hübner. Grüngelblich. Auf Labekraut.
- * 36. Sph. Atropos. L. Gelbgrün, auch braun. Auf Kartoffeln, Hanf, Stechäpfeln, Hartriegel, Erdbeeren, gelben Rüben, Birnen und Maulbeerblättern.
- o 37. Zig. Pruni. W. V. Grünlich. Auf Schlehen.
- * 38. Bomb. Tau. L. Grün. Auf Eichen, Buchen, Birken, Saalweiden, Aepfel- und Birkenbäumen.
- o 39. Bomb. Quercifolia. L. Grau. Auf Hundsrösen, Schwarzdorn, Weißdorn, Weiden, Gras und allen Obstbaumblättern.
- o 40. Bomb. Hicifolia. L. Grau. Auf hochstämmigen Eichen, schwarzen Pappeln, Vogelkirschen, Saalweiden und Birken.
- o 41. Bomb. Potatoria. L. Schwarzbraun. Auf Queckengras.
- 42. Bomb. Pini. L. Röthlichaschgrau. Auf Föhren.
- 43. Bomb. Vinula. L. Grün. Auf Pappeln und Weiden.

* 44.

- * 44. Bomb. Bicoloria. W. V. Gelblichgrün. Auf Birken.
- o 45. Bomb. Dromedarius. L. Gelbgrün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.
46. Bomb. Ziczac. L. Röhlichbraun, ins Violette fallend. Auf Weiden und Pappeln.
47. Bomb. Plantaginis. L. Schwarz und braun. Auf Wegerich, wilden Nachtweilchen, Sauerampfer, Salat und Feldulmbäumen. Ueberwintert.
- o 48. Bomb. Quercus. L. Gelbbraun. Auf Eichen, Hainbuchen, Mandeln, Nefeln, Quitten, Weiden, Pappeln, Johannis- und Stachelbeeren, Schlehen, Weißdorn und Haselstauden. Ueberwintert.
- o 49. Bomb. Aulica. L. Rothbraun. Auf Hundszungen, Schaafgarben und gemeinem Vogelkraut. Ueberwintert.
- o 50. Bomb. Dictaea. L. Grün, auch rothbraun. Auf Espen, Pappeln, Weiden und Birken.
- o 51. Bomb. Dictaeoides. Esp. Grün. Auf Pappeln und Espen.
- o 52. Bomb. Camelina. L. Gelblichgrün. Auf Erlen, Hainbuchen, Eichen, Birken, Linden, Pappeln, Espen und Weiden.
- o 53. Bomb. Tritophus Fabr. Dunkelgrün. Auf Birken, Erlen und Haselstauden.
54. Bomb. Auriflua. Fabr. Schwarz. Auf Obstbäumen, Eichen, Weiden, Hainbuchen und wilden Rosen.
- * 55. Bomb. Antiqua. L. Grau. Auf Eichen, Erlen, Pflaumen, Zwetschen, wilden Rosen, Schlehen, Weißdorn und Himbeerstauden.

o 56.

- * 56. Bomb. Gonostigma. L. Schwarz auf Eichen, Pflaumen, Schlehen, wilden Rosen, Schwarzbeer- und Himbeerstauden.
- o 57. Bomb. Grammica. L. Schwarzbraun. Auf Wegerich, Löwenzahn, Mausohrchen, Haidekraut und Weisfuß.
- o 58. Bomb. Anastamosis. L. Braungrau. Auf Espen, Weiden, Pappeln und Weißdorn.
- * 59. Bomb. Bucephala. L. Schwarzbraun. Auf Linden, Birken, Erlen, Eichen, Pappeln, Ahorn, Weiden und Haselstauden.
60. Bomb. Curtula. L. Schmutzigbraun, auch gelbgrünlich. Auf Weiden und Pappeln.
61. Bomb. Anachoreta. Fabr. Fleischfarbiggrau. In zusammengezogenen Blättern der Weiden u. Pappeln.
62. Bomb. Hebe. L. Braun. Auf Wolfsmilch, Salat, wildem Weisfuß, Schaafgarben, Hundszungen und Ruchgras. Ueberwintert.
63. Bomb. Villica. L. Schwarzbraun. Auf Erdbeeren, gemeinem Vogelkraut und verschiedenen Grasarten.
64. Bomb. Chrisorhoea. L. Schwarzgrau. Auf Obstbäumen u. verschiedenen niedrigen Gesträuchen.
65. Bomb. Cossus. L. Dunkelrothbraun, auch fleischfarbig oder gelblich. In den Stämmen der Eichen, Weiden, Linden, Pappeln und Erlen.
- * 66. Bomb. Palpina. L. Meergrün. Auf Linden, Weiden und Pappeln.
- * 67. Bomb. Goryli. L. Fleischfarbig. Auf Haseln, Birken, Linden, Buchen, Eichen, Schlehen, Hagedorn und Weiden.
- o 68. Bomb. Furcula. L. Gelbgrün. Auf Weiden.
- * 69.

69. Bomb. Testudo. W. V. Grün. Auf Eichen und Buchen.
70. Bomb. Spinula. W. V. Dunkelbraun. Auf Schlehen.
71. Bomb. Reclusa. Fabr. Dunkelaschgrau. Auf Weiden, Pappeln und Erlen.
72. Bomb. Terebra. Fabr. Weißlich. In den Stämmen der Pappeln.
- o 73. Bomb. Tremula. L. Schwarzgrün. Auf italienischen Pappeln.
- * 74. Bomb. Trepida. Fabr. Gelblichgrün. Auf hochstämmigen Eichen.
75. Bomb. Fascelina. L. Schwarzgrau. Auf Löwenzahn, Wegerich, Schaafgarben und verschiedenen Grasarten, wie auch auf Weiden, Schlehen, Pflaumen und Eichen.
- * 76. Bomb. Velitaris. Esp. Grün. Auf Eichen.
77. Bomb. Cuculla. Esp. Rosenroth. Auf Eichen.
78. Bomb. Fage. L. Kastanienbraun. Auf Eichen, Buchen und Haselstauden.
79. Bomb. Menthastris. Esp. Braunschwarz. Auf verschiedenen Arten Münze, Wirbeldosse, Lavendel und Brennesseln.
- o 80. Bomb. Nana. Vorelh. Röthlichbraun. Auf Gras und Goldenweiden.
- * 81. Bomb. Pudibunda. L. Grünlichgelb. Auf Eichen, Buchen, Birken, Linden und Obstbäumen.
- * 82. Bomb. Terrifica. W. V. Grün. Auf Eichen, Birken und Pappeln.
83. Bomb. Luctifera. Fabr. Schwarz. Auf Haide, Augentrost, Mausohrchen, spitzigem Wegerich, Hundszungen, Bergameinicht und Ehrenpreis.

84. Bomb. Fuliginosa. L. Braun. Auf Sauerampfer, Salat, Pfeffermünze, blauen Eisenhütchen, gemeinem Tollkraut, Wolfsmilch und Brennesseln.
85. Bomb. Humuli. W. B. Bräunlichweiß. Auf den Wurzeln des Hopfens, Sauerampfers und Wegerichs.
86. Bomb. Hera. Fabr. Gelb und schwarz. Auf Rienschrotten, Weiderich, jungen Eichensprossen, Klee und Himbeerstauden.
87. Bomb. Dominula. Fabr. Gelb und schwärzlich. Auf Wollweiden, Eschen, wilden Rosen, Schlehen, Brombeersträuchern, tauben Nesseln, Klee, Erdbeeren und Hundszungen.
88. Bomb. Menelica. L. Hellbraun. Auf Haidekraut, Augentrost, Otternkopf, Bingelkraut, Frauenmünze, Moosdisteln und spitzigem Wegerich.
- o 89. Noct. Dipsacea. L. Grün. Auf den Samenkapseln des zweyhäufigen Lichttröschens und der wilden Nelken.
- * 90. Noct. Batis. L. Braun. Auf Brombeersträuchern.
91. Noct. Solaris. W. B. Braungrau. Auf Klee.
- * 92. Noct. Scutosa. Fabr. Grün. Auf wildem Gänsefuß.
- * 93. Noct. Vaccinii. L. Gelbbraun. Auf Brombeersträuchern und Haidekraut.
- * 94. Noct. Glyphica. L. Gelbbräunlich, auch röthlich. Auf Wiesenklee.
95. Noct. Segetum. W. B. Braun. Auf tauben Nesseln, Gänsefuß, Salat und verschiedenen Grasarten.

- o 96. Noct. Brassicae. L. Graubraun. Auf Kohl- und Gartenkräutern.
97. Noct. Chenopodii. Fabr. Grün oder röthlichbraun. Auf Salat, Kohl, Moosdisteln und Pappeln.
98. Noct. Plecta. L. Gelblichgrün. Auf Waldstroh, Blindlattich, Wegwarten und Taback. Ueberwintert.
- * 99. Noct. Gamma. L. Grün, auch bräunlich. Auf Klee, Disteln, Malven, rother Münze, spanischen Wicken, Levkojen, Nesebe, Nesseln, Salat, Kohl und Afern.
- * 100. Noct. Triplacia. L. Grasgrün. Auf Nesseln.
101. Noct. Meticulosa. L. Bräunlichgrün. Auf Nesseln, Levkojen, blauem Kohl, Schaafgarben, Mangold und mehreren Arten Küchenkräutern.
- o 102. Noct. Chi. L. Meergrün. Auf Rittersporn, Agley, wildem Beyfuß, Kletten und verschiedenen Grasarten.
103. Noct. Psi. L. Blau, gelb und weißlich. Auf Linden, Weißdorn und Obstbäumen.
104. Noct. Tridens. Fabr. Schwarz. Auf Hainbuchen, Linden, Weißdorn, Obstbäumen, Weiden und Pappeln.
- * 105. Noct. Megacephala. Fabr. Schmutzigzimmtbraun. Auf Espen, Pappeln und Weiden.
106. Noct. Auricoma. Fabr. Schwarz. Auf Brombeer- und Schwarzbeerstauden, wie auch auf Klee und verschiedenen Grasarten.
107. Noct. Aceris. L. Gelblich. Auf Ahorn, Kastanien, Zwetschen, Aspen, Schwarzbuchen, Eichen, Walnüssen und Weiden.

108. Noct. Oxianthae. L. Gelbgrünlich. Auf schwarzen und italienschen Pappeln.
109. Noct. Artiplicis. L. Hellrothbraun. Auf Melde, Sauerampfer, Pfeffer und Flöhkraut.
110. Noct. Dissimilis. Knoch. Bräunlichgrau. Auf spitzigem und breitem Wegerich, wie auch auf Gartenmelde.
- * 111. Noct. Pisi. L. Rothbraun. Auf Eichen, Linden, Rittersporn, Melde und Sauerampfer.
- * 112. Noct. Persicariae. L. Bräunlichgrün. Auf Flöhkraut, Moosdisteln, Salat und Hanf.
- * 113. Noct. Pinastri. L. Braun. Auf Sauerampfer und Schaafgarben.
114. Noct. Lucipara. L. Grün. Auf Brombeersträuchern, Steinklee, Sauerampfer, Salat, Camillen, Ochsenzunge und Goldwurz.
- o 115. Noct. Tragopogonis. L. Grün. Auf Labkraut, Spinat und Eichorien. Ueberwintert.
- o 116. Noct. Umbratica. L. Dunkelbraun. Auf Hasenkohl, Gartensalat und Moosdisteln.
- * 117. Noct. Tanaceti. Fabr. Weißlichmeergrün. Auf Wermuth, Beyfuß, Stabwurz, Mutterkraut, Reinfarn und Schaafgarbe.
118. Noct. Argentea. Fabr. Hellgrasgrün und rosenroth. Auf den Knospen und Blüthen des wilden Beyfußes.
119. Noct. Abrotani. Fabr. Grün. Auf wilden Beyfuß und Camillen.
120. Noct. Absinthii. L. Bräunlich und grün. Auf Wermuth, Beyfuß und Camillen.
121. Noct. Linariae. Fabr. Perlfarbigt und hochgelb. Auf Leinkraut.

- * 122. Noct. Aprilina. Fabr. Braun und röthlich.
 Auf Eichen.
- * 123. Noct. Pyralina. W. V. Grün. Auf Eichen.
124. Noct. Diffinis. L. Grüngelb. Auf Ulmbäumen.
- o 125. Noct. Satellicia. L. Schwarz. Auf Eichen,
 Ulmen, Birnbäumen, Lattig, Himbeer, Johannis-
 beer, und Stachelbeerstauden. Ueberwintert.
- o 126. Noct. Oo. Bomb. L. Rosenroth. Auf Eichen.
127. Noct. Petrificata. Fabr. Grün. Auf Eichen und
 Linden.
- o 128. Noct. C nigrum. L. Dunkeläschgrau. Auf
 gemeinem Vogelkraut, Gras und Spinat.
- o 129. Noct. Pronuba. L. Hell, oder dunkelbraun
 auch grünlich. Auf Schlüsselblumen, Aurikeln,
 Ampfer und Lattich.
- o 130. Noct. Albipuncta. Fabr. Lichtgrau oder röth-
 liche Grundfarbe. Auf Sauerampfer, Wegerich,
 Wollkraut, Kletten und gemeinem Vogelkraut.
131. Noct. Alsines. Brahm. Schmutzighellgrau. Auf
 gemeinem Vogelkraut.
132. Noct. Poliodon. W. V. Grün. Auf Wollkraut.
- o 133. Noct. Chrisitis. L. Dunkelgrün. Auf Breit-
 nesseln, Hausnesseln, wilder Münze, Andorn,
 Stabwurzeln und Salat. Ueberwintert.
- o 134. Noct. Sponsa L. Aschgrau; weißlich auch
 braun oder schwärzlich. Auf Weiden und Woll-
 kraut. Ueberwintert.
135. Noct. Obscura. Brahm. Braun. Auf gemei-
 nem Vogelkraut.
- * 136. Noct. Piramidea. L. Meergrün. Auf Pflau-
 men, Zwetschen, Nussbäumen, Schlehen, Pap-
 peln, Weiden, und Johannisbeersträuchern.

- o 137. Noct. Capsincola. W. B. Schmutzigbraun
 grau. Auf den Saamenkapseln des zweyhäus-
 tigen Lichttröschens.
- * 138. Noct. Cucubali. W. B. Grün. Auf Glied-
 weich.
139. Noct. Rumicis. L. Schwarzbraun. Auf Wei-
 den, Sauerampfer und Judenkirschen.
140. Noct. Derasa. L. Braun und pomeranzengelb.
 Auf Brombeersträuchern.
141. Phal. Sesquistriataria. Esp. Grün. Auf Eichen.
142. Phal. Piniaria. L. Grün. Auf Föhren.
- * 143. Phal. Fasciaria. L. Grün. Auf Pappeln.
144. Phal. Gemmaria. Brahm. Bräunlichgrau. Auf
 Obstbäumen und Himbeerstauden. Ueberwintert.
- * 145. Phal. Lunularia. Hübner. Purpurroth auch
 grünlichgelb oder mit roth gemischt. Auf wilden
 Birnbäumen, Weiden, Linden, Eichen, Birken,
 Pflaumen, Schlehen, Haselstauden und Weißdorn.
146. Phal. Elinguaria. L. Graubraun mit ockergelb
 gemischt. Auf Obstbäumen, Schlehen, Linden
 und Eichen.
- * 147. Phal. Vernaria. L. Grün. Auf Eichen,
 Schlehen, Baldreben, Pflaumen und Aprikosen-
 bäumen.
- * 148. Phal. Viridata. L. Fleischfarbig. Auf Weiß-
 dorn und Brombeerstauden.
149. Phal. Sambucaria. L. Hell; auch röthlich; gelb-
 lich, dunkelbraun. Auf Hollunder, Weiden,
 Birn und Linden.
- * 150. Phal. Dolabraria. L. Grünbräunlich. Auf
 Eichen.
151. Phal. Betularia. L. Aschgrau oder gelbgrün auch
 roth

- rostfarbig. Auf Weiden, Pappeln, Eichen, Birken und Rüstern.
- * 152. Phal. Hirtaria. L. Braungrau, bisweilen rothbraun auch aschgrau. Auf Linden, Pappeln, Weiden, Ulm- und Kirschbäumen.
- * 153. Phal. Contiguaria. Borchh. Bräunlichgrau. Auf Linden, Birken, Weiden, Pappeln, Nessel- und Birnbäumen.
- * 154. Phal. Pendularia. L. Grün oder Braun. Auf Birken.
- * 155. Phal. Punctaria. L. Gelblichgrün. Auf Eichen.
- * 156. Phal. Chenopodiata. L. Grün, auch bräunlichgrau, zimmetfarbig oder hellolivfarbig. Auf verschiedenen Arten des Gänsefußes. (chenopodium.)
- * 157. Phal. Linariata. L. Blaugrün. Auf den Samenknospen des Leinkrauts.
158. Phal. Ferrugata. L. Bräunlichgrau. Auf Vogelkraut. (alsne media.)
- * 159. Phal. Ocellata. L. Braun. Auf Labkraut. (galium silvaticum.)
160. Phal. Fluctuata. L. Gelbgrün auch grau. Auf Kobl.
161. Phal. Syringaria. L. Grau mit rosenroth. Auf spanischen Hollunder.
- * 162. Phal. Succenturiata. L. Gelblichgrün. Auf Pflaumenbäumen.
- * 163. Phal. Crataegata. L. Grün. Auf Weißdorn, Birn, Nessel- und Pflaumenbäumen.
164. Phal. Amatalia. L. Braun. Auf wildem Beyfuß.
- * 165. Phal. Roboraria. Fabr. Graubraun. Auf Eichen.
166. Phal. Amataria. L. Rötlichbraun. Auf verschiedene

- schiedenen Ampferarten; Naptouick, Flöhkraut
und Wasserpfeffer.
167. Phal. Innotata. Knoch. Grün. Auf den Blumen-
knospen des Wermuths und Beyfußes.
- o 168. Phal. Prunaria. L. Bläßbraun. Auf brei-
tem Wegerich und Saßblatt. Ueberwintert.
169. Piral. Urticalis. W. B. Grün. Auf Nesseln.
Ueberwintert.
- * 170. Tort. Clorana. L. Graugrün. Auf Woll-
weiden.
- * 171. Tort. Viridana. L. Grün. Auf Eichen und
Saalweiden.
- * 172. Tort. Atomana. Knoch. Grün oder gelb.
Auf Weiden, Pappeln, Birken, Eichen, Hage-
buchen und Rothbuchen.
173. Tort. Prasinana. L. Gelbgrün. Auf Eichen.
174. Tort. Woeberana. Fabr. Fleischfarbigt. In
den Stämmen der Aprikosen und Mandelbäume.
175. Tort. Rosana. L. Bläulichgrau. Auf Eichen,
Kirschbäumen, Haseln, Rosen, Brombeeren,
Schlehen und Kreuzdorn.
- * 176. Piral. Rostralis. L. Grün. Auf Hopfen und
Nesseln.

October.

1. Pap. Crataegi. L. Schwarz und Braun. Auf
Weißdorn, Schlehen, Vogelkirschen und Obst-
bäumen. Ueberwintert.
2. Pap. Maera. L. Grün. Auf Schwingelgras und
Mäusegerste. Ueberwintert.
- * 3. Pap. Rapae. L. Mattgrün. Auf Kohl- und
Küchenkräutern. * 4.