

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bankateten bis Berezynthus - Mit einem 4to. und neun und dreyßig
8vo. Kupfern

**Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm
Berlin, 1786**

Verzeichniß der im Vlten Bande des Naturlexikons enthaltenen
Kupfertafeln.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11046

Verzeichniß
der im VI^{ten} Bande
des Naturlexikons
enthaltenden Kupfertafeln.

Tab. CXCVI. Fig. 1. Der weiße Banquetschinken.

Seite 12.

Fig. 2. Der queergestreifte, gestrahlte Banquetschinken. S. 15.

Fig. 3. Der glatte gestrahlte Banquetschinken. S. 15.

Fig. 4. Bartarche mit herabhängendem lappichten Bart. S. 34.

Fig. 5. Bartkneiper. S. 56.

Fig. 6. Die schwimmende Batterie. S. 188.

Fig. 7. Die gewässerte Bauchschnede. S. 211.

Fig. 8. Die Rothschnecke. S. 217.

Fig. 9. *Cardium edule*. S. 308.

Fig. 10. Das Bauernherz. S. 308.

Tab. CXCVII. Barrakuda. *Umbra minor*. Catesby.

S. 22.

Tab. CXCVIII. Stachlichte Barreliere. *Barleria Hystrix*. Barleria S. 27.

Tab. CXCI. Harringtonie. S. 28.

Fig. 1. Die Blume.

Fig. 2. Der Stempel.

Fig. 3. Die Frucht.

Fig. 4. Dieselbe, aufgeschnitten.

Fig. 5. Der Kern.

- Tab. CC. Bartgras, Rameelheu. *Andropogon Schœnanthus.* S. 45.
- Tab. CCI. Teutsches Bartgras. *Andropogon ischænum.* S. 48.
- Tab. CCII. Fig. 1. 2. Pfriemensformiges Bartmoos. *Phascum subulatum.* S. 77.
- Fig. 3. Stammloses Bartmoos. *Phascum acaule.* S. 78.
- Tab. CCIII. Alpenbartschie. *Bartsia alpina.* S. 80.
- Tab. CCIV. Basellkraut, rothes. *Basella.* S. 122.
- Tab. CCV. Citronenbasilie. *Ocimum citratum.* Bester. S. 127.
- Tab. CCVI. Nelkenbasilie. *Ocimum caryophyllum maximum.* Bauhin. S. 127.
- Tab. CCVII. Bastart-Sinnaal. *Gymnotis noropaeus.* S. 157.
- Tab. CCVIII. Bastart-Lilie. *Hemerocallis.* S. 165.
- Tab. CCIX. Der deutsche Bauer. S. 282.
- Fig. 1. Des männlichen Falters Oberseite.
- Fig. 2. Des weiblichen Falters Oberseite.
- Fig. 3. Dasselbe Unterseite.
- Fig. 4. Zweierlei Raupen derselben.
- Fig. 5. Die Chrysalide.
- Fig. 6. Das vergrößerte Ei.
- Fig. 7. Das Bauernböckchen. S. 294.
- Tab. CCX. Fig. 1. Bauernfeige, Kochrücken. S. 256.
- Fig. 2. Der dünnchalige Bauernjunge. S. 325.
- Fig. 3. Bauernknopf. S. 344.
- Fig. 4. Bauernkräusel. S. 347.
- Fig. 5. Die Bauernmusik. S. 350.
- Tab.



Tab. CCXI. Bauhinie, bunte.	S. 379.
Tab. CCXII. Glatte Bauhinie. <i>Bauhinia glabra.</i>	S. 380.
Tab. CCXIII. Blindmachender Baum. <i>Exæcoria.</i>	
Zweig davon.	S. 412.
Tab. CCXIV. Desgleichen.	S. 412.
Tab. CCXV. Baumläufer, der gemeine. <i>Certhia familiaris.</i>	S. 418.
Tab. CCXVI. Krautartige Baumwolle. <i>Gossypium herbaceum.</i>	S. 489.
Tab. CCXVII. Gemeine Becherblume. <i>Poterium Sanguisorba.</i>	S. 500.
Tab. CCXVIII. a) Braunrother Becherschwamm.	S. 512.
b) Gedüpfelter Becherschwamm. <i>Peziza punctata.</i>	S. 519.
c) Linsenträgender Becherschwamm. <i>Peziza lentifera.</i>	S. 526.
Tab. CCXIX. Becherschwamm, Judasohr. <i>Peziza auricula.</i>	S. 523.
Tab. CCXX. Beerenangelik mit Blumenknöpfen. <i>Aralia racemosa.</i>	S. 538.
Tab. CCXXI. Fig. 1. Beerenfleckwanze. <i>Cimex haemacarum.</i>	S. 541.
Fig. 2. Beerenkäfer. <i>Scarab. Baccicolor.</i>	S. 542.
Fig. 3. Der Begleiterraupentödter. <i>Ichneumon comitor.</i>	S. 577.
Fig. 4. 5. Der Belus. <i>Pap. Eq. Tr. Belus.</i>	S. 686.
Tab. CCXXII. Beermelde, gemeine. <i>Atriplex hæcifera.</i>	S. 543.
Tab. CCXXIII. Beet, das glatte. Fig. 1,	S. 561.
Fig. 2. Begräbnisöliven.	S. 581.
Fig. 3. 4. Bellhorn, das gefürchte,	S. 669.
	Tab.



- Tab. CCXXIV. Begonie. S. 580.
- Tab. CCXXV. Behen, gemeine. Been album. S. 591.
- Tab. CCXXVI. Behen, Ohrlöflein-Kraut. Cucubalus orites. S. 596.
- Tab. CCXXVII. Beinbruchstein. Osteocolla. S. 604.
- Tab. CCXXVIII. Beinfisch, Biegelisen. Ostracion triqueter. S. 609.
- Tab. CCXXIX. Beinfisch. { Fig. 1. Pflockschwanz.
Bicaudalis. S. 613.
Fig. 2. Seeguckguck.
Quadricornis. S. 614.
- Tab. CCXXX. Beinfisch. { Fig. 1. Seekätzchen.
Cornutus. S. 616.
Fig. 2. Todtensarg.
Cubicus. S. 617.
- Tab. CCXXXI. Beinsaame mit Stechpalmläppern. Osteospermum ilicifolium. S. 621.
- Tab. CCXXXII. Weinwell, gewöhnlicher. Symphytum officinale. S. 622.
- Tab. CCXXXIII. Bengelkraut, beständiges. Mercurialis perennis. S. 690.
- Tab. CCXXXIV. Berberisstaude, gemeine. Berberis vulgaris. S. 701.
- Tab. CCXXXV. Berezynthus, die surinamische Berezynthia. Pap. Dan. Fest. Berecynthus. S. 705.

Allge





Allgemeine
Geschichte der Natur,
in alphabetischer Ordnung.

VI. Bandes I. Abtheilung.

Ban.

Bankateren. S. Tauben, Brieftauben.

Banke a). Heißt bei Bergleuten eine mehr oder weniger horizontale, und nicht schwache Lage in Flözgebirgen, die aus Erde, Gestein, Kohlen oder anderen Mineralien besteht. Man sagt z. B. Kohlenbank, Schieferbank ic. statt Lage über Schicht. (G.)

Banketschinken. (Conchyl.) S. Banquetschinken.

A 2

Banksie,

a) Stratum.

