

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**D. Lavrentii Heisteri Profess. Pvbl. Helmstadiensis  
Academ. Caesar. Regiae Lodin. Ac Berolin. Collegae  
Compendivm Anatomicvm Totam Rem Anatomicam  
Brevissime Complectens**

**Heister, Lorenz**

**[Norimbergae, [MDCCXXXII.]**

**VD18 90513150**

[Explatio Tabvlae Tertiae.]

**urn:nbn:de:gbv:45:1-9958**

male exaratum fuerat, atque etiam figuræ VERHEYENI & MANGETI illud inversum, sive a parte superiori tantum repræsentant: quo lectores, præcipue tyrones, facile falli possunt.

*AAAAA* Diaphragmatis musculus superior, fibris carneis crassis e sterno & costarum cartilaginibus proveniens: quæ fibræ versus partem tendineam, quasi radii ad centrum excurrunt.

*BB* Musculus inferior, quasi duplex.

*C* Tendo eius dexter & longior.

*D* Tendo sinister & brevior.

*EE* Pars tendinea, sive centrum tendineum, cui superius pericardium adhæret: in qua fibræ tendineæ, observante *Santorino*, roboris gratia, decussantur, & mirabiliter sibi invicem intexuntur.

*F* Foramen ellipticum transversum, in parte tendinea, per quod vena cava transit.

*G* Foramen oblongum in parte carnea, per quod œsophagus ventriculum adit.

*H* Locus sive interstitium inter duo capita musculi inferioris, ubi *Arteria magna* e thorace in abdomen descendit; *Ductus vero thoracicus* & sæpe *vena azygos* ex abdomine in thoracem ascendunt.

*I* Pars quædam carnea, quæ hic erat in tendinea.

*K* Appendices duæ musculosæ, quæ in variis variant, & modo adsunt, modo desunt.

## EXPLICATIO TABVLAE QVARTAE.

Fig. 14 Repræsentat GLANDVLAM THYMI ex foetu humano recens nato.

*AA* est Cor, pericardio involutum, cui thymus magna parte adhæret.

*BB* Glandula thymus, prout in hoc foetu se habebat: bifida quasi, in inferiori; trifida vero in superiori parte. Cuius partes inferiores, *aa*, adhærent superiori parti pericardii; pars media, *bb*, trunco aortæ; partes vero superiores, *ccc*, principio ramorum aortæ ascendentium incumbunt.

*CCC* Rami tres ascendentes aortæ.

Fig. 15 Varietatem huius glandulæ ex alio foetu ostendit: quales adhuc plurimas afferre possem: nam æque figura, quam magnitudine, in quovis fere infante variat.

*AA* Pars superior cordis pericardio involuti.

*BB* Glandula Thymus, superius in duas partes divisa, *aa*, inferius leviter tantum sinuata, *b*.

*CCC* Rami ascendentes, ut in præcedenti.

Conferatur §. 256. & §. 387.

Fig. 16 Exhibet CEREBELLVM HVMANVM: in quo divisiones eius in lamellas sive lobulos, ab aliis, quantum novi, non descriptos, pulchre demonstrantur.

*aaaa* Indicatur cerebellum humanum, in medio perpendiculariter & in æquales partes sectum.

*BBB* Interior substantia corticalis & medullaris.

*ccc* Tractus medullares, non adeo crassi, nec adeo breves, ut vulgo a multis delineantur,

*ddd*