

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**D. Lavrentii Heisteri Profess. Pvbl. Helmstadiensis
Academ. Caesar. Regiae Lodin. Ac Berolin. Collegae
Compendivm Anatomicvm Totam Rem Anatomicam
Brevissime Complectens**

Heister, Lorenz

[Norimbergae, [MDCCXXXII.]

VD18 90513150

[Explicatio Tabvlae Sextae.]

urn:nbn:de:gbv:45:1-9958

sculis instar radicularum undique dependentibus, copiosissimis, ab aliis, quod sciam, nondum delineatis, ornata: ubi notanda

CCCC Tunicarum foetus pellucidarum pars, a quibus vasculosa a me ex parte separata sive detracta est, ut una cum foetu in liquore suo ambiente conspici possit: nam sciendum, maximam partem huius ovi humani tunica tali vasculosa, vasculis fluctuantibus, ut pictae sunt, & dependentibus fuisse instructam.

DD Funiculus umbilicalis rudi modo adhuc apprensus.

Fig. 27* **aaaa** Ovulum a muliere per quatuor circiter, ut credit, hebdomades gravida, magna uteri haemorrhagia & doloribus reiectum: quod fere pellucidum, multisque vasculis sive radiculis chorii, tanquam villis, in ambitu ornatum, in quo **b** corpusculum apparet, embryonem adhuc informem repraesentans, quod quoque adhuc asservo.

Fig. 28. **aaaa** Est pars ani & intestini recti aperta.

bb Inaequales eminentiae & rugae in extima ora ani, ubi venae lividae tumentes in hoc cadavere apparebant.

ccc margo, qui a litt. **cc** ad litt. **aa** inferiores instar fimbriae erat, ubi sphincter & intestinum rectum colore & consistentia, ut plerumque fieri solet, differebant.

dddd Oscula minima quamplurima circa intestini recti finem, cum multis glandulis subrotundis, ut in hoc cadavere apparebant.

eeee Oscula quaedam maiora setam admittentia,

in 2

infra

infra fimbriam recti, ubi sphincter situs est, prout in hoc cadavere videnda erant, quorum duobus setæ immiffæ.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTIMAE.

Fig. 29. Ostendit *intestinum ileum, colon, cæcum cum processu vermiformi*, quomodo se sæpe habeant in infante recens nato, flatu distenta & exsiccata.

AA Pars intestini ilei, eiusque in latus seu parietem coli sinistrum ingressus.

BB Pars intestini coli.

C Intestinum cæcum, eiusque in processum vermiformem peculiaris & diversa, quam in adultis, mutatio: in infantibus enim his cæcum sensim sensimque angustatur in processum hunc, coniformem quasi figura; cum in adultis id alia fiat ratione, & cylindricus fere sit.

DE Processus vermiformis in hoc infante singulari modo inflexus: primum enim a *C* sub ileo transibat & ascendebat ad *D*. Deinde vero supra ileum iterum reflectebatur, & descendebat ad *E*.

Fig. 30. Eadem *intestina a parte posteriori*, ut cæci mutatio in processum vermiformem, quomodo in infantibus plerumque se habeat, clarius conspicere queat.

AA Intestinum ileum cum eius in colon ingressu.

BB Colon.

C Cæci