

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Aussauger Aethiopischer Celaster.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Aussauger
Aethiopischer Celaster

S. 358.



Sürsch Sc.

Müller. T. 87.



Ausfauger, Zelafter, mit Buxbaumblättern, oder Blattreichen Stacheln, effigen Aesten und stumpfen Blättern p).

Er wächst, wie der vorige, wild in Aethyopien, besonders auf dem Vorgebirge der guten Hofnung, hat einen zarten Stamm, der eine Stütze fordert, steigt bis zu zwölf Schuhen in die Höhe, hat eine Lichtgraue Rinde und viele Gelenke, die mit langen Dornen bewafnet sind, lange, lockere Blätter, welche übrigens dem schmalblättrigen Buxbaum gleichen und in Trauben, ohne Ordnung herauskommen, und effichte, in der Jugend mit einer weißlichten Rinde überzogene Aeste.

— — — Kanadensischer, oder Kletternder, Nordamerikanischer. Steigende Kanadensische Spindelrebe mit fein gezakten Blättern (Gled) Baum-mörder, der keine Stacheln, einen in sich windenden Stamm und Sägenartig fein gezakte Blätter hat q).

Dieser Zelafter ist sehr dauerhaft und im ganzen mitternächtlichen Theil von Amerika zu Hause. Seine Stängel sind biegsam und winden sich um die benachbarte Pflanzen, welche sie auch in wenigen Jahren zu Grunde richten. Sie werden ohne Stütze höchstens vierzehn Schuhe hoch, sonst aber weit höher. Außerlich ist seine Wurzel Blutroth. Seine Blätter sind länglich, rund, adericht, dünne und zart, auf der obern Fläche hellgrün, auf der untern bläßer. Seine Aeste haben, wenn sie

p) *Celastrus Buxifolius*, spinis foliosis, ramis angulatis, foliis obtusis. Linn. l. c. 285. n. 4. Hort. Cliff. p. 73. Royen Lugdb. 434. *Lyium Portoricense*, Buxi foliis angustioribus. Plukn. Alm. 234. T. 202. f. 3.

Millers Gärtnerl. I. p. 605. Onom. bot. II. 704.

q) *Celastrus scandens inermis*, caule volubili, foliis serrulatis. Linn. l. c. 285. n. 2.

Evonymoides Canadensis scandens, foliis serratis. Isnard. Act. Paris. 1716. p. 369. Duham. Arb. I. p. 223. T. 95.

Fruex viminibus lentis infirmis, foliis profunde serratis. Gronov. Virg. 55. Dietr. Pflanzenr. I. 236.

Millers Gärtnerl. I. 605. U. Sch. d. Nat. I. 521.

Onom. bot. II. 703. Gleditschs Pflanzenverz. p. 82.