

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Au- bis Bachsteinbrech

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1778

Illustration: Klebrige Azalea.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10896

Klebrige Azalea N. 38



Gussf.

Naturl. IV.

Seeligm III T 14





ten. Die Krone z. B. ist bey manchen Trichterförmig, bey andern Glockenförmig. Die Staubfäden erscheinen bey manchen Arten sehr lang und niedergebogen. Vom Rosenbaum (Rhododendrum) unterscheidet sich die Azalea besonders durch die Zahl der Staubfäden.

Die Gattungen sind:

Azalea. Bergröslein, Virginianisches. S. nacktend blühende Azalea. S. 639.

— — mit bloßen oder nackenden Blumen. S. Ebd.

— — mit klebrichten Blumen. S. Klebrige. S. 638.

— — die gestreckte, mit weitschweifigen, gestreckten Aesten. Alpenbergröslein t).

Sie wächst in der Schweiz, auf den Oesterreichischen und Steuermärkischen Alpen.

S 3

Azalea,

t) *Azalea procumbens* f. *ramis diffuso-procumbentibus*. *Lin.*
l. c. 215. n. 5.

Flor. app. 90. Tab. 6. f. 2. *Flor. Suec.* 170. und 179.

Halleri Helv. 416.

Chamaerhododendros *supina*, *ferruginea*, *thymi folio*, *alpina*,
Boccon Mus. 2. 64. T. 53.

— — *alpina* *Serpillifolia*. *Tourn.* Inst. 604.

Chamaecistus *serpillifolia*, *floribus carnis*. *C. B.* Pin. 466.

— — VII. *Clusii* Hist. I. p. 75.

Chamaecistus VII. *Oeder.* Fl. Dan. T. 9.

Anonymos *fruticosa*, *foliis Ericae bacciferae* *Matthioli*. I.

Bauh. Hist. I. 527. *Gerardi* *Flor. Gallo-Prov.* p. 438.

Dietr. l. c. p. 180. n. 6. *Onom. bot.* I. 1040.

Sausv. V. p. 111. n. 4.