

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm


Berlin, 1785

Illustration: Der fahle Backtrog; Backtrog der Narren; Der corallweisse
Backtrog; Der Faltenkorb.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937

Der fahle Bachtrog.

p. 248.



Bachtrog der Narren

p. 268.



Der corallweisse Bachtrog.

p. 244.



Der Faltenkorb.

p. 253.



trog der Narren

p. 268.




er Faltenkorb.

p. 253.



Nat: Lex: V. B.



schälige Muschel, die daher auch durchsichtig und zerbrechlich ist. Die Schalen sind glatt, gewölbt und dreyseitig, folglich auf beyden Seiten abgestumpft, welches doch an der Vorderseite merklicher als an der Hinterseite ist. Daher ist diese Muschel etwas ungleichseitig, obgleich ihr Schloß, oder von außen ihr Wirbel gerade im Mittelpunkte derselben steht. Der Rand der Schale ist scharf und schneidend, doch schließet sie nicht allenthalben genau zusammen. Die Schale ist überaus glatt, doch stehet man unten wohl einen Viertelzoll breit feine Querstreifen, so wie auch hin und wieder bläulich gefärbte bogenförmige Querstreifen, vermuthlich ehemalige neue Ansätze der Schale, liegen. Die Vulva und der After sind im Mittelpunkte etwas erhöht, und fein aber kenntlich gestreift. Vorzüglich glatt und glänzend ist der Wirbel, und die Schnäbel, die in einer ziemlichen Entfernung von einander stehen, sind etwas nach der Hinterseite zurück gebogen. Man siehet von außen eine länglich-dreyseitige, doch nicht allzu große Oefnung. Der gefaltene Mittelzahn, die
 langen

font minces & tranchans au de l'expression — la couleur est violette au dedans, & grise ou agathe au dehors, avec cinq ou dix rayes tantôt blanches & tantôt fauves, qui, comme autant de rayons, partent du sommet pour se rendre à la circonference. Les dents de la charniere sont au nombre de trois dans chaque battant, toutes en lames fort minces, les laterales sont fort éloignées. — Pennant Brit. Zool. n. 42. tab. 52. Da Costa Brit. Conchil. p. 196. n. 32. tab. 12. fig. 3. Trigonella tenuis, admodum concava, ferrugineo — cinerea radiata. Knorr Versnüg. Th. VI. S. 11. tab. 5. fig. 1. 2. Fig. 2. ist abgesehliffen. Ihre Gestalt hat einige Aehnlichkeit mit einer gewissen Art Körbe, und daher nennen wir sie das strahllichte Korbduplett, Soll Gestraalte Korf. Doublet. Franz. Came rugée. Die Farbe ist braunlicht gelb, ins
 wens