

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1785

Illustration: Bärlappen, Keulenförmige, gemeine.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937

Bärlappen, Keulenförmige, gemeine. S. 431.



Öderi 1. Tab. 126.



Bärlappen, Keulensförmige, gemeine Bärlappen, Gürtelkraut, gemeines Kolbenmoos, Schlangenkraut, Weinkraut, *Lycopodium clavatum*. Diese Art ist die gemeinste und wächst in ganz Europa in moosichten Wäldern, vornämlich in Tannenwäldern, auf Torfboden und auf den Alpen. Ihre Stengel sind lang, kriechen auf der Erde, zertheilen sich sehr, und sind mit Blättern stark besetzt, welche wie Hohlziegel auf einander liegen; sonst haben sie keine bestimmte Ordnung, sind lang und schmal, und verlieren sich in eine scharfe Spitze und in ein langes Haar, so, daß junge Keime ganz rauh aussehen. Ihr Blumenstiel ist stark, blattlos, und nur hin und wieder mit Schüppchen besetzt; er ist aufrecht, und theilt sich, in einer Höhe von einigen Zollen, in zwei walzenförmige Aehren, die bey jungen Pflanzen ganz glatt sind, weil nämlich ihre Blättchen ganz dicht auf einander liegen, bey ältern aber borstig werden, weil diese weiter aus einander stehen, und ihre Haare, die sie, wie die Blätter an Stengel und Aesten haben, entfalten. In den Winkeln dieser Blättchen sitzen die Kapseln, welche voll von einem sehr feinen, kugelförmigen, gelb-

plant. sponte circa Giessam nascent. Francof. 1719. 8. append. T. 2. *Lycopodium ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus subserratis.* Haller. hist. stirp. Helvet. III. p. 21. *Lycopodium foliis sparsis quinquefariis subserratis, furculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis.* Linn. Syst. veget. p. 793. Spec. plant. II. p. 1566. *Muscus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus sine pediculis.* Morison hist. III. p. 621. S. 15. T. 3. f. 3. *Muscus terrestris foliis retro-reflexis.* J. Baubin hist. plant. III. 767. *Muscus terrestris repens, clavis singularibus erectis.* Pluknet almagest. p. 248. T. 205. f. 5.