

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bachstelze bis Baniul - Mit drey 4to. und dreyßig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1785

Illustration: Balote, Schwartz, a.b.c. Blumen d. Same.

urn:nbn:de:gbv:45:1-10937





Blumen haben einen gleichsam abgestumpften Kelch, und eine weiße Krone q).

Ballote, wohlriechende, *Ballota suaveolens*. Man findet sie in dem mittägigen Theile von Amerika. Sie hat einen angenehmen Geruch, und ist rauh und groß. Ihre Blätter sind herzförmig, und an ihrem Rande sägenartig gezahnt, oder ausgehöhlt. Ihre Blumenwinkel bilden am Gipfel blattreiche Aehren; der Kelch ist abgestumpft, und hat, statt der Grannen, sehr schmale Aehren. Die Krone ist blau r).

— — wollige, *Ballota lanata*. Sie ist in Sibirien nach Sina zu, zu Hause. Ihr Stengel liegt darnieder, wird ungefähr einen Schuh lang, und ist durchaus mit weißer Wolle bekleidet. Ihre Blätter gleichen einigermaßen den Blättern der Stachelbeeren: sie sitzen auf langen Stielen, und sind am Rande gezahnt, auf ihrer obern Fläche schön satt-grün, auf der untern aber mit silbergrauer Wolle bekleidet, und in drey bis fünf stumpfe Abschnitte gespalten, die, wie die Finger an einer Hand, ausgebreitet sind. Ihre ungemein zottige Blumenwinkel stehen in der Mitte des Stengels. Der Kelch an den Blumen hat borstenartige

Pl 3

q) *Ballota foliis cordatis indivisis serratis, calycibus subtruncatis*. Linn. Syst. veget. p. 448. Spec. plant. II. p. 814. Ballote *J. Camerar.* epit. p. 572. Ballote flore albo. *Tournefort* instit. rei herbar. p. 185.

r) *Ballota foliis cordatis, spicis foliosis, calycibus truncatis: aristis linearibus*. Linn. Syst. veget. p. 448. Spec. plant. II. p. 815. *Marrubialtrum maximum, flore caeruleo nardi odoree*. *Sloane* voyage to Madera, Barbados, Nievas S. Christophors, Jamaica, with the natural history a Lond. fol. I. 1707. p. 171. T. 102. f. 2. *Mesosphaerum hirsutum, foliis cordatis serrato-sinuatis, floribus verticillariter spicatis*. *Browne* civil and natural history of Jamaica. London. 1756. fol. p. 257. T. 18. f. 3.