

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bankateten bis Berezyntus - Mit einem 4to. und neun und dreyßig
8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1786

Illustration: Fig. 3.4. Bellhorn das Gefurchte; Fig. 1. Beet. das glatte; Fig. 2.
Begraebnisoliven.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11046

Fig. 3. Bellhorn das Gefurchte. S. 669.
Fig. 1. Beet. das glatte. S. 561. Fig. 2. Beyriebrnis Oliven. S. 521.



Nach der Natur.



Bellhorn, das gefurchte. das geknobbelte. 669

dem gefleckten Bellhorn. Auf den Ribben siehet man keine Flecken, und die Farbe der ganzen Schnecke ist entweder einfarbig weiß, oder die Ribben fallen in das Bräunliche, und die Furchen in das Röthliche. In meinem $3\frac{1}{2}$ Zoll langen Exemplare, dessen Schale eben so stark, als an dem ausgewachsenen gefleckten Bellhorn ist, ist die Farbe ganz weiß; die zwey obern Windungen sind braun, die vorhergehende aber unten braun, und oben weiß. Die Ribben selbst erscheinen an manchen Exemplaren scharf, an andern abgerundet, und die Schnecke fällt auf der Küste von Coromandel häufig.

Bellhorn, das gefurchte. S. das gefleckte.

— — — das geknobbelte k). Ich finde eine sehr schöne Beschreibung von dieser Conchylië in der Deutschen Encyclopädie, und ich trage gar kein Bedenken dieselbe zu wiederholen. Argenville hat diese Conchylië unter den Tonnen, und hat dabey vermuthlich auf die bauchichte Figur gesehen. Eben dahin hat sie auch Seba gelegt, der sie, ich weiß nicht aus
U u 4 was

k) Lister Hist. Conchyl. Tab. 1003. fig. 68. (mala.) Buccinum recurvirostrum, muricatum, ventricosum. Mar. mediter. *Cochlea Echinophora* Rond. apud. Aldrov. Bonan. Recreat. Class. III. fig. 18. 19. p. 115. *Cochlea maris mediterranei*, dicta a Rondelilio *Echinophora* a tuberculis, quibus spiræ frequenter gibbulosæ tumescunt & proportione servata diminutis. Candida colore sed rara. 19. *Echinophora* frequentissime ad victum collecta figura alteri similis, colore autem tophaceo vel murino. Bonanni Mus. Kircher. Class. III. fig. 18. 19. p. 451. Rumph Amboin. Maritatenf. Tab. 27. fig. 1. Holländ. p. 93. de geknobbelte Belhooren. Deutsch: S. 58. Die bauchichte oder höckerichte Schellenschnecke, welche selten vorkommt.
Gual