Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1787

Illustration: Waldbinsengrass.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11110

Visual Library

Waldbinsengras.

Martini Lex. VII. B. Blackwell herb. Tab. 307.

Landesbibliothek Oldenburg

Landesbibliothek Oldenburg

allenthalben in Europa an feuchten Orten, vornähmlich in etwas feuchten Wäldern wild, und dauert über den Winter; sein Halm wird bis einen Schuh hoch, ist dreyseitig und reichlich mit Blättern bekleidet; diese sind flach, bis drey Linien breit, und an Rand und Rückenschärfe sehr rauch; seine Aehrchen sind grünlicht, eyrund, doch scharf zugespitzt, und gedrängt zwey bis vier beysammen; sie vereinigen sich in eine blattreiche Dolde, die statt der Hülle vier Blätter von ungleicher Breite und Länge, eines viel länger als die Dolde, unter sich hat; auch die Stiele, welche die Dolden ausmachen, sind von sehr ungleicher Länge; sie sind nur mit kleinen Blattansätzen bekleidet, und theilen sich alle, wohl zum drittenmahl, in Aeste. Das Vieh frißt dieses Gras nicht, doch kann es als Stroh gebraucht werden s).

Binsengras, zweytheiliges, Scirpus dichotomus. Es wächst in Ostindien wild; sein Halm ist dreyseitig und ohne Blätter; seine Blumendolde theilt sich in klei-

s) Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. von Royen prodr. fl. Lugdb. p. 49. Cyperus graminea, bey Pena, Lobeln und Dalechamp; Cyperus gramineus. J. Bauhin hist. plant. univ. II. p. 504. Cyperus longus latifolius, locustis plurimis, minoribus & brevioribus. Morison hist. plant. univ. III. p. 235. T. XI. f. 15. Gramen arundinaceum, foliis acutissimis, panicula multiplici, cyperi facie. Lösel fl. pruss. p. 119. T. 33. Gramen cyperoides miliaceum. C. Bauhin theatr. botan. p. 90. Juncus latus, bey Dalechamp; Pseudocyperus πολυκαρπος bey Thalius; Scirpus culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. Linné Spec. plant. I. p. 75. Syst. veget. p. 86. n. 24. Scirpus planifolius, panicula ramosissima, locustis ovatis. Haller hist. stirp. Helvet. II. p. 178. n. 1340.