Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Berg bis Bizwurz - Mit sechs 4to. und ein und vierzig 8vo. Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm Berlin, 1787

Illustration: Birnbaum Birnquitte.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11110





hen dren und dren benfammen; sie sind lanzenformig, runglicht und unzertheilt, und haben auf ihrer untern Flache graue Abern.

3) Birnquitte, Pear-Quince, Coignassier semelle; in Provence, Coudounier. Laub und Frucht sind mehr länglicht als ben der Apfelquitte; lestere gleicht in ihrer Gestalt mehr einer Birne, schmeckt nicht so herb, und ist größer, von zwen Zoll Höhe und ben, nahe gleicher Breite bis zu einer Höhe von sechste- halb Zollen und einer Breite von viertehalb e).

Auch davon hat man einige Spielarten mit glat: ter f), mit fleiner, rauher und herber g), und mit suger egbarer h) Frucht.

4) Quitte, portugiesische, broad-leaved Portugal-Quince, Coignassier de Portugal. Der Baum wächst höher, als andere Quittenbäume, trägt aber nicht so stark; seine Blätter sind größer, sechskehalb Zolle lang und fünstehalb Zolle breit, umgekehrt eprund und bennahe herzsörmig; die mittlere Uder auf ihrer untern Fläche ist roth; die Früchte selbst sind weicher, zärter, nicht so herb, als ben den andern Urten, so daß sie ollenfalls roh gegessen werden köninen, und kochen sich weit schöner roth; sie sind auch weit größer, diet bis viertehalb Zoll im Durchmesser, und über dren Zolle lang; nach dem Auge zu nehe

e) Cydonia majora, ben Mai; Cydonia (oblonga) foliis oblongo ovatis subtus tomentosis, pomis oblongis basi productis, ben Milleris.

f) Cydonia fructu oblongo minori lanuginoso non eduli, ben Tournefort.

g) Cydonia fructu oblongo laviori, ben Tournefort.

h) Cydonia fructu oblongo brevi dulci edulique, ben Cours