

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789

Illustration: Bocksdorn, wilde Kichern; Astragalus Cicer.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120

Bocksdom, wilde Kichern.
Astragalus Cicer. S. 513.



Nat. Lox. VIII. B.

Bocksdorn, Laxmannischer. Linzischer. 513

den Köpfgen beysammen, und haben eine purpurrothe Krone: Man kann ihn, wie den kanadischen, aus dem Samen ziehen; nur muß man ihn wärmer halten, die Pflanzen, wenn sie aufgegangen und auch schon erstarrt sind, den Sommer über in den Töpfen an einen bedeckten Ort, im Weinmonat aber unter ein gemeines Gerähme bringen, und im folgenden Frühling in eine warme Rabatte versetzen, die man bey strengen Wintern mit etwas alter Loh bestreut l).

Bocksdorn, Laxmannischer, Astragalus Laxmanni; er wächst in Sibirien wild, und weitschweifig: Sein Stamm liegt auf der Erde; seine Blätter bestehen aus drey und zwanzig bis fünf und zwanzig Blättchen; seine Blumen stehen auf aufwärts steigenden Stielen in verlängerten Aehren beysammen, und haben borstenartige Blattdecken; ihr Kelch ist schwärzlich, mit schwarzen niederliegenden Haaren bekleidet; ihre Krone ist bläulich, und das Fähnchen derselbigen länglicht und ausgeschnitten; seine Hülsen sind klein, rauch, länglicht und dreyseitig; sie verlieren sich in eine steife Spitze, und haben vorn eine Furche, auf dem Rücken aber sind sie scharf m).

— — — Linzischer, Astragalus leontinus; er wächst bey Linz in Oesterreich im Sande wild, und blüht im Heumonat; sein Stengel liegt darnieder, ist etwas gestreift

l) Astragalus caulescens, capitulis globosis: pedunculis longissimis, foliolis emarginatis. *Lin.* sp. pl. 2. p. 1065. n. 3. *Syst. veget. ed. 14. p. 681. n. 3.* Astragalus orientalis villosissimus, capitulis rotundioribus, floribus purpureis. *Tournef. coroll. inst. r. herb. p. 29.*

m) Astragalus caulescens procumbens, spicis elongatis, leguminibus oblongis trigonis sulco exaratis mucronatis villosis. *Lin. syst. veget. ed. 14. p. 682. n. 19.*

