

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung


Von Bla bis Bog - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1789

Illustration: Bocksdorn Tragant.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11120



Nat. hexviii. B.

seine zahlreiche Blumen sitzen auf kaum merklichen Stielen, und kommen unmittelbar aus der Wurzel; ihr Kelch ist zotig und hat schwarze Zähne; ihre Krone ist gelb; seine Hülsen sind rundlich und glatt l).

Bocksdorn, uralischer, Astragalus uralensis; er ist in Sibirien, Kärnthen, in der Schweiz und im Walliserlande auf den Gebirgen zu Hause, und blüht im Heumonat: Seine Blätter glänzen wie Seide, bestehen aus eckigen, doch etwas zugespitzten Blättchen, und sind kürzer, als der Blumenschaft; dieser entspringt unmittelbar aus der Wurzel, ist aufrecht und sehr zotig, und trägt mehrere Blumen mit purpurblauer Krone; seine Hülsen stehen aufrecht, sind aufgeblasen rauch und spitzig, wie eine Schusterpfrieme m).

— — — **vierteljähriger, Astragalus trimestris;** er ist zärtlich und in Egypten zu Hause, und gehört zu den Sommergewächsen: Seine Stengel sind niedergedrückt, ungefähr eine Spanne lang, roth, und mit weißen fest angedrückten Haaren bekleidet; zwischen

l) *Astragalus orientalis acaulos flore luteo. Tournef. coroll. inst. p. 28. Astragalus repens, barbae jovis foliis, acaulos ferme polyanthos. Ammann. ruth. 170. Astragalus subacaulis, floribus radicalibus numerosis subsessilibus. Linn. sp. pl. 2. p. 1073. n. 38. Syst. veg. ed. 14. p. 685. n. 46.*

m) *Astragalus acaulis, scapo erecto foliis longiore, leguminibus subulatis inflatis villosis erectis. Linn. sp. pl. 2. p. 1071. n. 30. Syst. veget. ed. 14. p. 684. n. 39. Astragalus alpinus totus fericeus, foliis acuminatis. Haller it. 83. t. 2. f. 3. Astragalus foliis ovato lanceolatis fericeis splendidibus. Haller stirp. helv. 506. t. 5. Astragalus non ramosus villosus et incanus spicatus, floribus purpureo violaceis. Ammann. ruth. 167. Phaca pedunculis radicatis hirsutissimis, foliolis ex ovato acutis, saepe imbricatis. Zinn. hort. goett. 343.*