Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit Doktors und approbirten Praktici zu Berlin, der Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ... allgemeine Geschichte der Natur in ...

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Zwey Varietaeten der Mondförmigen Bohne.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Visual Library

Zwey Varietaten der Mondförmigen Bohne.

Nat Lep: IX B:

Landesbibliothek Oldenburg

felchen gezeichnet: die Blättchen an den Blättern sind eyrund, aber scharf zugespitzt, und der innere lappe der Seitenblätter doppelt so schmal als die Nebenlappen.

Bohne, mondförmige, Phaseolus lunatus. Sie wächst in Benghalen wild, und windet sich an benachbarten Körpern hinauf; die Seitenblättchen ihrer Blätter sind nach aussen zu noch einmal so breit, ihre Blumen sind sehr klein und grün; nur die Seitenblättchen der Krone sind weiß, werden aber mit der Zeit gelb; ihre Hülsen sind glatt, und beinahe mondförmig, oder wie ein Säbel gekrümmt; ihre Samen sind gestreift und eyrund, doch etwas breit gedrückt. p)

— — Mungobohne, Phaseolus Mungo. Sie ist in Ostindien zu Hause, und auf ihrer ganzen Oberfläche mit bleichrothen Haren bekleidet; sie wächst aufrecht, ihr Stengel ist schlank und rundlicht; ihre Blätter haben länglicht ovale, nackende, mit Haren eingefaßte Ansätze; die Seitenblättchen sind an der äussern Seite wie ein halbes Herz, an der innern wie eine lanzette gestaltet, und haben noch besondere lanzenförmige Ansätze, die sich in eine Borste verlieren; ihre Blumen sitzen auf Stielen, die so lang, als die Blätter, sind, mehrere beysammen; sie haben eine gelbe Krone; ihre Hülsen sind zotig, und stehen mehrere in Köpfgen beysammen. q)

— — platterbsenartige, Phaseolus lathyroides. Man findet sie in Jamaika auf Wiesen wild; sie wächst

p) Phaseolus benghalensis scandens, siliqua acinaciformi, semine ovato compresso striato. Bergen fl. francof. S. 99. Phaseolus caule volubili, leguminibus acinaciformibus sublunatis laevibus. *Linné* sp. plant. 2. S. 1016, n. 2. syst. veget. ed. 14. S. 656. n. 2.

q) Phaseolus caule flexuoso tereti hirsuto, leguminibus capitatis hirtis. *Linné* syst. veget. ed. 14. S. 657. n. 15. Phaseolus hirsutus flexicaulis mungo affinis maderaspatanus caule tereti. Pluckn. alm. 290.

Landesbibliothek Oldenburg