

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Borragen.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173

Borragen.

S. 254.



Nat. Lex. g. B.





Borsten bekleidet; ihre Blätter sind eyrund, und sitzen auf eigenen Stielen einander gerade gegenüber, zunächst bey den Blumen abwechselnd, bald auf dieser, dann auf der andern Seite; ihre Blumen sitzen an den äußersten Zweigen und in den Winkeln der obersten Blätter immer mehrere an einem harigen Stiele; sie sind klein, hängen über, und haben eine blaue Krone, die in der Mitte auf gelbem Grunde fünf purpurrothe Punkte hat. Man kann sie aus dem Samen ziehen, den man im März auf ein Mistbett sät, die Pflanzen, wenn sie aufgegangen und stark genug sind, einzeln in kleine Töpfe setzt, die mit leichter Erde angefüllt sind, und in ein frisches Mistbett gegraben werden, und ihnen bey warmem Wetter viele Luft giebt r).

Borragen, egyptische, *Borago verrucosa*. Forskäl fand sie bey Rahira in Egypten, als eine eigene Art, ob sie gleich von der afrikanischen kaum verschieden zu seyn scheint. Ihre Blätter sind mit Warzen besetzt, die sich in steife stehende Borsten verlieren.

— — — gemeine, Borragen, gemeiner Borretsch, Bueretsch, *Borago officinalis*. Er wächst nun in verschiedenen Gegenden Europens wild, blüht im May- und Brachmonat, ist saftreich und kühlend, und enthält wahren Salpeter. Ihre Blätter stehen alle abwechselnd, bald an dieser, dann wieder an jener

ner

r) *Borago foliis oppositis petiolatis ovatis, pedunculis multifloris.* Linné syst. veget. ed. 14. S. 188. n. 3. *Borago foliis ramificationum oppositis petiolatis, calycinis foliolis ovatis acutis erectis.* Linné sp. pl. S. 197. n. 3. *Cynoglossoides africana verrucosa et hispida.* Jussard Abhandl. v. Paris 1718. S. 325. t. 11. *Cynoglossum boraginifolium et facie aethiopicum.* Plucn. alm. 34.