

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Braunwurz Hundsraute.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173



Bot. Lex. 9. B





lungswinkel, die übrigen abwechselnd, bald an dieser, dann an jener Seite; die Abschnitte ihres Kelchs sind rundlicht, und glänzen am Rande, wie Silber; an ihrer Krone ist die Röhre weiß, oder schwarzroth, die obere Lippe schwarzroth, die untere vielmehr fuchsroth. 2)

Braunwurz, Knotige, Braunwurz, Fischwurz, Kropfwurz, Rankenwurz, Feigwarzenwurz, Sauwurz, Saukraut, Scrophularia nodosa. Sie wächst in ganz Europa an saftigen Orten wild, hält zwey Jahre aus, und wird von Schafen nicht angekostet. Ihre Wurzel ist knollig; ihr Stengel wird bis sechs Schuhe hoch, theilt sich in mehrere Aeste, und hat stumpfe Ecken, ohne alle Einfassung; ihre Blätter haben einen widrigen Geruch, einen bitteren Geschmack, und drei starke Rippen, stehen paarweise, und sind länglicht herzförmig und am Rande leicht eingeschnitten; ihre Blumen stehen auf ästigen Stielen in langen lockeren Aehren am Gipfel des Stengels; die Abschnitte ihres Kelchs sind rundlicht, und haben einen weißen Rand, an ihrer Krone ist die obere Lippe purpurroth, die untere grün. Man hat die Wurzel in Würmern bey Schweinen, sie sowohl als die Blätter innerlich und äußerlich bey Menschen in Wunden, Brüchen und in der Goldader, die Samen auch in Würmern gerühmt. a)

Sg 2

Braun

- 2) *Ruta canina* Løb. ic. 2. p. 55. *Scrophularia foliis pinnatifidis, racemo terminali nudo; pedunculis bifidis.*
Linn. syst. veget. ed. 14. p. 560. n. 14. Scrophularia foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis.
Linn. spec. plant. 2. p. 865. n. 10. Scrophularia Ruta canina dicta. C. Bauh. Pinax. p. 236.
 a) *Scrophularia.* I. *Camer. epit. p. 866. Scrophularia foliis cordatis, racemo terminali.* v. *Royen hort. lugdb. p. 293.*