

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Boh bis Bry - Mit 66 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1790

Illustration: Zerschlossene Brunelle.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11173



Nat. Lex. 9 B.

651

auf;
pr. a)

folia.
wilt:
mal,
Rand
die
die
)

Sie
neine,
stmos
te zo
leicht
theilt
zielen,
enförs
stücke
ihre
nmit
ischen
bald
lippe
eine
gelbe

f. hist.
topifo-
ceola-
veg.
linea-
n. 3.



Brunelle, mit Iſopblättern. Zerſchliffene. 651

nur wenig gezahnt; ihre Blumenähre ſißt feſt auf; die Blumen ragen kaum über die Blattdecken hervor. a)

Brunelle, mit Iſopblättern, *Prunella hyſſopifolia*. Sie wächst ganz aufrecht, und bey Montpellier wild: ihr Stengel iſt zotig, ihre Blätter ſind rauh, ſchmal, und lanzenförmig, und haben einen ganz glatten Rand und keine eigene Stiele; an ihren Blumen iſt die Krone viermal größer, als bey der gemeinen, und die Schneide ihrer obern Lippe mit Haaren beſetzt. b)

— — — zerſchliffene, *Prunella laciniata*. Sie wächst in ganz Europa, doch ſeltener, als die gemeine, vornehmlich auf Weiden wild, blüht im Herbitmonat, und iſt zwar an ihrem natürlichen Standorte zotig, wird aber in Gärten glatt, und läßt ſich leicht aus Samen und Wurzeln ziehen. Ihr Stengel theilt ſich in Aeſte; ihre Blätter ſitzen auf eigenen Stielen, und ſind eyrund länglicht, die vier oberſten lanzenförmig, meiſtens nur dieſe gezahnt, oder in Querſtücke getheilt, von welchen das äußerſte das größte iſt; ihre Blumenähre iſt lang, und hat zwey Blätter unmittelbar unter ſich, die, wie die Blattdecken zwiſchen den Blumen, gleich breit ſind; ihre Blumen ſind bald größer, bald kleiner, und haben an der obern Lippe ihres Kelchs kurze Zähne, und zwar gewöhnlich eine gelbe

a) *Poiret voyage en Barbarie. 2. p. 188.*

b) *Prunella anguſtifolia integra hirsutior. Morif. hiſt. pl. univ. 3. p. 364. S. II. t. 5. f. 7. Prunella hyſſopifolia. C. Bauh. Pinax S. 261. Prunella foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus, caule erecto. Linn. ſyſt. veg. ed. 14. p. 547. n. 3. Prunella foliis lanceolato-lineariſ ciliatis ſubſeſſilibus. Linn. ſp. pl. 2. p. 837. n. 3.*