

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Americanische Buddlejr.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Americanische Buddlejje.

S. 322.



Nat. Tex. X. B.

el
)
s
;
)

n
n
s
s
e
n
s
g
n
n
e
s
s
n
e
r
s
r
s
t
e
r
n
s
-
.
.



häus mit zwei Furchen, das innwendig in zwei Fächer getheilt ist, und viele Samen enthält. Man kennt sechs Arten:

Buddleje, abendländische, *Buddleja occidentalis*; sie ist in Amerika zu Hause, und wächst viel höher, als die amerikanische: Ihr Stamm theilt sich in viele zarte Zweige mit dunkelbrauner hariger Rinde; ihre Blätter sind lanzenförmig, scharf zugespitzt, am Rande kaum merklich gezahnt, auf der untern Fläche nur wenig wollig, und schmaler, als bey der amerikanischen; sie sitzen einander gerade gegenüber; ihre weiße Blumen stehen in lockern, ästigen Aehren aufrecht an der Spitze der Zweige und quirlförmig um diese herum. s).

— — — **amerikanische, *Buddleja americana*;** sie wächst in Jamaika, überhaupt auf den karibäischen Eilanden an Ufern und Regenbächen wild, und dort bis zwölf Schuhe hoch; Ihr Stamm ist dick, hat eine graue Rinde und treibt am Gipfel gegen einander über stehende Aeste; ihre Blätter sind eyrund und mit einer braunen Wolle bekleidet; ihre Blumen haben eine gelbe Krone, und zeigen sich an der Spitze der Zweige in langen Aehren. r)

— — — **Kopfförmige, *Buddleja capitata*;** ihre Blätter sind lanzenförmig, scharf zugespitzt, und am Rande
 klein

Æ 3

s) *Buddleja foliis lanceolatis.* Linn. sp. pl. 1. p. 162. n. 2. syst. veget. ed. 14. p. 154. n. 2. *Buddleja foliis lanceolatis acuminatis integerrimis oppositis, spicis interruptis.* Mill. dict. bot. *Ophioxylon americanum, foliis oblongis lanuginosis mucronatis leviter ferratis bardanae instar subtus lanuginosis.* Pluckn. alm. 270. t. 210. f. 1.
 t) *Buddleja.* Amm. herb. 577. *Buddleja assurgens incana, foliis majoribus, spicis assurgentibus.* Brown. jam. 144. *Buddleja foliis ovatis.* Linn. sp. pl. 1. p. 162. n. 1. syst. veget. ed. 14. p. 154. n. 1.