

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Braune Bucken.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Straune Bucken.

S. 367.



Nat. Lex. X. 15.



Byttnerie, von Karthagena. **Buken.** 361

abwechselnd, bald auf dieser, dann wieder an der andern Seite der Zweige; seine Blumen sitzen in den Winkeln der Blätter an angehäuften Traubenkämmen, und haben eine weiße Krone. p)

Byttnerie, von Karthagena, Byttneria carthagenensis; sie weicht darinn von der rauhen ab, daß ihre Blätter eyrund sind. q) (Gm.)

Buk. S. Beyfuß.

Bukciniten, Bukcinum. S. Bucciniten, Buccinum.

Bukelbas. S. Wasserfeder.

Buken, Seriphium; eine afrikanische Gattung Stauden, deren Blumen fünf in einen Staubbeutel vereinigte Staubfäden und einen Staubweg haben; der Kelch derselbigen besteht aus Schuppen, die wie Dachziegel auf einander liegen; ihre Krone besteht aus einem Stücke, ist regelmässig, und sitzt auf dem Fruchtknoten auf; jede Blume hinterläßt einen länglichten Samen; Man kennt bisher vier Arten:

— braune, *Seriphium fuscum*; sie kommt in Stellung, Blättern, und dem äußern Ansehen den Blumen der Heide nahe; Ihr Stamm treibt holzige, rund-

3 5

p) *Byttneria. Linn. sp. pl. 1. p. 284. n. 1. Byttneria foliis lanceolatis, costa petiolisque aculeatis. Linn. syst. veget. ed 14. p. 236. n. 1.*

q) *Byttneria foliis ovatis, costa petiolisque aculeatis. Linn. syst. veget. ed. 14. p. 284. n. 2. Chaetaea aculeata. Jacq. amer. 17.*