

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Wolliger Burtzeldorn.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Wolliger Burtzeldorn.

S. 503.



Nat. Sex. X. 15.



Blätter sind wollig, und bestehen aus drey bis sechs Paaren Blättchen, von welchen die äußern größer sind; seine Blumen stehen einzeln, sind sehr groß, und haben einen guten Geruch; seine Samengehäuse sind ohne Stacheln, und enthalten zehn Samen y).

Wurzelorn, mit fünf Staubfäden, Tribulus pentandrus. Er ist in Arabien zu Hause; seine Blätter bestehen aus ungefähr sieben Paaren ziemlich gleicher Blättchen; seine Blumen haben fünf Staubfäden z).

— — — **wolliger, Tribulus lanuginosus.** Er wächst in Zeylon und in der Türkei wild; seine Stengel steigen in die Höhe, und sind lang, rundlicht, haarig und gegliedert; seine Blätter sind haarig, sitzen auf eigenen Stielen einander gerade gegen über, so daß immer eines kleiner ist als das andere, zu oberst abwechselnd, bald auf der einen, denn auf der andern Seite des Zweigs, und bestehen aus ungefähr fünf Paaren ziemlich gleicher, oval länglichter, doch etwas spitziger Blättchen, die wieder ihre eigene Stielchen haben; unter jedem Blatt sitzt ein lanzenförmiges, bald verwelkendes Nebenblatt; seine Blumen stehen jede auf einem eigenen haarigen Stiele, der kürzer als das Blatt ist, in den Winkeln der Blätter; seine

Ti 4

Frucht

- y) *Tribulus foliis senis pinnatis extimis majoribus, floribus singularibus.* *Brown. jam. n. 230. t. 132. f. 3.* *Tribulus foliis subquadrijugis, exterioribus majoribus, pericarpis decaspermis muticis.* *Linm. syst. veget. ed. 14. p. 401. n. 1.* *Tribulus foliolis subquadrijugis, exterioribus majoribus.* *Linm. sp. pl. 1. p. 553. n. 1.* *Tribulus foliolis trium parium pinnatis.* *Linm. hort. Cliff. 160.* *Tribulus terrestris, fructu turbinato, foliis lanuginosis.* *Plum. spec. 7. ic. 254. f. 1.* *Tribulus terrestris major, flore maximo odorato.* *Sloan. hist. jam. 1. p. 209. t. 132. f. 1.*
- z) *Forskal. flor. aegypt. arab. p. 88.*