

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Fig. 1. Cacadukam; Fig. 2. Camelleopard.; Fig. 3.
Camelotchen.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

F. 1. Cacadukam.
F. 2. Camelleopard. F. 3. Camelotchen.

Fig. 1. S. 670



Fig. 2. S. 655



Fig. 3. S. 663



Nat. Lex. X. B.

aus Mart. Conchylien.





die zu dem Geschlechte, das Linné *Lepas* nennet, gehören, ist die gegenwärtige die sonderbarste und seltenste. Sie gleicht einer Mütze, die sich manche mit Edelsteinen besetzt gedenken; sie gleicht auch dem

D. 9 2

Kamme

Theaur. Tom. II. tab. 61. fig. 8. p. 61. Corona Serpentum. Couronne de Serpent. Tom. III. tab. 16. fig. 3. p. 38. Concha anatifera coronaria. Coquillage anatifere couronnée. Chemnitz fortges. Concholyt. Th. VIII. S. 332. tab. 100. fig. 849. 850. die Seemütze. Der Cacadufamm. Die Schlangenkronen. (Chemnitz führt noch folgende Schriftsteller an: An Balanus *Rondeletii* in aquat. Cap. 29. p. 28? Valentyn Mus. Museor. p. 187. Brückmann Epist. itiner. Cent. 3. ep. 60. p. 813. Corona viperæ indicæ arundinacea. Periver Gazophyl. tab. 6. fig. 10. Balanus chinensis cristatus. Davila Catal. Tom. I. p. 406. n. 3. et 925. Couronne de Serpens. Savart d'Herbigny Dict. Tom. III. p. 195. Poncepieds des Indes. Argenville neuste Ausg. tab. 58. fig. B. 2.)

Linné Syst. nat. ed. X. p. 668. sp. 8. ed. XII. p. 1108. Sp. 15. *Lepas Mitella*, testa compresso-erecta difformiter striata. Habitat — Linné Mus. Reg. Lud. Ulr. p. 467. n. 5. *Lepas* testa compresso-erecta, difformiter striata, basi imbricata. Testa compressa, valvulis, quarum 4. interiores bifariam conniventes. 2. anteriores majores. 2. posteriores breviores. Exteriores quatuor, quarum Anterior Posteriorque cymbiformes, incurvae Posterior brevis. Laterales duae triangulares adpressae. Insuper squamae plurimae, parvae, basin testae cingentes. Basis tubulosa, imbricata squamis minutis. Valvulae omnes difformiter, fere ad angulum acutum, striatae. Müller Linnäisch. Naturf. Th. VI. S. 206. die Seemütze. Ann. Seine tab. 10. fig. 5. gelieferte Abbildung, welches im Texte unrichtig fig. 6. heißt, sind die folgenden Fußsähen. Linné Naturf. des Thier. Th. II. S. 459. id. nom. Meine Einleit. Th. III. S. 519. id. nom. Mus. Leers. p. 144. n. 1383. Voet-Teenen. Poussépieds. Onomatol. Hist. Natur. T. II. p. 131. Balanus Tulipaeformis striatus. Die Klippe von Larique, die Kumph 't Zuikerboodje, den kleinen Zuckerhuth nennt, heißt hier Zuckerbrod.