

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Bu bis Car - Mit 71 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1791

Illustration: Sumpfcalla.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11184

Sumpfcalla.

S. 649.



Nat. Lep. A. B.

Handwritten text in a narrow column on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and the narrowness of the column.



vermehrt sich sehr stark aus Nebenschößlingen, die man zu Ende des Erdemonats abnehmen, und die größte davon einzeln in Töpfe, die mit Ruchengarten-erde angefüllt sind, und in diesen bis in den Herbst in die freie Luft setzen, denn aber unter Obdach bringen, doch bey gelinden Winteren in eine warme Kasbatte und trocknen Boden, auch wohl, wenn sie nur etwas bedeckt sind, in das freie Feld pflanzen kann, aber überhaupt den Winter über nicht zu viel begießen muß. z)

Calla, morgenländische, Calla orientalis. Sie wächst bey Aleppo in Syrien an bergichten Stellen wild, und läßt sich leicht aus Wurzeln ziehen; man setzt sie in Töpfe, die mit leichter Erde angefüllt sind, und läßt sie im Sommer an freier Luft stehen, bringt sie aber im Winter unter die Rahmen eines gemeinen Mistbotts. Ihre Blätter sitzen auf sehr langen Stielen, und sind eyrund; ihr Schaft wird sechs bis acht Zolle hoch, und trägt eine einige weiße Blume. a)

Sumpscalla, Calla palustris. Sie wächst in den mitternächtlichen Theilen Europens in Sümpfen wild; ihre Blätter sind herzförmig; ihre Blumenscheide ganz flach, und auf ihrem Fruchtboden Staubfäden und Staubwege durch einander. Man kann
Es 5 daraus

z) Arum aethiopicum, flore albo odorato moschum olente. *Commel. hort. Amst. 1. p. 95. t. 50. Arum americanum, ari vulgaris facie, foliis carnosis. Mich. flor. 9. t. 2. Calla foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata; spadice superne masculo. Linn. sp. pl. 2. p. 1373. n. 1. syst. veget. ed. 14. p. 829. n. 1.*

a) Arum Carlaami. *Rauwolf it. 115. Arum minus orientale, rotundioribus foliis. Morif. hist. pl. univ. 3. p. 544. Calla foliis ovatis. Linn. sp. pl. 2. p. 1373. n. 3.*