

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1793

Illustration: Cassytha um die rispenförmige Trompeterblume.


urn:nbn:de:gbv:45:1-11224

Cassipha.
um die rispenförmige Trompeterblume. S. 48.



Nat. Leg. 113.





ter, bis er zäh und fest wird, und bedienen sich dessen statt Theer und Hede zu ihren Boten 1).

Cassytha, gehörnte, *Cassytha corniculata*; sie wächst auf der Insel Celebes auf Bergen, zwischen faulen Holzstämmen; ihre Nester sind einen Schuh lang, einen Finger dick, holzig, und mit einzeln stehenden, umgekrümmten Dornen besetzt; ihre Blätter sind lanzenförmig, gleichbreit, und kleiner, als die Dornen; ihre Früchte haben einen kaum merklichen Stiel m).

Castanea, f. Büche, Kastanie, Elefantenlaubbaum, Roskastanie, Sloaner.

(Gm.)

Castanie (Conchyl.); mit diesem Namen werden in der Conchyliologie mehrere Körper, bald Schnecken, bald Muscheln belegt, wobey man theils auf ihre Farbe, theils auf ihren Bau sahe. Ich will sie anzeigen und beschreiben.

— — — ohne weitem Zusatz heißt eine ausländische Erdschnecke n), die mit der oben unter dem Namen **Carcas**

1) *Acatia-valli*. *Rheed hort. malab.* 7. p. 83. t. 44. *Cassytha*. *Linn. sp. pl.* 1. p. 530. n. 1. *Cassytha filiformis laxa*. *Linn. syst. veget.* ed. 14. p. 384. n. 1. *Cuscuta Rumpf herb. amb.* 5. p. 491. t. 184. f. 4. *Cuscuta altera* f. major. *Periv. gaz.* 77. t. 49. f. 12. *Cuscuta baccifera barbadensium*. *Pluckn. alm.* 126. t. 172. f. 2.

m) *Callutha cornea*. *Rumpf herb. amb.* 17. p. 56. *Cassytha ramis lignosis spinosis*. *Burm. ind.* 93. t. 33. f. 1. *Linn. mant. pl.* 2. p. 237. *syst. veget.* ed. 14. p. 385. n. 2.

n) Müller *Hist. Verm.* P. II. p. 67. n. 262. *Helix castanea*, testa perforata subglobosa, obscura castanea, fascia rufa, albae