

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1793

Illustration: österreichische Chamille.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11224



Nat. Lex. F. 1. 5.

rone
des
abges
Ben
Nan

ieles
den
men
sen,
lie
o an
rone
fett,
zei
Taw
r im
ogen

h:

inné
n. a.
a al-
o af-
han
can-
m.

é sp.
n. l.
flora
32
nua.
uum
pitu-
t. l.



Chamille, Kriechende, *Anthemis repens*. Sie wächst in Karolina wild, und kriecht auf der Erde; ihre Blätter ſind einfach, eckrund, lanzenförmig, und am Rande ſtumpf, übrigens wie eine Säge gezackt; ihre Blumen haben eine ganz gelbe Krone c).

— — — öſterreichiſche, *Anthemis austriaca*. Dieſes Sommergewächs blüht den ganzen Sommer hindurch auf Saatkfeldern und an Wegen, und oft auf Brachfeldern ſo häufig, daß man glauben ſollte, es ſey hinein geſät; es hat einen bitteren Geſchmack, und in den Blättern, noch mehr aber in den Blumen, einen Geruch, wie das gewöhnliche Mutterkraut; ſeine Wurzel iſt äſtig und blaß, und treibt gemeinlich nur einen Stengel, welcher aufrecht kaum einen Schuh hoch wächst, und ſich wie eine Riſpe in Aeſte zertheilt; ſeine Blätter haben kaum merkliche Stiele, ſind etwas dick, kurz, und zweifach gefiedert; die Blättchen ſelbſt ſind ohne Stiele, klein und lanzettenförmig, ſtoßen nahe zuſammen, und haben eine ſteife Spitze, und einen ganz glatten Rand; ſeine Blumen ſtehen einzeln und aufrecht, auf eigenen Stielen, an den Gipfeln der Zweige; ihr Kelch iſt, ſo wie Stengel, Aeſte, und Blätter, mit einer kurzen, dichten Wollſe bekleidet, und wie eine halbe Kugel geſtal- tet; ſeine Schuppen ſind am Rande haarig; die Blumenkrone ſteht weit offen; die Blümchen am Rande ſind bey Nacht umgebogen, und haben eine weiße Krone mit drey Zähnen, von welchen das mittlere das kleinſte iſt; die mittlere Blümchen haben eine gelbe Krone; der Fruchtboden iſt kegelförmig, und mit

S 3 läng.

c) *Anthemis foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis obſolete ſerratis, caule repente.* *Walter flor. carol.* S. 211.