

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Friedrich Heinrich Wilhelm Martini der Arzneygelahrtheit
Doktors und approbirten Practici zu Berlin, der
Römisch-Kayserlichen Akademie der Naturforscher, ...
allgemeine Geschichte der Natur in ...**

mit vielen Kupfern nach Bomarischer Einrichtung

Von Cas bis Coq - Mit 74 Oktav-Kupfern

Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Berlin, 1793

Illustration: Cliffortie mit Stechpalmenblättern.

urn:nbn:de:gbv:45:1-11224

Cliffortie mit Steckpalmenblättern. S.



Nuet. Lex. XI. B.

olia.
zu
ichte
k).
ofci.
vier
dte
war
hin
aufe
eine
cht;
fde
teje
ves
Sei
h n
lein,

ere.
Dof
ager
mig,
).
lifi

bris.
pl
Eru-
folia
f. 3.
rvis



Cliffortie, mit Stechpalmenblättern, *Cliffortia ilicifolia*. Diese schwache Staude wächst in Ethiopien wild, und bis fünf Schuhe hoch, treibt auf allen Seiten Aeste, und blüht im Sommer. Ihre Blätter bleiben immer grün, umfassen den Stamm und die Aeste, an welchen sie abwechselnd, bald an dieser, denn in einiger Entfernung wieder an der andern Seite stehen, und sind ziemlich herzförmig, einfach, gezahnt, steif und bestäubt; in ihren Winkeln sitzen die gelblichgrünen Blumen einzeln n).

— — mit Wegtrittblättern, *Cliffortia polygonifolia*. Diese Staude ist auch in Ethiopien zu Hause, und hat einfache, gleichbreite und haarige Blätter o).

— — mit Zapfen, *Cliffortia strobilifera*. Diese Staude wächst am Vorgebirge der guten Hoffnung wild, und treibt wenige rundlichte Aeste; ihre Blätter sitzen auf einem ganz kurzen zweyzackigen Stiel, der in der Folge zu einem bleibenden, glatten, ziemlich eyrunden, halb verwelkten und eine Scheide vorstellenden Ansatz wird; sonst sind sie glatt, dreysach, gleichbreit und spizig p).

Cliff

n) *Arbuscula afra*, folio acuto ilicis caulem amplexo rigido. Willd. hort. Elth. 36. t. 31. f. 35. *Cliffortia foliis dentatis*. Linné hort. Cliff. S. 463. t. 30. *Cliffortia foliis subcordatis dentatis*. Linné sp. pl. 2. S. 1469. n. 1. syst. veget. ed. 13. S. 748. n. 1.

o) *Cliffortia foliis linearibus pilosis*. Linné sp. pl. 2. S. 1470. n. 3. syst. veget. ed. 13. S. 748. n. 3.

p) *Cliffortia foliis ternatis linearibus acutis laevibus*. Linné syst. veget. ed. 13. S. 749. *Cedrus conifera*, juniperi foliis, racemosa, conis candicantibus parvis. Pluckn. alm. 91. t. 275. f. 2.