

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLV.

VD18 90538889

XXXIV. De Cataracta Crystallina Vera, Dissertatio Medica.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16577

XXXIV.

DE CATARACTA
CRYSTALLINA VERA,
DISSERTATIO MEDICA.

Quam Praefide

J. FRID. CARTHEUSER P.P.

Tuebatur


JOACH. FRID. HENCKEL,

CHIRURGUS.

Francofurti ad Viadrum 27 Junii 1744

L 3





Landesbibliothek Oldenburg

§. I.

Admirabilem organi visus structuram nemo unquam serio contemplari potuit, quin in sapientissimi conditoris encomia excurrere quasi coactus fuerit. Et omnimo affabre oculus coordinatus est, ut diversa objecta simul, maxima colorum & formae varietate, locorumque differentia inter se distincta, nihilo minus summa celeritate dispiciat: quod sane omni admiratione dignissimum; conf. celeb. H A L L E R in comment. ad institut. Boerhav. vol. 4. p. 220. g. Quantum vero solatii adferat undique in deminis artificiosissima oculi fabrica, noverunt illi, qui haud satis deplorandam desideratissimi hujus organi passi sunt jacturam; imo & ii, qui vel leviores saltem ejusdem animadvertisunt noxam. Tametsi vero ad beate vivendum visus incolmitas maxime exceptetur, atque in sui conservationem & defensionem varia oculi obtinuerint praesidia, nihilo fecius pluribus pericolo plenis casibus subjacent. Non enim extraneis dumtaxat obnoxia sunt insidiis, verum & domesticos hostes alunt: quod patet attentius intuenti membranulas tenuissimas, vasculorum multiplicium texturam tenerimam, humorum adeo diversorum circulum, universam denique machinam hujus, ut ut parvulae, economiam amplissimam. Non vero animus est, in praesenti Dissertatione omnium morborum, oculos afficientium, historiam texere, unius saltem meminisse placet, scilicet ejus, quo crebrius lentem, crystallinam obscurari comperimus, ceterorum vero disquisitionem alii tempori reservamus.

§. II.

Hoc lentis crystallinæ vitium, patria lingua *der graue Staar* dictum, veteres artis medicæ statores *suffusione* adpellare solebant, recentiores autem *cataractam*, Græci *hypochym*, *hypochyma*, & Galli denique *cataracte* vocant. Uberiorem horum rationem D. Schacher in dissertatione de *cataracta* adfert.

§. III.

Loguum foret, eas recensere controversias, quæ circa *cataractæ* genesis, sedem & proprietates in scholis chirurgicis agitatæ hactenus fuerunt; neque etiam me judicem partium dissidentium constituam. Sufficit saltem commemorare, omnium passim auctorum sententiam in eo convenire: *cataractæ* scilicet nomine comprehendi opacitatem, quæ in parte oculi anteriori per corneam transparentem, sive in ipsa pupilla, sive retro eamdem



dem sese manifestat, quæque visum paululum hebetat, aut prorsus impedit & obscurat. Quæ diversa oculi affectio causa exstitit, cur eam autores in diversas species dividenter. Verum, cum & in hoc dissentientes eos offendam, intactis illorum opinionibus controversis, meam saltem adferre lubet sententiam.

§. I V.

Cataractam optime dispesci arbitror in veram & spuriam sive falsam. *Veram* nuncupo, quando pars organica oculi opaca redditur. *Spuriam* vero dico, quando visus quidem obscuratur, attamen sine vitio partis organicae. Porro *cataracta vera*, vel *crystallina* est; vel *membranacea*, vel *mixta*. Prior lentem crystallinam obscurat; altera telam seu capsulam lentis occupat, mixta tandem utriusque opacitatem notat. Rursus *cataracta spuria* distinguitur in *membranaceam* & *crystallinam*. *Membranacea* oritur, dum humorum oculi quispiam corruptelam patitur, extravasatus in pupillæ margine adhaerescit, & præternaturaliter formata membrana conspicitur: *crystallina* vero, quoties ex capsula ipsius lentis liquor corruptus profluit, & lentem eidem innatantem dissolvit, vel lens ipsa in liquamen difluxit. Supesedeo prolixiori oratione, cæteras *cataractæ* species describere, quæ Gallice vocantur *cataractes mures* & non *mures*, *branchantes*, *barrees*, *adherentes*, *simples* & *compliquées*, à ressort, en voyer Mr. Dionis, Maitre-Jean, St. Yves, Brieau, &c. cum, postulante themate electo, de *cataracta crystallina* & quidem vera, tantum differere mihi incumbat.

§. V.

Ex præfatis igitur patet, *cataractam crystallinam veram* esse morbum, qui humorent crystallinum diaphaneitate sua privat, quæ exorta opacitas à spissitudine humoris lentis crystallinæ atque partium, lentem crystallinam componentium, densitate, naturali longe majori, derivanda est. Unde non immerito celeber. *Astruc cataractam crystallinam* scirrum appellat, & Clariss. Dn. Nicolai Prof. Anatom. Argentor. in annotationibus super lib. de morbis oculorum ita de ea differit: peculiarem inflammationem esse hunc morbum lentis crystallinæ jure existimamus cum celeb. Pitcarnio, nimis enim calor coagulationem liquidorum circulantium facit; corpus crystallinum quoque est ejus indolis, ut, si majori paulo calore exagitatur, opacum fiat, exactissime referens colorem cataractæ, uti ex recentissime maestatorum animalium sumptis lentibus aquæ tepidae immisis expertus sum. De his plura sphæs sequentibus.

§. VI.



§. VI.

Exactam vero cataractæ diagnosis si habere cupiamus, sedulo in causas, quibus hoc vitium originem suam debet, inquirendum est. Hæ vero tum in fluidis, tum in solidis persæpe latent. Tenuissima namque lympha, per lentem crystallinam circulans, opacitatem eidem inducere potest, si ea nimur naturalem suam fluiditatem amiserit, & tenacioris indolis evaserit: quamobrem hic liquor limpidissimus, à crassi sua recedens, circulationi-perenni ac nunquam interruptæ per vascula summæ exilitatis ineptus redditur, & moras itaque nectens sensim sensimque spissior efficitur, donec tandem, subtilissima liquidi parte dissipata, crassiori vero magis condensata, penitus indurescat, ita ut lentem crystallinam lapideam soliditatis quandoque contueamus. Cujus rei exemplum Mr. Morand, chirurgus dexterinus Parisinus, in museo suo inter plura visu digna affervat, atque, docendo cursum operationum chirurgicarum, auditoribus numerosissimis, (quibus & ipse interfui) ostendere solet, humorem nempe vitreum, in osseam consolidatum duritatem, & huic inhærentem lentem crystallinam pro memodum petrefactam, de quo legantur quoque institutiones Dn. Heisteri chirurgicæ p. 602.

§. VII.

Inter plures gravissimos testes, oculi humores in substantiam lapideo-solidam degenerare posse, adserentes, est quoque celeberrimus HALLEKUS, (vid. ejusd. comment. ad inst. Boerhaeianas, vol. 3. p. 707.) Neque pathologia hujus possibilitati refragatur, quin imo evidentissime id ipsum probat. Siquidem diætæ vitia, moeror nimius, vita sedentaria, ætas senilis, feri & sanguinis evacuatio nimia, virus venereum &c. spissiore lympham reddere valent. Cui si socia accesserit causa quædam externa, facillimo negotio tristissimus hic oculorum affectus consurgit. Inter causas externas potissimæ sunt, frigus extremus, calor nimius, aquæ bullientis adpersio, ophthalmia contumax, adspactus diurniori objectorum minutissimorum, (cum per eundem muscularum quadantenus suspendatur actio, qua cohibita, sanguinis circulus quoque tardior evadit,) corruscationes fulguris, ignis lucidioris continuus intuitus, irradiationes lumino-fæ, adstringentia temere in ophthalmis usurpata &c., quarum quælibet, nullo etiam lymphæ vitio concurrente, cataractam crystallinam producere valet, præsertim, si quædam ex his causis, vel plures simul, pertinacius perfiterint. Plures hujus momenti historias vide apud Clariss. Brisseum.

Tom. II.

M

§. VIII.



§. VIII.

Præterea partes solidas lentis crystallinæ, etiam si lymphæ vitio careat, cataractæ subjectum subinde constituere, ex pluribus observationibus innotuit, si nimirum tonum suum amiserunt, aut lœse fuerunt ictu violento, contusionibus, vulnere, affluxu copiosioris crux & lymphæ. Idem contigisse observatum est in hemicrania frequenti, cerebri infarctu, faciei erysipelate, coryza frequentius revertente, totius oculi incremento nimio &c. Videatur *Dissert. de visus obscuritate à partu sub praetido Clar. Alberti Hale habita 1732.* Orta enim atonia solidorum, eorum cohibetur reæctio in humores, hi vero cumulantur, stagnant, in coagula abeunt, & tandem indurescunt, atque ita cataractam formant.

§. IX.

Impeditam vero circulationem humorum oculi, revera cataractam induere, cuilibet experiri licet. Lentem enim crystallinam animantis demortui contemplanti ea cataractæ incipienti simillima adparebit. Quare cum solida æque ac fluida hoc vitii genus inferre possint, tanto facilius id ipsum eveniet, quanto plures causæ simul in hujus mali generationem conspirant.

§. X.

Has, dum genuinas nostri affectus causas esse existimo, minime in eorum abire placet sententiam, qui acidum corrosivum pro causa agnoscunt: neque experimentissimo *Petit Medico Parisino* subscribo defendantem, contractionem validiorem musculorum & membranarum oculi lentem crystallinam comprimere, ejus partes distorquere, atque ita eam opacam reddere, quemadmodum haec legimus in *eius epistola gallico idiomate contra Clar. Hequet scripta*, in qua prolixius de oculorum morbis differit, simulque opinionem celeb: *Morgagni* exhibet atque refutat, lentem crystallinam indurari & obscurari autumantis ob defectum liquidi capsulæ lentis. Sed neque horum neque aliorum asserta epicrisi notare vacat; unde, his missis, atque mea sententia proposita, ad diagnosin transgrediar.

§. XI.

Quo igitur quis convictus sit, cataractam omnino adesse, probe animadvertere debet, an pupillæ color à naturali recesserit, & an post eamdem, albicans utplurimum, opacitas observeatur; etiam si frequentissimis observationibus innoverit, plures, antequam memorata cataractæ diagnosis appareat, conqueri, visum hebetari, atque sese minus distincte, nec consueto alias



alias more, objecta, præsertim remotiora, discernere posse. Serpit enim hoc vitium quandoque non advertentibus iis, qui eo dudum correpti sunt. Ita namque fidissima experientia certissime docet, quosdam cataracta jam laborasse, & nondum tamen ejus præsentiam animadvertisse, donec casu ipsis innotesceret; dum scilicet ab aliis pupillæ opacitas observata fuit, vel ipsi uno dumtaxat oculo, alterum claudentes, in objecta divagari nitebantur. Quæ res errori occasionem præbuit & effecit, ut cataractam subito obrepisse, autumaverint.

§. X I I.

Conclades ergo, cataractam jam jam incrementa sumere, quamprimum opacitatem quamdam lenti crystallinæ in forma nubeculæ subalbidæ, quodammodo densioris, paululumque profundius vides innatate, (communiter enim dicta opacitas in lentis medio visitur, quamquam *Clariss. Juncker* aliter sentiat) teque certiorem reddent patientis querelæ, atque judicium tuum confirmabunt: accusabit namque visus imbecillitatem, ac querulus referet, sibi objecta adparere, ac si ea interjecta sindone aut cribro cerneret, oculis observari puncta quasi volitantia nigra, item crines & mustas sese observare & similia, pro varietate nimis conditionis, & magis minusque solidescientis & expansæ cataractæ. Observabis porro, opacitatem sensim sensimque augeri, & latius sese diffundere, nunc quidem pendentim & lente, nunc vero ocyus, pro vigore scilicet cause malum producentis. Exemplum habemus in senibus, in quibus, ob ordinariam humorum spissitudinem, & majorem proinde dispositionem, cataracta celestius suboritur. Eo magis autem visus obscuratur, quo magis opacitas lentis increscit, quam evidentissime adesse enunciabis, quando maculam quamdam opacam lactescens coloris inibi apparere cernis, pupillam sensim occupantem, ac tandem prorsus obducentem. In hac visus obscuritate, prius quam ad acmen pervenerit, patiens primo nihil distincte, tandem umbræ faltem speciem discernit, eoque tempore lens à latere conspecta, circum ligretem spectandum præbet, qui vero cataracta increcente decrescit, minorque evadit.

§. XIII.

Hanc igitur cataractam à cæteris speciebus, infallibili ferme judicio, his signis dignoscet (1): à cataracta membranacea vera, quæ tenuior, planiorque offendit, & proxime pupillæ adhæret, nec circulus ille nigricans supra descriptus quoque observatur, qui tamen quandoque adesse poterit, si videlicet opacitas capsulæ crystallinæ non nimium increverit, & pupillæ centro sese opposuerit (2). A glaucomate autem cataractam crystallinam veram discernes, dum glaucomatis opacitas retro magis versus



lentem visitur , quam in cataracta (3). A cataractis falsis , v. g. purulenta &c. exacte eam , de qua agimus , distinguere , majoris videtur difficultatis (4). Si pars opaca lentis non prorsus cohæreat , sed filamenta seu fibrillulas hinc inde sparsas exhibeat , *fibrosa* , Gallis *cataracte barrée* , dicitur ; varias enim figuras sœpe dictam opacitatem habuisse , observatum est (5). Rursus aliam cataractæ speciem *fluctuantem* vocant , de cuius genesi disceptant inter se authores : alii enim contendunt , eam oriri , postquam lens crystallina prorsus indurata , & quasi atrophia adfecta est ; hoc enim pacto , dum nimirum lens inspissatur , fit , ut ea minori longe diametro describatur , quam illa cavitas , cui inhærente consuevit , ac proinde cum toties , quoties objectorum radios colligere annitimus , pro illorum conditione & situ remotiori vel propiori , pupilla plus vel minus coarctetur vel dilatetur , tum lens exsucca & inspissata , tum ejusdem capsula quodammodo convellitur . Alii vero paulo aliter , & ut mihi videtur , accuratius sentiunt , existimantes , humorum vitreum colliquari & dissolvi , ac vel ideo consistentiam suam amittere , & fluidiorem justo effici , lentem vero crystallinam e contrario indurari & condensari . Quibus positis , facile adparet , lentem , sustentaculo suo orbatam , ad quosvis motus oculi moveri & veluti fluctuando circumagi . Colliquationis vero humoris vitrei causa in certo , quem habui , casu , mihi olim visa est vehemens oculi percussio , qua tota quasi fabrica ejus admodum labefactata fuit , & cataractam fluctuantem produxit , cum pupillæ dilatatione simul relicta (6) . Quod colorem cataractæ attinet , is variat , juxta conditionem soliditatis lentis præternaturaliter inducta & humorum admixtorum indolem , putabilis &c. ; ita enim dexterimus quidam & in re medica versatissimus in subiecto temperamenti melancholico-bilioſi cataractam nigricantem adnotavit.

§. X I V.

Signa diagnostica cataractæ consummatæ seu , ut loqui amant , matutinae , vix crediderim exacte determinari posse , multo minus ad mentem veterum tamdiu expectandum esse arbitror , donec plenaria visus abolito per cataractam inducta fuerit , seu maturationis signa apparent , cum haec mora malum quandoque immedicabile reddat , de quibus vero plura infra adferre placet.

§. X V.

Frequentissime pariter accidit , ut in memorata oculorum affectione paralysia nervi optici simul adsit ; de qua ut convictus sis , scrutaberis , num visus multo debilior sit , quam quidem à cataracta fieri solet : nam cataracta non omnimode & totaliter patientem visu privat , sed eum dumtaxat hebetat , minuat & obscurat , ita ut umbræ cujusdam indistincta species oculis



oculis adhuc obversari videatur : in paralyfi vero nervi optici perfecta ut plurimum adest cœcitas. Deinde opacitas, à cataracta progenita, non augetur, licet visu distincto omnino deſtituatur æger, aut certe viſus abſitio opacitati lentis non respondet. Causæ tandem paralysis nervi optici quædam aut ſunt cum cauſis cataractæ communes, aut ab ipſa cataracta nonnunquam productæ : videatur *Theſis Dn. le Moine med. Parisiens.*, an deprimende cataractæ expectanda maturatio ? In §. 4to. 2. & D. H A L L E R p. 505. vol. 3. Plura de his signis in authoribus legantur.

§. X V I.

Consideratis itaque signis diagnosticis, atque cauſis cataractæ, nec minus hujius atque ægri conditione cognita, ad prognosin properandum, & circa eam hæc notanda ſunt (1). Cataractæ vix ac ne vix quidem, niſi admodum rariſſime, & faltem incipienti, diæta & phærmacia medetur, ſed ſoliſ medicinæ manualiſ ſeu chirurgiæ opera requiritur, niſi mora diuturnior medendi ſpem præcluſerit (2). Si cataracta glaucoma vel guttam ſerenam &c. comites habeat, chirurgica ope malum non extirpabitur (3). Si cataracta membranacea vera cataractæ crystallinæ veræ ſimul juncta fuerit, operatio dubii erit eventus (4). Cataracta fluctuans, unaniſi conſenſu, à chirurgiæ peritis incurabilis pronunciatur; interim tamen operatori provido fuſcepta operatio forſitan felicem ſpondere poterit effectum, ſi eam, quæ pupillam occupat, maculam diſtorquere & abſumere didicerit (5). Cataracta demum fibroſa diſſicilius longe curabitur, & facilius cataractam veram, ſcilicet ejusdem ubique conſiſtentia tolles (6). Cataractæ color non equidem omnis certitudinis optati eventus ſigna præbet, niſi opacitas in toto, quem occupat, ambitu, æqualis appareat, & eadem eamdem lentis duritiem manifeſtet: judicabis enim non proſlus à veritate alienus, cataractam requiſitam conſecuturam eſe conſiſtentiam, qua præſente, niſi quid obſtet, facile deprimi queat (7). De maturatione jam jam mentionem injecimus & diximus, quod, quo longiori moræ maturationem committimus, eo magis operationis effectum quandoque impedia- mus. Videtur etiam nervorum opticorum paralysis, (uti in diagnosti- dictum fuit), exinde facile exoriri poſſe. Imo hac ipſa mora perfacile fieri poterit, ut cataractam, capsula & uveæ adhærentem, eidemque quaſi adnatam, ſero nimis experiaris, quod ſane in medendo negotium dexteritate tua majus cauſabitur : vid. *Clar. Heift. in iuſtitut. chirurgic.* p. 603. §. 20. Optima vero, tum ægro, de viſus reſtitutione ſollicito, tum chirurgo, de cataractæ deſtructione cogitanti, ſpes affulget, ſi cataracta vera ſolitaria, & nullius falſæ ſodalitio ſimul coexistentis complicata ſit, niſi opacitas etiam puncta ejusdem per omnem peripheriam ſoliditatis ſint, ipsaque cataracta haud inveterata fuerit, (licet eamdem quoque feliciter curatam fuſſe exempla teſtentur), & ſi denique pupillam de facultate ſeſe



contrahendi & dilatandi nihil aut certe non adeo multum amississe constet. Haec vero signa, et si prognosin optimam formare videantur, & spem felicis operationis confirmant, nihilo secus, chirurgum, (quemadmodum in omnium morborum prognosi), cautum esse oportet, non enim certum omnino præfagiunt eventum. Videatur Doctoris Schankebanck *dissertatio, generalia monita circa prognosin rite instituendam tradens*, anno 1733. Hale sub præsidio D. Junckeri habita.

§. XVII.

Quamquam etiam omnia indicia optimæ notæ appareant, nemo tamen negare audebit, sub ipsa operatione facilissime contingere posse, ut optimam prognosin sinistra sequatur effectus; quem vel ipse sibi æger oculi distorsione & motu accersere valet in summam sui perniciem. Dexterimus quoque & versatissimus in arte chirurgus, licet eum nihil de structura artificiosissimæ oculi machinæ lateat, licet cautissime, & prorsus suspensa manu acum dirigat, omnemque industriosissime observare nitatur regulam, licet nunquam hactenus fallentem tulerit operam, spe sua excidere potest; quemadmodum id experientia comprobatur, & anatomiam oculi callenti hand ignotum esse potest. Quis enim, experientissimus licet fuerit, adeo secure operationem processuram sibi pollicetur, ut nulla plane nervorum ciliarium læsio, quæ ferme inevitabilis est, simul contingat? Horum autem læsio, operationem, cæterum dexterime administratam, frustaneam reddere potest, & æger fato suo minime eripitur, cuius rei olim testis fui.

§. XVIII.

Omnis quidem homines visus integritatem, ejusdemque, si ablata fuerit, restitutionem, summopere optant, rarius nihilominus, primis mox exordiis, ubi hebetiorem visum observant, congruam & adæquatam mendalam querunt. Casu interim oblate, indicationes formandæ erunt juxta naturam mali. Quod si ergo in fluidis causa delitescat, nimirum in eorum spissitudine & tenacitate, selectissima remedia adhibenda erunt, quæ imminentem condensationem lymphæ lentis crystallinæ impediunt atque dissolvunt, ne malum ultro serpens, eam induret, dummodo diuturnior mali mora hanc medendi methodum non efficerit frustaneam. Tanquam præstantissimum inter tot remedia peritissimi artis commandant millepedes, veluti efficacissimum resolvens, quorum ope stagnantis & in coagulum vergentis lymphæ condensationem prohiberi adserunt. Nec desunt tam in Gallia, quam in Hollandia, qui energiam millepedum ad viscibilitatem humorum dissolvendam eximie deprædicant. Clar. Ludolff Prof. Regius Berolin. de re medica optime meritus, millepedes in catalogo remediorum inter diuretica recenset, quorum principia activa in acri quodam sa-

lino



lino consistere gustus prodit & manifestat. Commendat proinde usum eorum citatus Vir famigeratissimus in morbis, a lymphâ viscido-tenaci & inertî oriundis. Præstantiores autem esse creduntur, qui in locis petrosis colliguntur. Vid. plura in *Prælect. chym. Experient.* D. Neumann p. 1286. Mirandum tamen, clariss. virum, & in chymicis optime versatum reticere indolem falsis millepedum, dum negative saltem adstruit, eum salem non esse nitrosum. Exercitatissimus *Dn. St. Yves Parisiensis*, & felicissimus affectionum oculorum domitor, potentem iis largitur virtutem & efficaciam. Propinat namque eosdem per integrum mensem in jure carnis vitulinæ, cum herbis quibusdam cocto, interposito nonnunquam cathartico, deinde per menses aliquot, singulis diebus, de eorum pulvere gr. XV. exhibet, semelque singulo menfe alvum movet. *Clar. Boyle in philosoph. experim. p. 154. & 155.* millepedes, cum vino albo exhibitos, unicum & præstantissimum esse in cataracta jam formata remedium internum adfirmat. Et D. *Woolhoufius* denique eorum usum commendat in actis Trevoltiensibus mens. Jan. 1706. art. 10. [a].

§. XIX.

Sed ne in recensione plurium Clariss. Virorum, de usu millepedum differentium, longior sim, id saltem innuere adhuc volo, minimie quidem convenire, a tantorum Virorum experientiis omnimode dissentire, non esse tamen etiam necesse, ut in eorum opiniones & verba juremus. Elucessit quidem, etiam a priori, eorum effectus haud contemnendus e principio acri salino, quemadmodum id dilucide in *Elementis pharmacologiæ universæ laudatus Clar. Ludolff docet.* Verum, convictus loquor, præstantiora & magis activa prostant hujus generis pharmaca, quæ humores spissos attenuare & crassi naturali restituere queunt. Quis enim in hoc pas-

su

[a] Cum hæc jam scripta essent, subministravit nobis suum de millepedis judicium D. *Fabri*cius *Pharmacopola Berolinensis soleratissimus*, quod, haud sine laudis præfamine Viri in chymicis versatissimi & admodum gnari, hoc loco subjungere placet. Testatur nempe, millepedas continere salem quedam nitrosum imperfectum, aphronitro in cellis excrescenti similem, cui juncta sit falsi communis portio exigua, quam sapor prodit: solvit menstruo aquoso quarta millepedarum pars, & post evaporationem extractum quoddam mucilaginosum salinum relinquitur. Spiritus vini millepedis superflusus colore, viridescenti propinquo, tingitur; ex quo concludit Vir prælaudatus, pauxillum quoque relinas eidem immixtum esse. Millepedas etiam pulverisata & integræ, uti porro retulit, effervescent cum acidis, non ideo quidem, quod sal alcali aut urinosum iis inharet. sed potius ob partes terreas, quæ, veluti conchilia, alcalescentis sunt idolis. Nec deficit experimentum, quo luculenter veritatem opinionis suæ comprobare valet; nam menstruum aquosum, quo partes solubiles millepedarum extractæ sunt, cum acidis minime effervescit, sed coagulatur, residuae vero partes terreas admodum cum iis effervescent. An quoque salem ammoniacalem contineant, facile etiam explorari poterit, si experimentum cum majori millepedarum quantitate instituere cuidam placeret.



si non tribuit majora encomia mercurio , camphoræ , sulphuri antimoniī aurato tertiat p̄cipit . &c. ? Quorum usus , sive per se , sive cum aliis remixta exhibeantur , uti dulcis cum asellis , commendatur . Cum vero præsentis instituti non sit , horum remediorum examen instituere , de iis quædam obiter saltem attulisse jam sufficiat . Plura suppeditabit legere cupienti Clariss. D. Astruc in tractatu de morbis venereis ; Dn. Pott in Dissert. de camphoræ circumspetō usū medico anno 1722. edit Halæ Magdeb. Conferri etiam possunt Dn. Schreiberi in commercio Literario Norimberg. observationes & cogitat de Peste , que anno 1738. & 1739. in Ucrania græssata est . Auxilium quoque , a topicorum usū expectandum , tantum non est , ut ea cum præstantioribus eamdem provinciam obtineant , aut meliora , iis in usum vocatis , negligantur , de quibus videantur Clariss. Nicolai in annotationibus super libr. de morbis oculorum , itemque Dn. St. Yves , qui ita de illis differit : Difficile est , ut penetrant per membranas & resolvant impacta . Et loco eodem : aliqui tanquam optimum remediarū applicant mercurium soli capiti & proxime ad oculos usque ad salvationem : Verum & hæc methodus emolumentum peculiare , ut nihil videtur , non spondet.

§. X X.

Quando partes solidæ tonum suum amiserunt , & ab elatere suo recesserunt , adeo ut ob laxitatem suam humores consueta lege propellere nequeant , hi in viis suis cumulatiū congregantur , immobiliores evadunt , stagnare coguntur , & vel inde magis incrassantur , atque cataractam producunt . In horum omnium causam sedulo pariter investigandum , atque videndum erit , num scilicet ophthalmia contumax , hemicrania frequentior ac diuturnior &c. ansam præbeant ? In hisce enim affectibus , insolito sanguinis affluxu , oculi vasa interna nimium distenduntur , & cataractæ via sternitur . Quare , rebus sic comparatis , nimius sanguinis humorumque appulsus aliorum derivandus erit , ne nimio impetu & copia humorum oculi vascula obruantur . Id præstabunt medicamenta diluentia , attenuantia , roborantia , diuretica , leniora purgantia , pediluvia & maxime vegetatoria & venæ sectio , vice repetita & convenienti ordine administrata , & similia .

§. X X I.

Sed missis remediis pharmaceuticis aliisque : ad describendam ipsam operationem chirurgicam accedam . Lente enim eo usque indurata , ut cataractam crystallinam jam jam formatam esse omnibus notis compertum fit , nihil morari licet , sed confessim ad operationem confugiendum est . Plurimæ quidem supersunt methodi & normæ , quibus cataractæ depositionem suscipiendam esse Authores statuunt , inter tot tamen , quæ traduntur , duæ saltem in usu hodienum sunt : quarum alteram , quæ ma-

xime



xime ab omnibus passim præsenti ævo eligitur, authores, uti *Mr. Maitre Jean*, *Mr. St. Yves* &c haud satis perspicue descripsierunt. Alteram, priori recentiorem, inventor ejus *Dn. Ferren* Doct. Med. Facultat. Parisiens-, (cui ob fidelissimam instructionem ad cineres usque devinctus sum), communicavit 1717. Academiæ scientiarum Montpelienſi, licet *Dn. Petit* Doctor Medicinæ Parisiensis ejusdem ſibi arrogare inventionem non erubescat; quemadmodum in erudito alias ſchediasmate, 1728. Academiæ Parisiensi exhibito, evincere allaboravit. Eodem anno *Vir Clr. Maine*, Medicus Parisiensis; anno vero 1732 *Vir Doctiss. Ferren* hac de re commentati ſunt, & anno tandem 1740. *Cursus operationum chirurgicarum experientijsimi Dn. Dionis cum notis Viri Celeber. Dn. la Faye* emendatior prodūt; in quibus ſingulis operationis hujus administratio fuſiſſime traditur. Pluribus itaque annis laudatam operationis methodum uſu veniſſe, ex paulo dictis conſtat. Quamvis igitur iſi tutiſſima ſit, ac ſepiſſime jam adhibita, mirandum tamen, quod non ſolum in pluribus Germaniæ, verum etiam in multis Galliæ provinciis ejusdem excellentiam plurimi ignorent. Pro mea ſane ſententia illam omnes imitari debent, quoꝝ cataractæ auxiliatrices admovere manus decreverunt, dummodo, comparata ſibi prius oculi ſtructuræ cognitione exactiſſima, authores præfatos diligenter per- volverint.

§. X X I L

Vidi perſepe maximo oblectamento operationis ejusdem ſuccesſum operatiſſimum Lutetiæ Pariforū, licet viro felicifimo, qui eam adornabat, hæc ipſa methodus nondum perſpecta, ut mihi videbatur, fuiffet; quod operationis tamen ſecuritati minime contradicit. Non raro enim accidit, nos quædam ad amuſiſim & affabre prætare, licet rationem adæquatam, eur hæc ita & non aliter fiant, reddere neſciamus. Eamdem hanc operatio- nem Cel. *Taylor*, oculiſta Anglus, (qui ſuperioribus annis multo cum ſtrepitū in eruditō orbe aucepari nitebatur aplauſum), imitari conatus, eſt; uti id ipsum ex *Celeber. Heiſteri infit. chirurg.*, ut & ex proprio vix nominati authoris libro, Parifiſis anno 1738. *mechanismo oculi* editio, vide- re licet; quem poſteriorē avide pervolvens, minime talem methodi de- ſcriptionem reperiſſe potui, qua expectationi meæ ſatisficeret, ſed potius ſat obſcure, ne dicam, confufe, eam tractationem exaratam eſſe, cum plu- ribus modeſte ſentio. Experientia quoque me convicit, non adeo multum ejusdem dexteritati fidendum eſſe, quoniam, uti ſcripta teſtantur, minus claram de artificiоſa hac operatione concepit ideam; eamdem infuper parum feliciter ſuccedere obſervavi, licet multis encomiis encheires ſuas extolle- re, irri tumque earum ſuccesſum excuſare perbelle adlaboraverit. Commen- datur nihilominus a *Celeb. D. Heiſtero* hiſ verbis. *Interea tamen præcipua momenta revera merentur, ut a prudentioribus medicis oculariis probe perpen- dantur, atque cum iudicio imitentur. Tempus preſtantiam ēſſe effectus docebit.*

Tom. II.

N.

§. XXIII.



§. X X I I.

Quo hujus igitur operationis præstantiam clarius perspicias, & eo secundum effectum ab ejus administratione promittere queas, haec probe notanda sunt (1). Ex supra dictis constat, cataractam crystallinam veram in capsula sua libere hospitari, & minime eidem adhaerere; quod si vero observaveris, eam adhaerere, cataractam complicatam seu mixtam esse judicabis, adeoque operationem aut non tentabis plane, aut effectum dubium, ne dicam, nullum, praedices. Haud minimam vero difficultatem parit disquirentibus, ut certo constet, an cataracta adhaerat capsulae suæ, nec ne: adeoque istud exploraturus in id animam intendas, & videoas necesse erit, num uera quoque adhaerat capsulae, nec ne, itemque an haec simul opaca reddita sit; quod ferme toties observatum legimus, quoties cataracta capsulae cohærente comprehendisse, prodiderunt, nulla capsulae opacitate conspicua. Præterea, generata cataracta crystallina, capsulam paululum compactiorem & solidiorem apparere, tradunt, cum pelluciditatis aut nullo omnino aut vix notabili detimento (2). Cataracta modeste ex capsula detorquenda est, ita ut haec in parte anteriori illæsa permaneat. (3) Inciso igitur adornanda in parte capsulae posteriori, perque eamdem in humorem vitreum cataracta translucanda; in quo, (notantibus supra laudato *Clariss. Dn. Ferren in Thesi, atque Dn. Deidier in tractatu de tumoribus*), ne vestigium quidem cataractæ superfuisse in defunctorum corporibus, quibus viventibus operatio haec administrata fuerat, compertum est; luculento sane indicio, eam inibi penitus dissolutam fuisse (4). Demum cataracta depressa nunquam nativitatis suæ locum repetet, quando semel debito modo in humorem vitreum propulsa fuit (5). Denique ita acus dirigenda est, ne in cameram posteriore humoris aquæ immagratur. Plura, eaque notiora, brevitatis causa, commemorare supersedeo.

§. X X I V.

Proinde omnibus animadversis, quæ felicem operationis eventum spondent, chirurgus, peritiæ suæ fidens, operi se accingat, præmittatque remedia generalia, (ex mente enim *Galenii* non sanandus est oculus, nisi prævie sanato capite, neque hujus restitutio tentanda est, nisi prius reparato integro corpore), de quibus tamen hoc loco speciatim agere, supervacaneum duco: neque etiam in recensendis circumstantiis & miniculis minoris momenti prolixior ero; ea enim, uti & quo situ locandus sit æger, aliunde peti possunt. Porro utuntur quidam instrumento, quod speculum oculi vocant, eoque oculum firmare student, satius vero erit, eo non uti. Acum quoque (*die Staaar-Nadel*), in operationis hujus usum desti-



destinatam, celeb. St. Yves in libro suo hujus argumenti describit. Ministro itaque ægri caput, paululum reclinatum, firmius sustentante, atque duobus digitis superiorum oculi palpebram diducente, chirurgus pro re nata, vel lœvæ manus digitis duobus, palpebram deprimit inferiorem, atque alterius manus digitos, auricularem scilicet & annularem, in regione temporum ægri, qui oculum versus nasum dirigere, & immotum servare debet, firmat, tribus vero prioribus acum, distantia duarum circiter linearum, à cornea transparente infigit, pertunditque tunicam oculi conjunctivam, albugineam, sclerotican, choroideam & retinam, & postquam in humorem vitreum pervenit, acum ad partem posteriorem & centrum lentis crystallinæ dirigit, (tutius futurum existimo, si incisio capsulae in ejus latere, non vero in pupillæ medio, fieret; hoc enim loco ea pro cataractæ depressione magis accommoda videtur; imo incisio transversalis partis posterioris & inferioris capsulae infra pupillam haud inconfulto instituitur), manum tamen tantisper tempora versus retrorquere debet, ut apicem acus antrorum infigere, capsulamque lentis crystallinæ parte sua inferiori incidere queat, (quam incisionem Clär. Ferren in prælectionibus suis privatis la Boutonnier vocat), postea acum versus partem cataractæ superiorum protendit, aut ipsi cataractæ infigit, atque hoc pacto cataractam deorsum retro in humorem vitreum agit, eamque aliquantulum depressam tenet, quo humore vitreo undiquaque circumfundatur, hic vero, disrupta sua membrana, locum crystallinæ occupet.

§. XXV.

Accidit tamen quandoque, ut cataracta capsulam deserere renuat, quo præsente casu iteratis vicibus, pro rei exigentia, depressione ejus in humorem vitreum tentanda est: quibus peractis, oculorum palpebræ altera manus, qua inferior oculi palpebra depressa erat, clauduntur, acusque cautiissime eximitur, cavendo, ne subito lucis radii in oculos irruentes tenerimis retinæ fibrillulis noxam inferant, atque posterius malum pejus redditur priori. Tandem inflammationi medicamentis consuetis decenter propicitur, nimirum spirituosis temperationibus, vinosis, camphoratis &c., venæ sectione aliisque, quæ necessaria videbuntur. Galli, operatione perfecta, anodynūm propinare consueverunt, ad arcendos nimirum vomitus, qui nonnunquam superveniente observati fuerunt.

§. XXVI.

Methodum nunc descriptam, ejusque utilitatem & præcellentiam, cum olim, occasione publicæ demonstrationis, proponerem & collaudarem, infringere quidam conabatur de se medica vir præclare alioquin meritus, ac magnæ & felicis famæ, existimans, si capsula lentis crystallinæ juxta



methodum prædictam in parte anteriori integra permaneret, eamdem elapsis pauculis septimanis indubie obscurari debere, experientiam suam pro argumenti sui confirmatione adducens. Verum enim vero, si hæc obseratio, (à falso cæteroquin operationis suspicione vindicata), omnino veritate niteretur, quod tamen vix credo, unica saltem esset, quæ nondum veritatem assertionis meæ evertit, neque experientiæ nomen meretur; magnum enim experimentum inter & experientiam versatur discrimen, & una hirundo (ut commune fert proverbium) non facit ver. Utut vero se res habeat, uni huic experientiæ plures felicioris successus, tum ex observatione aliorum clarissimorum virorum, tum ex propria depromptas experientia opponere possum observations. Præterea haud demonstratum est, operatorem illum, cuius sinistræ administrationis historia argumentum contrarium suppeditavit, juxta methodum à me traditam processisse; quin imo, observatis etiam in operatione observandis, in capsula lenti crystallinæ dispositio ad cataractam membranaceam veram forsan adfuit, quæ per ipsam operationem, cæterum debite institutam, in veram cataractam mutata videtur. Ejusmodi cataractam mixtam in quodam adhuc vivo subiecto Berolini confspexi, & à quocumque illa adhuc confspici potest. Cujus rei exemplum etiam alibi vidi, &, cataracta crystallina rite deposita, cataracta membranacea vera illico evidenter confspiciebatur.

§. X X V I I.

Quis igitur non clare videt prærogativam hujus methodi, & summam ejus utilitatem? Quippe qua celerrime visus amissi restitutio procuratur: quod sane, maturitate expectata, haud ita tuto evenit, imo hanc ipsam maturationis expectationem ansam præbere guttæ serena genesi, supra jam innui. Porro, eadem hac methodo adhibita, cataractas immaturas & caesofas (uti eas vocant) felicissime absuntimus. Constat enim, soliditatem naturalem lenti crystallinæ acui jam resistere, & eo magis ideo illud facere, quando præternaturalem duritiem adepta fuit. Denique hac via incedentes, si saltem caveamus, ne anteriorem capsulæ lenti crystallinæ partem lèdamus, id commodum nanciscimur, cuius mentionem *Clarif.* Ferren in *Thes. sua* p. 40. diserte his verbis injectit (1). Suffusionis partes durae, molles, lactescentes &c. à camera oculi anteriori avertentur, & plurima operationis impedimenta amovebuntur (2*). Vitreum corpus, crystallinæ lenti sedem jam tenens, & in singula membrana illius puncta equali virium momento nitens, parte sua anteriori abibit in sphæra segmentum, quo radii lucis apte refringentur & crystallini defectus pensabitur: dum perfoſſa pro more solito ea membrana, neque vitreum corpus idoneam ad radios congregandos figuram induere, neque suffusionis fragmenta à camera oculi anteriori averti posse evidens est. Cæterum suffusionis flocculos, per vitreum corpus dispersos, haud multum curabis; constat enim, cataractam ipsam depositam ita absioni posse,



posse, ut ne minimum quidem ejus vestigium super sit, quod in duobus oculis, cum praelaudato Professore Deidier sectis, observavimus. Nulla pariter, adhibita hac methodo, ligamenti ciliaris laesio, quae, si in parte anteriori incisionem faciamus, facile accidit, metuenda erit, uveae quoque integritati prospicimus, inflammationis periculum evitamus, aliaque prava accidentia, laesionem praefatam concomitantia, arcemus. Conf. Experient. D. Dionis cursus operationum chirurgicarum p. m. 556. Consentientem præterea respectu optimæ hujus methodi habeo virum nunquam satis laudandum doctissimum Dn. Morand in arte chirurgica facile principem, qui disertis verbis in proxime ad me datis amicissimis literis affeveravit, methodum nostram optimam & securissimam esse: cujus consilio aliam adhuc cautelam, præter allegatas ad felicem operationem necessariam, debo: jubet scilicet, à cebriori acus in humore vitreo distorsione abstinere, ne ea forsitan quædam membranæ illius opacitas inducatur. De hoc casu nulla quidem mihi nota reperitur observatio, nihilominus circumspectio, etiam summa, nunquam nocebit.

§. XXXIII.

Benevolo Lectori, uti spero, haud displicebit, æquo animo interpretari, quæ, pro asserti mei veritate stabienda, subnectere, quæque qualicunque industria propria experiri adlaboravi. Cum scilicet, cœca minime authoratum & hypothesis amore ductus, veritatis studio insisterem, ut tandem certius firmiusque de quibusdam quæstionibus controversis eruere testimonium, & maxime de veritate descriptæ methodi me convictum reddere possem, deficiente occasione, in subjectis viventibus tentamina mea instituendi, accidit, ut anno præterito amicus meus D. Schæffer, chirurgiæ studiosissimus, (*Pensionnaire du Roi*) quiq[ue] iis, qui infirmorum curationi in magno nosocomio Berolinensi, vulgo *la charité* dicto, destinati sunt, præpositus erat, oculum, cataracta crystallina affectum, e cadavero eo tempore defuncti cuiusdam eximeret, meæque disquisitioni offerret. De prima igitur hæc occasione, propriis oculis manibusque experimentum diu flagitatum suscipiendo, plurimum gavisus, sequenti modo rem aggressus sum: singulas nempe oculi tunicas detraxi, humorem vitreum dumtaxat, & in eo capsulæ suæ pellucidæ inclusam lentem crystallinam, cataracta obsecratam, volæ manus meæ imposui; &, cum instrumentum, cataractæ depositioni adhiberi solitum, ad manus non esset, acu majuscula, usui ordinario dicata, capsulam fissura longitudinali in parte superiori antica ad imum usque divisi: deinde acum humoris vitreo inserui in parte posteriori capsulæ lentis crystallinæ, atque, illa rufsum versus, una cum cataracta, in locum fissuræ capsulæ partis anterioris detrusa, protinus cataractam adhuc molliusculam per dictam aperturam exturbavi. Alio rufus tempore prædictus amicus meus D. Schæffer duos oculos, cataractis mixtis affectos, quos primo mox intuitu, citra oculorum tunicarum separationem, tales agnoscebat,



obtulerat. In harum disquisitione eodem, ut nunc retuli, modo processi, præterquam, quod acum operationi huic competentem adhiberem, eamque, illico humoris vitreo immissam, in partem posteriorem capsulae dirigere, incisioneque tentata cataractam crystallinam in humorem vitreum levissimo negotio translocarem. Capsulam lenticularis crystallinæ, quæ quasi tota opaca & solidior paulo, quam in statu naturali, deprehendebatur, in parte antica inviolatam reliqui. Cataracta crystallina omnino condensata conspiciebatur, mollis tamen quædam, albida, & mucosa humiditas, quæ de lentis crystallinæ superficie, uti videbatur, secedebat, in capsula remansit. Plura investigare volentem hactenus occasio destituit, nisi, quod ante menses circiter decem in homine vivente laudatam methodum exercere licuerit, eo cum successu, ut patiens intra quattriduum minutissima quæque exactissime discernere valeret: superveniente vero tussi immani, quæ validissimam totius corporis concussionem efficiebat, ingentes oculorum sequebantur doles, cum eorumdem inflammatione pessima, nec nisi longe labore & mora dissipanda; quo facto, omnia, quæ visu asséquiri nitebatur æger, rubra & ignea eidem apparebant, flavus tandem omnium objectorum eidem videbatur color, donec visum penitus amitteret: ipsa vero pupilla valde concretabatur, atque in hoc statu perseverabat. Incisionem ipsam retro capsulam, paulo extrorsum à latere, non in parte pupillæ medio opposita, insti-
tui. Quæ denique de deligationis apparatu dicenda forent, relata inveniuntur apud authores.

§. X X I X.

Nemo vero, ut confido, me inculpabit, quod oculi descriptionem anatomicam sicco, ut aiunt, pede præteriori, cuius adcuratissima cognitio in ardua hacce operatione desideratur. Consulto enim id factum est, partim ne prolixior essem, partim, & quidem maxime, quoniā apud innumeros propemodum rei anatomicæ scriptores oculi delineatio adeo eleganter proficit, ut nihil addi posse videatur. Minus quoque diffiteor, præsenti tractationi multum luminis accedere potuisse, si cæteras cataractæ species, seorsim de singulis agendo, premisissem: verum, quicquid brevitatis gratia hæc vice prætermisi, alii tempori reservatum esto. Plures pariter quæstiones supereffe, quæ in hocce opusculo haud enucleatae fuerunt, lubens largior; quas vero opportuniore tempore, quo plus mihi erit otii longiorque experientia, resolvere constitui; interim de his à doctioribus meliora expectans. Præsentibus enim duntaxat excitare volui attentionem apud eos, qui artificiosæ huic operationi administrandæ operam suam impendunt. Neque arbitror, hæc, qualiacumque sint. absque fructu futura, modo æquo animo & prudenti adhibito judicio interpretentur.

§. X X X.

Ferrens igitur, ea qua fieri potuit brevitate, causis generationis cata-
ractæ,



ractæ, ejusque diversitate, & depositionis methodo, patet, alia adhuc operationi actuali præmittenda esse remedia, quibus humores ad debitam crasis revocentur atque in fluiditate naturali conserventur, & alia quoque, quibus partibus oculi solidis consulatur, ut per eas ordinatus humorum fiat circulus, alia denique operationi subjungenda esse, ne inflammatio subsecutura felici cæteroquin operationi novam superinducat tragediam, & leges tandem observandas esse diæteticas, ne, admissa noxio quodam potulentorum & esculentorum genere, aut accidente animi perturbatione, corporis motu nimio &c., spe optati finis excidamus: Quæ cum omnino vera sint, omisum me impetraturum confido assensum, quod chirurgus, huic similibusque se devovens operationibus, negotia sua salutari profequi nequeat eventu, nisi e scholis medicis præcepta, consilia, aliaque sibi necessaria subsidia petere sciat. Concedent quoque, medicum, universam licet materiæ medicæ penum perquisiverit studiosissime, atque selectissima & maxime appropriata adhibuerit remedia, nisi chirurgiæ persæpe accesserit peritia, congeneribus præcipue malis, de quibus nunc differuimus, dicam minime scribere posse. Ex quibus, ut in limine dictum est, clare sequitur, maximam inde nascituram utilitatem, si medicinæ chirurgia & huic Medicina amico jungeretur connubio.

F I N I S.

Dissertatione hac jam jam sub prelo sudante, curiosa omnino & admiratione dignissima obserratio de *visu*, per spontaneum cataractæ defensionem restituto, in *Miscellaneis Berolinensis* Tom. I V. Part. 3. p. 258. facta mihi fuit obvia. Cum in ea autem multa reperiam, quæ illustrandæ dissertationi meæ inserviunt; & adserti primarii veritatem, facta debita applicatione, egregie confirmant, potiora hoc loco adnotare placuit: Cum § vo XI. Dissertationis meæ conferantur, quæ l. e.p. 262 No. 7. extant: *foror mea me mouuit &c.*, cum § vo XXV., quæ occurunt p. 264. n. 10. *ast non toleravi lumen clarum &c.*, & cum §. XXV. VI. VII. VIII. IX. X., quæ p. 266, b., 277. c., & 284. seq. leguntur. Illustravit hanc observationem epicrisi sua Vir perspicacissimus, & in omni re literaria, maxime autem iis, quæ ad scientiam naturalem & medicam spectant, experientissimus D. D. Ludolfus Prof. Med. Berolinensis famigeratissimus, ut ea vel ideo faltem legi mereatur. Tanta enim perspicuitate, tantoque judicii acumine pro more suo rem aggreditur, ut omnem omnino in enucleanda ac demonstranda novitate rei & veritate paginam absolvat, & nullo perlegendibus dubio relicto, cunctos in assensum rapiat.



(104)



DE



Landesbibliothek Oldenburg

P R A E F A T I O.

DE suffusione, inter innumeros morbos, quibus oculi patent, quam maxime vulgari, aliqua memorie prodituro, non pauca in mentem venerunt, quæ, quo minus, quod mihi propositum fuit, exequenter, impellere me poterant, atque a difficillima hujus morbi expositione animum abducere. Atque ex his quidem nouum minimum id fuit, quod nuper admodum civium nostrorum mentem linguamque occupavit, peracte in hac urbe, a famosissimo circulatorie Joanne Taylor, cataractæ curationes numerosissimæ. Facile enim futuros esse prævidebam, qui me, vel inscriptione hujus libelli inspecta, criminentur ex his ipsis curationibus, de cataracta ita scribendi occasionem arripuisse, ut, quæ a magistro illo didicerim, partim tanquam mea proponerem, alienisque adeo me plenis ornarem, partim vero ejus errores, modo aliqui sint, acriter perstringerem. Hæc autem, ut me aliquantum commoverint, dimovere me tamen a proposito eo minus potuerunt, quo magis notum esse oculariæ medicinæ gnaris posse existimabam, me non heri demum cœpisse animunt ad oculorum morbos dignoscendos curandosque applicare, quoque diutius jam animo volueram ea, quæ nunc quidem, data occasione, publico hoc scripto, expono. Quod vero temerarios Taylori ausus attinet, quo minus eos publica quadam scriptione reprimere, retinere me facile potuit hoc, quod sapientibus viris, & oculariæ medicinæ gnaris videbam ipsos parum probari apud plebem vero rationes parum valere. Sunt tamen, fateor, aliqua de oculariis hujus medici medendi ratione his animadversionibus interspersa. Aliquantum plus valere apud me poterat tot præstantium virorum recordatio, qui de hoc argumento videbantur ante me ita egisse, ut nihil fortasse sit, quod non occupaverint. Ut enim de præcipuis tantum dicam, quid est adeo, quod in hac de cataracta doctrina sit a Briseau [a], Antonio [b], Heistero [c], Woolhousio [d], St. Yves [e], Petito [f] Medico, Duddell [g],

Mor-

[a] Traité de la cataracte & du glaucoma. à Paris 1709. 8. c. f.

[b] Traité des maladies de l'œil. à Paris 1722. 8.

[c] De cataracta, glaucomate & Amaurosi tract. Altorf. 1713. c. f. Apologia & ube-
tior illustratio systematis sui de cataracta, glaucomate & Amaurosi. ibid. 1717. 8. &
vindicia sententia suæ de cataracta, glaucomate & Amaurosi. ibid. 1719. 8.[d] Dissertations ophthalmica de cataracta, & glaucomate contra sistema Dnn.
Briffai, Antonii, Heisteri. Frf. ad Moen. 1719. 8.

[e] Traité des maladies des yeux. à Paris 1722. 8.

[f] Vid. Mémoires de l'Acad. Roy. des Scienc. de Paris an. 1725. 1726. 1730. præ-
terea Lettre contenant des Reflexions sur ce que Mr. Hecquet a fait imprimer touchant
les maladies des yeux. à Paris 1729. 4. Lettre, dans laquelle il démontre, que le crys-
tallin est fort près de l'Uvée ibid. eod. & Lettre contenant des Reflexions sur les décou-
vertes faites sur les yeux. ibid. 1732. 4.[g] A treatise of the Diseases of the Horned-Coat of the Eye, and the various kinds of
cataracts. Lond. 1729. 8.

O 2

