

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLV.

VD18 90538889

LII. Dissertatio Medico-Chirurgica, De Cancro Mammarum, Eumque Nova
Extrandi Methodo.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16577

DISPUTATIONUM
CHIRURGICARUM
SELECTARUM.
—
PARS TERTIA
DE MORBIS PECTORIS.

LIL
DISSERTATIO
MEDICO-CHIRURGICA,
DE
CANCRO MAMMARUM,
EUMQUE
NOVA EXTIRPANDI METHODO.

Quam Praeside
D. J. SERRURIER P. P.

Tuebatur

GERARD. TABOR,

MOENO-FRANCOFURTENSIS

Trajecti ad Rhenum 19 Maii anno 1721.

Tom. II.

L 11



DISTATIQUN

CITRUS AGRUM

SEROTANUM

DE MURIBUS FEROTANIE

CONTRARIO

COVOCATIONE

MURIBUS FEROTANIE

CONTRARIO

COVOCATIONE

CONTRARIO



I.

DU in eligendo dissertationis inauguralis themate dubii hæsitavimus, nova enim in medium proferre ingenii tenuitas prohibebat, theoretorum vero tricis se immiscere valde abhorrebat animus; omnia, nullam cum & in praxi clinica connexionem ac utilitatem habentia, secundum celeberrimos nostri ævi medicos, curiosa & extra forum medici practici posita æstimantes: interim, nobis hæcce penitentibus, frequens mammae sexus sequioris cancro obfessas & ferro extirpatas videndi occurrebat occasio; & cum inter varias extirpandi methodos operationem hanc instrumento quodam, nullibi adhuc, ni fallimur, descripto aut delineato peragi videremus, in animum nobis induxit usus occasione hujus instrumenti cancrum mammarum pro materia dissertationis eligere & nonnulla de hoc morbo, ea, qua possumus, brevitate & perspicuitate proferre: bene quidem memores, nos in cancri descriptione, affectus, quoad symptomata, dirissimi, quoad causas, hactenus fere obscurissimi, & quoad curam, valde periculosi, laborem suscipere, quem humeri nostri perferre vix valeant. Cum vero excellentissimum *Stahlum* aliosque celeberrimos medicos in hoc jam præentes habeamus, eo facilius nos ad exceptatum finem trita eorum vestigia sequentes, pervenire, est, quod speramus. Ad ipsam itaque tractationem cancri mammarum gressum facientes a *Supremo Archiatro* humillima petimus mente, ut huncce laborem in sanctissimi sui nominis gloriam & afflictarum salutem cedere jubent: te autem, B. L., ea, qua decet, observantia rogamus, ut omnia benevolis oculis & æquo suscipere animo, melioraque, donec tempora dabunt pennas, expectare velis.

I I.

Per Latinorum cancrum, Græcorum Καρκίνον seu Καρκίνωμα (*ἀπὸ τύ καρκίνης, καὶ νέμεται*) Gallorum, chancer seu cancer; Germanorum, Krebs & quæ sunt aliæ ejus denominationes intelligimus vel tumorem mammarum scirrhosum, durum, inæqualem, coloris lividi aut subnigri, magna & eminentia circumquaque habentem vasa, dolore caloreque gravem: vel corruptionem earumdem sphacelofo-ulcerosam.

I I I.

Dividere solent cancrum in simplicem & nondum exulceratum, qui occultus ab Hippocrate & Aph. 38, & ab aliis apostemosus nuncupatur, ac cui sœpe, sed male, carcinomatis nomen tribuitur; & qui scirrhosam

L 11 2 tan-



tantum formam cum concurrente tamen dolore , calore &c. præ se fert : vel in exulceratum , erosum , apertum ac manifestum , qui , exesa cute , in ulcus , cuius labia fœda sunt & inversa , abit , fætidamque saniem cum fanguine corrupto stillat ; is proprie carcinoma audit.

I V.

Differt a scirrho essentialiter : in scirrho enim haud raro resolutio partium obstruciarum obtineri potest ; in cancro vero non item propter plenariam partium affectarum destructionem.

V.

Distinguendus est porro cancer a tumoribus & nodis mammarum , qui lactantibus contingere & brevi iterum tempore evanescere solent ; quando autem hi nodi diu subsistunt , nec tempestive dissipantur aut resolvuntur , in scirrhosam tandem abeunt collectionem , cancro proximam.

V I.

Distinguendæ etiam sunt ulcerationes mammarum , oris labiorum duris præditæ & male spirantes ; ab ulcerationibus , lividas vasorum ambientium inflationes conjunctas habentibus , propriumque demum constituentibus cancrum.

V I I.

Signa quod attinet , cancer occultus in sua origine cognitu admodum difficilis est ; in principio enim simplex tantum scirrus est , qui , cum in progressu in cancrum degeneraverit , luculentiora & indubitate postea praefentis cancri exhibit signa . Nam tumor tunc magis magisque augetur , & in majorēm molem attollitur , cum summa tactuique renitente duritie . Accedunt dolores ardentes , laciniantes & gravissime pungentes , patientem quasi per paroxysmos excruciantes . Color ad nigrum vel fuscum inclinat . Vasa circumiacentia inflantur , & varicosam lividamque faciem , cancerorum pedibus similem , exhibent .

V I I I.

Quando cancer hactenus clausus aperitur & exulceratur , vocatur cancer exulceratus & apertus ; subsequitur tunc in ambitu ulceris duries . Labia ejus turgida , inflata , erosa , inversa cum colore modo livido & quidem hoc communissime , modo roseo & rutilante , adspectuque horrido ac abominabili evadunt . Effluit ex ulcere materia tetri coloris atque odoris ,



si scilicet crassioris existentiae apparet; quando vero tenuior ac liquidior eructatur, flavescentia aut subcruenta est, valdeque corrosiva. Adeo deformatio partium vicinarum tam ambientium, quam subjacentium cum insigni ulceris factore, ita, ut ad costas & in ipsum thoracis specum per intercostales musculos erosio saepe perget. Torquentur patientes dolore vehementi punctorio, qui noctu exasperatur semper, saltet per intervalla. Vasa circumposita, turgida, varicosa & nigricantia apparent. Magnam sanguinis copiam mamma cancro obfessa saepe stillat. Accedunt animi delicia, gravissimus animi angor & nonnunquam ipsa mentis vacillatio. Vigilæ & insomnia anxia, metus & terroris plena, patientes afflidunt. Invalecente dolore febris succedit manifestior. Appetitus utplurimum valde prostratus, rarius inordinate auctus, occurrit; & a paulo copiosiore ciborum assumtione graviter afficiuntur patientes. Perit odor. Respiratio est difficultis; & tandem, nisi illis occurritur, mors sequitur.

I X.

Sedem habet dirus hic affectus plerumque in mammis feminarum, etsi Bidloo mammæ virilis cancro obfessæ in exercitat. Anatomico chirurg. mentionem fecit: in primis vero illæ, quæ animi pathematibus valde obnoxiae & deditæ sunt; porro, quæ ataxiis, obtrunctionibus, aut cessationibus mensium laborant, frequentius alias succumbentes deprehenduntur. Sunt autem mammæ partes præter epidermidem, cutem facile dilatabilem & pinguedinem multam ex albante glandulosa fabrica medium potissimum mammæ occupante, cui tubuli seu ductus lactiferi per anastomoses juncti & cum arteriis & venis communicantes interpositi sunt, constructæ; quæ secundum recentiores mere vasculosa est, ita scribente, Cl. Ruyssch, Thes. Anat. III. p. 31, se scilicet in medio portionis mammæ muliebris morbose, tumefactæ & spongiosis observasse mollitiem quamdam, qua post extirpationem liquori immerse, tam numerosa vascula a vinculo dissoluta sese videnda exhibuisse, ut tota fere illa portio videatur vasculosa. Arterias internas a subclaviis, externas autem ab axillaribus recipiunt mammæ, quæ deorsum in thoracem dimissæ, per intercostalia & sterni loca egressæ, mammis commissæ, epigastricis communicantes in miras contortionum spiras secundum Cl. Boerhaave abeunt; & tandem lactiferos tubos recta emittunt exiguo, qui uniti majores, denique vasa lactifera majora, latiora in angustum desinentia atque arctissima fistula in papilla exirent, ita tamen, ut ex arteriis per lactifera in papillam, ab hac per galactophora in arterias, sit itus & redditus; ac tali modo glandulosam istam mammarum fabricam constituunt. Venæ, quæ ad mamma pertinente itidem duplices sunt, scilicet internæ & externæ, quarum priores a subclaviis, posteriores ab axillaribus ortum ducent. Nervos accipiunt mammæ a dorsalibus spinalis medullæ.

X.



X

Hisce explicatis jam ad causas & genesin obscurissimi hujus hactenus affectus explicandas transgredimur: ubi quidem multas ac peculiares huic tumoris explicando causas ab auctoribus assignatas invenimus, quas vero omnes brevitati studentes silentio preterimus, certo certius persuasi, neminem meliorem ac diluciorem cancri pathologiam huc usque tradidisse, quam excellentissimus *Stahlius*; cuius itaque nunquam satis laudandi viri sententiam, uti in aliis medicinæ partibus, ita & hic amplectimur. Multum interim etiam ad saniores de cancri genesi conceptum formandum contribuit neotericorum anatomicorum indefesso & strenuo labore detecta glandularum structura: statuentium scilicet glandulam congregatam ex arteriis, venis, nervis, duplice vasorum lymphaticorum genere, (altero, quod depluit liquidum in cavum quoddam commune, folliculus, dictum; altero, quod hoc iterum resorbeat) in reticularem plexum formatis, in glomerem convolutis ac membrana vasculosa tectis, constare; si vero tales innumerabiles jungantur, per vasa communia adunentur, ut unusquisque folliculus communicet cum plurimis, omnes tamen terminentur in unum ductum communem, ut pendeant instar uvarum a racemi stipite, omnesque postea nectantur tegmine communi, evadere tunc glandulam conglomeratam.

X I.

Quod si jam in tali glandula vel a cauffâ externa, uti vehementibus mammarum contusionibus & compressionibus; vel a cauffâ interna, quo referuntur decubitus sanguinis fortiores ad has partes, lactis coagulationes, hereditaria dispositio &c. stasis & coagulatio contenti liquidi exoriatur, materia ita in glandula impacta & per canaliculos minimos sensim sensimque expulsis liquidioribus & remanentibus crassioribus transgredi non potens, accumulatur, illam opplet, membranam coercentem tendit & expandit: quod si in unaquaque glandula fieri concipias, una glandula versus alteram premetur, vascula intermedia comprimentur, capacitas eorum coarctabitur, parietes accident in mutuos contactus, & ita tandem formatur *scirrhosus*, durus, inæqualis ac renitens; cum autem collectio hæc scirrhosa sua spissitudine ad corruptionis velociorem successum minus disposita est, neque affluxus humorum copiosior, ut largiore stasi formata inflammationi locus esset, continuat: fit inde, ut dicta hæc stasis diu absque ulteriore prævalida irritatione sibi relicta ita incorrupta duret.

X II.

Quando vero scirrhosa hæcce stasis & coacervatio ætate, augmento &



& motu vicinorum ita movetur, ut vasa vicina ad margines Scirri inflammari incipient, tunc evadit maligna, induitque indolem ac naturam *Cancri Occulti*; indurantur scilicet magis magisque glandulæ, cum vasis circumiacentibus sanguiferis intumescunt & inflammantur.

X I I I.

Si nunc in tali statu vel sua sponte, tempore, vel in congruis medicamentis; in primis ubi in subiecto concurrit humorum pravitas, caco-chimia, vitia in animo, diæta & regimine, major affluxus humorum ad hasce partes ita affectas excitetur, materia in corruptionem ruere & glandulosas tunicas inficere incipit, omniaque in deteriora ac tandem in *Cancrum Exulceratum* seu ulcus putridum abeunt. Quia vero in mammis & sanguis & lac vehi solet, duplex hinc oritur corruptio; altera videlicet acido salina fermentativa nititur corruptione lactis in mammis præfente, siquidem chylus & lac alias in acidam corruptionem essentialiter ac facile inclinant, cuius cohaerens caseosa portio salinam, acrem, subtilem assumit corruptelam: altera sanguinis corruptione & dissolutione, unde nascitur putrilago fætida, corruptiva & sphacelosa, quæ glandulosam & tunicaceam partium texturam depascit & solvit; quæ tamen a priori, utpote prævalescente corruptela, in velociori sui putrefacente progressu ac diffusione coëcetur ac temperatur: concurrentibus ad hoc in primis etiam motibus circa & intra partem affectam tonicis, constrictoriis & condensatoriis, quorum beneficio copiosi affluxus tam sanguinis quam lacteoferosæ materiæ mirifice cohiberi, vel ad minimum impediri seu iniminui possunt; unde etiam tales personæ in collo, facie, brachiis, scapulisque ad-spectum talem plane strictum & contractum præ se ferunt: immo, in ipsis mammis similem exhibit, ita, ut reliqua quidem mammæ portio densa ac tensa tactui occurrat, plexus vero glandulosi eidem sese offerant instar plurium nodorum, stricturis modo dictis, veluti distinctorum.

X I V.

Quando vero malum exacerbatum sensum gravissime afficit, & hoc casu major affluxus sanguinis oboritur, turgescunt mammæ & tunc maxime temporis erumpit copiosior, purulenta, faniosa, ichorosa, varii, sed fere tetri coloris atque odoris, materia: ipsa autem hac intumescientia ramifications vasorum comprimuntur, ut liber ille affluxus sanguinis per illas progredi non valeat; immo motorius actus circa partes affectas, naturæ, quæ valde abhorret a corruptione illa putredinosa & eidem quantum potest, reluctatur, unde non modo dolores & sensus acerbiores, sed etiam anxietates & ipsius mentis angustia conjunguntur, est, inquam, insigne illud instrumentum, mediante quo penetratio materiæ intimior inter-



tercipitur & quasi circa solam superficiem ita tenetur, ut neque copiosus affluxus, materiam ulteriori corruptioni subministrans, fieri, neque uberior refluxus corruptelæ ad interiora, quæ alias præmature latiore diffusionem corruptionis post se traheret, sequi possit.

X V.

Cum vero interim putrilaginosa, sulphurea e sanguine consistentia saledinem illam alterius materiæ exacerbat & acriorem reddat, ut tanto magis corrosiva atque sensus irritativa evadat; sit inde, ut eroa non solum glandularum textura per innumera illa foraminula copiofa humiditas, sed etiam corrosis majoribus vel minoribus valis sanguiferis major vel minor hæmorrhagia erumpat: fieretque hoc adhuc überius, nisi partim strictræ ante dicta interna & in ambitu musculosarum partium vicina, partim ipsa intumescentia glandularum, partim spissescientia & coagulatio humoris, corruptionem ejus veluti antecedens, modum hic faceret. Hæc interim materiæ exfudatio inquinat superficiem ulceris adeo, ut nulla ibi nova concretio, aut structura debita in solidum, locum inveniat.

X V I.

Sensus vero ipse, prout materiæ corruptio, modo acrior & copiosior, modo minor fit, gravius aut mitius afficitur. Ipsa quoque spasticorum motuum exacerbatio circa & intra hanc partem inducit sepe numero maiorem sensus affectum, ut adeo tunc temporis dolor lancinans, vibrans, tendens, premens, urens atque rodens tanto magis saeviat. Affluxus etiam austior, & inde prognatus tumor & inflatio partis solito major ex eodem fundamento, nempe propter tensionem majorem inducit quoque sensus intensionem, ut tali tempore longe major ardor, immo & lancinatio atque compunctio sentiatur.

X V I I.

Quando vero jam jam diu inhærens malum eo perventum est, ut in sinus atque foveas dehiscat, aut aliquatis paulo mollioribus tunicis, inæquales tales protuberantias in ulcere post se trahat, restaurationis atque coalitus omnem quasi spem præcidit, & nascuntur inde, lœsionibus ita constitutis, ob maximam resistendi difficultatem & incertitudinem actus & effectus apud patientes summae inquietudines, vigilæ, pavores, anxietates, vagæ debilitations, immo lipothymia, spasmi impetuosi, tremores, motus convulsivi, mentis alienationes, trifitiae, taciturnitas & cetera; verbo, omnia talia consectaria, quæ res, in statu summe ancipiti constitutas, decet.

XVIII.



XVIII.

Quoad prognosin in genere notandum est, quod omnes cancri sive sint
occulti, sive aperti admodum periculosi & curatu valde difficiles existant:
in primis autem per medicamenta eos radicitus curare velle irritum &
infelix plerumque deprehenditur conamen. Cancri occulti virulentia ad
multos annos in corpore latere potest, donec agentis & patientis propor-
tio conveniens eam in actum traducat. Quo major tumor, eo graviora
symptomata praesto sunt. Cancrum occultum secundum divum senem sect.
VI. Aph. 38 incuratum relinquere melius est, quam (medicamentis) cu-
racionem fuscipere. Facilius curatur; qui ab externa, quam interna cau-
ffa oritur. Cancer, qui sectione exstirpatur, radicitus auferendus, alias
adhuc ulterius serpit; indeque eos tantum secundum Galenum com. in
Aph. 38. esse chirurgia exstirpandos, qui in summa cute consistunt,
quosque possumus una cum radicibus ipsis eximere. Accidit quandoque,
ut post exsectionem mammae alterutrius & altera cancro afficiatur, in
primis, si malum a cauffa interna ortum duxit. Mensium & Hæmorrhoi-
dum cessatio ac suppressio omnia pejora reddunt.

XIX.

Curam cancri & occulti & aperti varii cujuscumque ævi medici remediis
aggressi sunt, quæ si omnia hic describere fusciperemus, limites dissertati-
onis multum transgredieremur: sufficit hinc quorundam saltem recentiorum
methodos cancrum medicamentis tractandi paucis recensuisse.

XX.

Commendat Cl. *Bohnius* in cancro non exulcerato, si sub cute adhuc
lateat, & in principio existat, ac a cauffa externa dependeat, primum,
repellentium moderatorum usum & quidem talium, quæ absque vi ad-
strictoria manifesta agunt, v. g. Herb. plant., pyrol., portulac., um-
bilic. vener., Geran. Robert., rad. Consolid. mai., Lentes aceto incoc-
tae, argilla aceto temperata, lamina plumbea, quæ sola aut progressu
temporis mercurio incrustata tumori canceroso strictius alligatur; ung. alb.,
empl. de spermat., ranar., diapomphol., de minio & facch. Saturn: qui-
bus, si dolor acrior, opium & opiate admiscere convenit. E quibus di-
versas concinnare licet formulas, e. g.

R. Succ. solan.

Plantag.

Geran. aa. 3j.

Ol. Nymph. cum omphac. ppt. 3ß..

Tom. II.

M m m

Sacch.



Sacch. Satur. 3*β.*

M. F. Fotus.

Vel

R. Pulv. Ranar. Virid.

Cancror. aa. 3ij.

Ung. de tribus.

Popul. aa. 3j.

Ol. ranar. 3iij.

M. F. Unguentum.

Vel

R. Empl. Diapomphol.

De ranis cum ♀. aa. 3j.

Ol. Hyosiam. express. q. f.

M. F. Emplaſtrum.

Quibus frustra adhibitis resolventia jungenda sunt, non tamen fortia, sed mitiora & repellentibus semper temperanda, v. g. herb. ceterach. agrimon., lens palustris, scabios., persicar. succus, coriandr. succ. pulv. ranar. limac., & cancror. fluviatil. lithargyr. tut. pomphol. plumb. ult., ♀ vivus, hujusque cum plumbo amalgama, it. camphor in exilissima tamen quantitate, ung. & empl. diapomphol., de ranis cum ♀io v. g.

R. Empl. de spermat. ranar. 3ijβ.

Ayalgam. Saturn. 3ijβ.

Pulv. ranar. 3j.

Cum f. q. Ung. Diapomphol.

F. Unguentum.

Vel

R. Succ. solan.

○ Virg.

Coriand. aa. 3j.

Ol. roſ. 3vj.

Terebinth. venet. 3ij.

Acet. roſat. 3j.

Agitentur in mortario plumbeo, addendo

Cancror. combust. 3ij.

Ceruſ. 3j.

M. F. Linimentum.

Quamvis tamen nec his remedii cancer cedat, sed magis magisque in crescat, neutiquam, prout in aliis tumorum generibus fieri solet, matu-

ratio



ratio suscipienda, cum caussa hujus tumoris continens in pus converti nequeat, sed potius per putrefactionem magis corrumpatur, ejusque vis corrosiva intendatur. Quod si vero cancer aut per se aut per abusum medicamentorum in ulcus corrosivum ac putrefactivum degeneravit, tunc exscindendus est: aut si exscindi amplius non potest, tum saltem dolor ejus & nimia ingravescientia moderanda, quod perficitur topicis, quibus addenda abstergentia moderatione v. g. empl. *H.*, de carne bubul., ung. medicamentosum, ▽ de pomis putridis destillata.

XXI.

Cl. Boerhaave cancrum occultum, qui extirpari nequit, quietum relinquare, & symptomata ejus saltem mitigare jubet; prius perficitur locum (1) defendendo ab omni externo per plumbata & narcotica.

R. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagap.

Opopanax. aa. 3ij.

Leni igne in test. solut. depura, tum admisce

Vitell. ovor. hene concus. no. IV.

Cere citrin. 3ij.

Farin. rad. Bryon. alb. 3iij.

Ol. infus. Rutae q. s.

F. S. a. Emplastrum.

(2) Caussam cognitam minuendo, corrigendo, avertendo, quo lenia purgantia ex blandis vegetabilibus, mercurialibusque faciunt, parva & siepe geminata dosi data.

R. ♀ Dulc. gr. XV.

Diagryd. gr. xiiij.

M. F. pulv., capiat semel in septimana.

(3) Diluentibus, aperientibus, blandis subalcalicis; decoct. ex Bardan, chin. foenicul. petrofél. farsap. scorzon. &c.

R. ♀ Diaphor. non ablut. gr. viij.

Spermat. Cet. 3j.

M. F. pulv., Div. in ij. dos. sumat unam mane & vesperi.

(4) Vitando, quæ sumta vel applicata vicem caussæ gerunt. Symptomata

M m m 2 secund.



secundum eumdem iisdem, dolor autem opiatis mitigantur. In cancro exulcerato, si tolli nequeat, commendat, illum saepè mundando, plumbata lenissima adhibendo & dicta usurpando lenire.

R. ∇ *stillat. papav. Rhoead.*

Rofar.

Sambuc. aa. 3ij.

Sacch. Sativ. 3j.

T R. *Opii 3j.*

V *Theriacal. 3ij.*

M.

Vel

Bx. *Aceti Lithargyrifat. 3vj.*

Ol. rof. 3iv.

M. *F. Nutritum.*

Quibus ulcus saepissime abluendum.

X X I I.

In cancro occulto excellentissimus *Stahlii* universalium tempestivum commendat usum; laxationes nempe frequentiores e rhabarb. helleb. nigr. epithym. fumar. polypod. : V. S. porro, præcipue alias quoque confuetam, bis forte in anno circa æquinoctia. Juxta hæc convenire interne absorbentia cum leni diaphoresi interdum interposita; effentiam succini quoque non poenitendi effectus esse putat. Externe paucissima admittit, præfert omnibus frequentem usum spiritus vini camphorati, non tam loco immediate dolenti, quam late circa, immo primo velut eminus mammæ imponend. In cancro ulcerato seu aperto tres format indicationes; prima est *mundificatio*, ubi vero caustica, acria & septica diffuadet, & balsamicis quantocytus insistendum esse putat: in levioris corruptione ambitus oleum laterinum aut similia empyreumatica cum oleo ovorum temperata non nullius esse efficacie. Altera indicatio est *corruptionis inhibitio*, quæ fit secundum celeberrimi viri mentem vel per balsamica generaliora, vel per specialiora; e generalioribus a valde acribus cavendum, unde olea destillata & ex his parata balsama sulphurea &c. rejicienda sunt, incitant enim & sensum & intestinum sanguinis motum, ut inflammations præsentius excandescant: si tamen inflammationis & putridæ corruptionis vis prius fuerit enervata, habent usum moderate usurpata. Optimum esse remedium myrrham, cui nullum aequandum aut anteponendum in cohibenda corruptione sanguinea; sicut in cohibenda salina corruptione, tanto magis vero in corruptione partium fibrosarum & quasi exsangium laudem suam mereri succinum. Ex his duobus remediis effentiam concinnat com-

posi-



positam, addendo pro circumspecto judicio circumstantiarum aliquid olei traumatici, subtilis nervini, terebinth. cypr., aut modicum balsami quid cuius peregrini, peruviani aut copaju., interponendo nunc & tunc ali aliesentiae hyperici saturatissimæ, modicum eff. Elemi, ita tamen, ut omnem fiduciam totius efficacie ponat in succinum ad partes exsangues, in myrrham vero ad partes sanguiferas. Tertia indicatio therapeutica est *afluxus cohibitio*, quæ per adstringentia non commode præstatur; per difcutientia intenditur quidem, sed non perficitur; solis internis purgantibus, diaphoreticis, diureticis frustra tentatur. Hinc secundum eumdem excellentissimum *Stahlium* dispiciendum est de tali remedio, quod cohibeat quidem effluxum & eo ipso affluxum copiosum successive retineat, & quod neque strictura nimia retropulsionem materiæ ad interiora promoveat, neque positiva aliqua qualitate fomitem corrosioni suppeditet, sed potius acrimoniam corrosivam mitiget & obtundat: unde autem tale remedium desumi debeat, hoc quidem valde difficile non vero penitus impossibile esse judicat; notum enim esse ex chymicis experimentis, quod acrimoniam acidam & corruptionem atque colligationem putridam nihil efficacius, certius, præsentius corrigat & hoc præstet sine novæ accretionis accessione, quam bene depuratus & ab empyreumatica nimia oleosa acrimonia liberatus spiritus vini, qui acidissimos liquores insipidos reddit, immo invertire potest, ut aciditatem hic rursus demonstrare artis sit: corruptiones putridas in totum cohibere, factas reprimere quotidiani ejus effectus est; usum ejus in corpus & transitum in & per sanguinem sine noxa, nisi maximæ mensuræ enormitate excedat, quotidie videmus: simplicissimum ejus effectum utiles humores leviter ac leniter condenfandi, acres auferendi, tota dies testatur. Tenuissimam resolutionem & sub forma tali tenerime resoluta per insensibiles atomos distributionem corpusculorum resolutorum balsamicorum omnes monstrant sensus, adeo, ut resinosa corpuscula ita extenuata in ipsos poros facile mixtionem cum humoribus & congressum cum fibris partium exserere possint: ac ita in nullo negotio taxandus veniat ejus usus, excepto solo sensu, quem, simulac partem attigit, facit, de quo tamen nullum timendum periculum. Si jam mediante spiritu tali medicamentum pro conditione ac præsente affectus statu concinnaretur, evadet tale, quale in aliis frustra queritur: unde testante Stahlio essentia myrræ & succini prudenter proportionata, præmissis & conjunctis quæ decent, & cum debita usurpatæ continuatione plus semel præstiterunt, quod vix quisquam sperare ausus esset; sed cavendum, ne quid improvide & imperite committatur, ab intempestivo enim aut improprio usu modo myrrhatæ modo succinatæ essentiæ inflammatio, tumor & suppuratio quasi effrænatur. Sp. camphoratum leniter crocatum affectum tales fedando & gravissimam inflammationem imminuendo admodum utilem deprehendit; ulceræ scilicet talia siccis linteis tegere & his alia Sp. camph. imbuta, spirituque prius iterum exhalita, impotere

M m m 3 solet,



solet, cavendo ante omnia; ne camphora intra ulcus temere immitatur. Quod *consolidationem* tandem concernit, non sine fundamento judicat, quod, ut in aliis ulceribus mundificatis & ad consolidationem recte dispositis insistendum sit conservationi balsamicæ, ut ita æqualiter restauratio fieri possit: ita & in hoc effectu nihil aliud, quam similiter balsamica locum habere ad similem affectum obtainendum. Hisce interna conjugit, ubi secundum eundem conducunt tum lenia laxantia, præsertim cum temperatis gummi-resinis remixta, tum etiam succinum cum pauca essentia myrræ largioribus dosibus sepe usurpatum; it. usum flororum ♀ vel ♂ in mortario triti, quod omnia destillata superat, nullo modo rejiciendum esse, & sæpiissime unciam unam ♀ plus effecisse, quam multa alia artificiosa medicamenta, sub usu autem ♀ is medicamenta diapnoen & fecesum promoventia adhibenda. Internum etiam nitri usum prudentem præsertim cum lenibus diureticis, arcano duplicato, tartar Ⓛ lato mixtum valde utilem deprædicat. Et hæc sunt, quæ excellentissimus *Stahlius*. quo sagaciorem, prudentiorem ac feliciorem in omnibus medicinæ partibus nulla unquam dabit ætas, in cancero commendat; profecto, si spes medicamentis aliquid efficiendi in hocce affectu adhuc quedam supereft, nulla meliori ac tUTORI methodo, quam hac jam descripta, id effici posse plenarie persuasi sumus.

X X I I .

Mentio quoque facienda illorum remediorum, quæ ab auctoribus tanquam specifica certissima contra cancrum efferuntur laudibus: ita *Alliot* arcanum suum alcalino ♀ eum, quod cancri domitorem appellat, fusius in actis Hafniens. vol. I p. 140. commendat.

X X I V .

Notum est etiam pulvis *Fuschii* Itali, Med. Norimberg., contra cancrum, cuius descriptionem Dan. Sennert. Prax. Lib. IV. Part. III. Sect. I. cap. 7. tradit: quo auctor talem sibi comparavit famam, ut ab omnibus tunc temporis medicus cancri vocaretur; cuius tamen usum *Hilidanus* Cent. VI. obf. 22. 80. 81. valde dissuadet.

X X V .

Nec reticendum iilud a *Borello*. Hist. & observ. rar. Cent. II. obf. 51, communicatum secretum, ulteriorque experientiae commendandum, sicuti & ea, quæ ratione & experientia ab aliis maximopere laudantur, nimirum Ⓛ diaphoret. Poterii, ♂lia diversimode præparata, millepedes cum lumbricis ⌂stribus, nec non vera *Basilii Valentini* Tr. ♀ii.

XXVI.



XXVI.

Nostris tandem hisce temporibus magna hinc inde de remedii, quæ Dn. Consiliarius *Kortholt*, Regiomontii in Prussia, contra cancrum poscidet, deprædantur encomia; de quorum felici & exoptato effectu tam in cancro nasi, quam labii inferioris &c. non solum fusi in actis Bresfaviens agitur; sed excell. D. D. *Salzmann*, anatomiae & chirurgiae Professor apud Argentoratenses celeberrimus, fautor ac præceptor pie venerandus & cui toti, quoad spiritus hos reget artus, devote obstricti sumus, in epistola humanissime ad nos missa mentionem etiam facit duorum cancerorum exulceratorum & jam latius serpentorum feliciter hisce remedii, omnibus admirantibus, Argentorati curatorum: quod itidem D. D. *Sachs*, Professor ejusdem universitatis celeberrimus, fautor honoratissimus, in litteris ad nos datis affirmat, scribens, se cum D. Nentero & D. Kolbio, primo cancrum labii inferioris, deinde cancrum mammæ primo occultum, postea apertum satis insignis magnitudinis, & tandem cancrum mammæ eximiæ capacitatibus cum remedii Consil. Kortholti tractasse & feliciter curasse; seque in tractandis his affectibus observasse, quod omnia acida fortiora interne & externe nihil profint, e contra vero alkalia fixa penetrantiora optime sese gerant, sub horum usu alvum successivis vicibus per laxantia selectiora, inter quæ præprimis extract. Hel-leb. nigr. hic eminere, & per anticotarrhalia lignosa purgandam esse; exoptatum autem consolidationis fundamentum in ante dictis casibus jecisse liquorem quemdam acidum correctum, it. vng. acido quadam alteratum: consolidationem ipsam promovisse Bals. Arcae; duritiem vero glandularum pro viribus per empl. Diabotanon emollitam fuisse. Dolemus, quod nobis Amstelodami decentibus ob temporum angustias non licuerit a Dn. Consiliario Kortholt hæcce remedia petere, & illorum efficaciam periculum in foeminarum cancro obsessis mammis facere.

XXVII.

In his & aliis adhibendis, & applicandis probe denique examinari debent tempus, ætas, temperamentum &c., non sufficit enim cognita caufa interna cancri convenientia adhibere remedia, oportet etiam medicum respectum habere ad cuiuslibet ægni naturalem eamque individualem constitutionem, qua ab alio specialiter differt. Experientia enim quotidie edocemur, id quod uni maximo cum commodo & solatio adhibetur, alteri non modo nihil profit, vertum etiam nocturno sit.

XXVIII.



X X V I I I .

In genere adhuc de usu & applicatione remediorum monendum venit, quod sub horum applicatione exulare debeant, primo omnia remedia valde relaxantia, emollientia & maturantia, a quorum non satis detestando usu practici valde dehortantur & tristia proferunt exempla, uti videri potest apud Paræum lib. VI. cap. 30. Fernel. meth. med. lib. XVI. cap. 18, Hildan. Cent. III. obs. 87. & alios. Excell. D. D. Elias Camerarius, Med. Prof. Tubing. Celeberrimus, fautor nunquam satis colendus, quoque tristissimum talesem emollientium observavit effectum in virgine, 40 annor., cancro mammæ occulto laborante, cui chirurgus ob dolorem pungentem emplastrum parvum leniens imposuerat, quo cum cuticula vix ablata esset, nulla postea arte iterum consolidari potuerat, sed ita sensim atque sensim serpsit, ut patiens intra spatum quinque mensium diem obiret supremum; eumdem quoque eventum in aliis adhuc observavit. Omnia deinde remedia oleosa, pinguia & gummatovalde noxia in hoc deprehenduntur affectu. Quæcumque porro remedia refrigerantia, acida, valde repellentia, adstringentia & septica admodum deliterii effectus sunt. Ab omnibus etiam remediis violentibus, uti arsenico, Auripigment., Solano furioso &c. nihil commodi sperandum, immo noxae graviores verendæ sunt. De dolorum mitigatione adhuc observandum, quod in ejusmodi doloribus & corruptionibus, ubi motus intenti, vigiles, anxii, trepidi concurrunt, a narcoticorum & opiatorum frequenti, nimio ac copioso usu admodum cavendum sit.

X X I X .

Et hæc sunt, quæ de variis recentiorum celeberrimorum medicorum cancrum tam occultum quam apertum per medicamenta & communia & sic dicta specifica tractandi methodis in medium brevissimis proferre voluimus: inconclusæ interim veritatis & sanæ rationi ac diligenti tot tantorumque cujuscumque ævi medicorum experientiæ subnixum axioma esse certo certius credimus: quod cancer scilicet *Mammarum* sive sit exulceratus, sive non ulceratus, per medicamenta Nunquam aut Valde Rarissime curetur; Quicquid enim auctores de curatis cancris occultis per hoc vel illud remedium hinc inde produnt, illud tantum de tumoribus scirrhosis curatis intelligendum esse credimus; dum forte vera ac genuina differentia inter scirrhum & cancerum plerumque neglecta, & hinc qualiscumque tumor & scirrhus mammarum statim pro vero cancro ebuccinatus fuit; de scirrhis enim simplicibus ac indolentibus satis superque notum est, quod medicamentis interdum, quamvis non sine difficultate, tolli possint: simulac autem eo ventum est, ut scirrhus fiat dolens & inflammatuſ, ac ita naturalem cancri adsumat,

omni



omni tunc spe illum medicamentis curandi penitus destituimus: & si ex supra dictis miram mammarum strueturam & veram scirri perfectum jam statum consecuti, ac ex hoc tandem enatam cancri genesin attento & absque omni praejudicio libero consideramus animo, nulla ratione mente concipi potest; quo modo glandule & vascula minima obstructa & jam in mutuum contactum ac coalitum concreta referari, illorum contentum inspissatum & crassius redditum iterum resolyi ac fluidius reddi, vasculorum latera coalita iterum sejungi, ac ita omnia in pristinam integritatem medicamentis restitui possint; nisi totali ac plenaria ablatione & extirpatione partis continentis cum contento per operationem chirurgicam.

XXX.

Ita quoque se res habet cum cancero exulcerato, quo modo enim quæ fo! Corruptio ista, quæ jam invaluit & vicina loca in longum, latum ac profundum perrepsit, immo structuram glandularum vasculorumque minimorum jam arrodit & depavit, & ita ad extremum corruptionis gradum pervenit, medicamentis inverti, partes vero læsæ consolidari aut auferri possunt, nisi partium affectarum extirpatione, quæ autem fieri non potest, quam operatione chirurgica? Medicamentis enim corrosivis & septicis id efficere velle candidi ac pii viri non est; & sicuti impossibile est, partem sphacelo penitus obseßam pristinæ integritati restituere medicamentis, ita multo difficilius ac impossibilis est, & pia tantum desideria conatusque sunt solis medicamentis cancrum curare. Negari quidem non potest, dari remedia, quibus cancerosa malignitas, si nondum invaluit, aliquo modo corrigi, & ulterior ejus progressus ad tempus sèpe fat longum refrænari & inhiberi possit, solis vero medicamentis cancrum radicitus curare velle, est re vera Æthiopem album lavare, & medicis & chirurgis Hydram hanc hac ratione aggressuris mille molestias, tedia & labores plus, quam Herculeos, plerumque irritos spondet: miseris vero laborantibus spem curationis fere omnem, nisi per ferrum & ignem adimit.

XXXI.

Ast non sine causa objectionem multorum eminus audimus, cum ipse diffidentiam in hactenus propositis, & sub tegmine commendationis tantorum Virorum repositis, habeas, cur misere ita afflictis afflictionem, nec quemque secundum Celsum lib. V. Cap. 26, forte sua mori finis? Non enim sine ratione Cl. Auctor l. c. dicit: In his autem ante omnia scire debet medicus, quæ insanabilia sunt, quæ difficultem curationem habeant, quæ promptiorem; est enim prudentis hominis primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus ut occisi, quem fors ipsius peremit. Huic respondemus, quod licet

Tom. II.

N n n legi-



legitima ac perfecta curatio in utroque cancro valde difficultis existat: crudelē tamen fuerit & inhumanum, ægro nihil solatii afferre, atque, ut tantis doloribus excarnisfetur, admittere, cum ex eodem Celso Lib. V. pateat, dubiam spem certa desperatione potiorem esse.

X X X I I.

Sola itaque chirurgia est; qua canorum occultum haud raro penitus excindere & curare, apertum vero, si glandulas subaxillares nondum infecit, & mobilis adhuc exilis, radicis extirpare, & miseræ patientes pristinæ sanitati restituere sœpe valens. Prostant quidem multa exempla, ubi miseræ tales feminæ post peractam cancri extirpationem tamen febre lenta & cachexia denique extinctæ sunt; haud pauca interim etiam exempla felicissime extirpatione curatorum cancerorum apud Scultetum & alios allegata reperimus. Laudem hinc medici & chirurgi merentur summam, qui in excoxitandis adæquatis methodis & instrumentis ad hanc operationem cito, tuto ac citra omnem intolerandum dolorem exequendam ab omni zelo occupati fuerunt: ad quorum varias operandi methodos jam ea, qua fieri potest, brevitatem describendas gressum facimus.

X X X I I I.

Si tuberculum scilicet cancerosum adhuc parvum, mobile, nondum apertum, & in superficie mammæ existat, veteres illud sequenti modo, ita Franc. Arcæo lib. 11. de curand. vuln. cap. 3. tradente, excindere solebant: præparato, inquit, corpore affecto purgatione & omnibus, ad operationem necessariis scil. Vitellis duorum ovorum una cum albo probe agitatis, addito, si placuerit, rosaceo modico, magna lichenorum copia, pulvisculis cum vitta quinque digitos lata & gausap. bona parte & tandem acu vulneribus consuendis idonea cum fatis tenaci eodemque duplo filo, adoptatis, tertia a purgatione die secunda aut tertia hora a prandio patients aut in pulvinis aut in culcitram resupinus collocetur, utrinque duo alii homines sint, qui illius brachia firmiter contineant: chirurgus vero immineat, ejusque crura suis ipse cruribus contineat, genibus supra culcitram ipsam flexis & firmis, tum cancer ipse manu apprehendatur, qui si contra ipsius mammæ papillam erit, sapienter est divertendus, ne ipsa pereat excisa; quod si versus axillam fuerit, divertendus est etiam, ne quid ex iis musculis, qui ex axilla oriuntur, ledatur. Ubi ita recte constitutus fuerit, manuque sinistra firmiter comprehensus, tandem, cutis acutissima novacula aperiatur, quantus cancer ipse sit: aperto autem in longitudinem fiat; deinde ex altero cancri latere caro commota absindatur & separetur, ita tamen, ut cancer non feriatur: quod si sanguis erumpat, globulo ex bombyce facto, locus op-

pleni-



plendus est, quem, si id fieri conveniat, alter eorum, qui brachia continet, digito comprimat, atque ex altero etiam latere carnem a cancro separet. Ubi autem utrinque cancer detectus a carneque separatus sit, acu filoque medius transfigatur, filumque ipsum alteri filo innodatum, alicui eorum, qui adsunt, committatur, a quo continentे sublata manu tenendum est atque hinc & hinc contra eam partem, qua chirurgus fecat, divertendum. Ubi vero ex utroque latere probe fuerit a cetera carne cancer separatus, inferiori ex parte est abscondendus, idque, quam fieri poterit, expeditissime, dīgitis admotis, ut totus cancer abscindi fentiatur, nihilque ex eo penitus relinqui: adeo autem celerem operationem esse decet, ut plus in trajiciendo cancro filoque colligando, quam in eodem penitus eruendo more sit. Cum abscissum & extraētum penitus fuerit, ne quid ex eo intus reliqui sit, diligenter est pevridendum. Hæc ubi expedita fuerint, sanguis omnis, qui ex vulnere fluit, diligenter abstergatur, ac mox Lichini ovo intincti indantur, ita tamen, ne nimium compressi dolorem augeant, neque enim totus locus opprendus densa nimis Lichinorum inculcatione est. Imponendæ autem stupæ eodem ovo intinctæ, pulvillique & vitta sunt adhibenda. Postero die eadem hora digestivo curabitur aut balsamo illo nostro, id pluma leviter ungendo fit, additis etiam filis siccis, non tamen nimium compressis, ut caro ipsa paulatim coalescat & sese committat. Circa ipsum vero vulnus superque ac circa mammam defensivum addi oportuerit ex rosaceo, cera & Bol. Armeni confectum, ejus autem quo dimicimus, balsami usu, quam citissime emundabitur vulnus caroque inducetur ac sanabitur: super balsamum autem empl. basilicon. lino extensem imponimus. Tandem ubi sati satis jam inductæ carnis sit, cicatrix filiis siccis impositoque basilico emplastro procurabitur. Hæc ille.

XXIV.

Nostris temporibus modo multo facilitiori tuberculū cancrosum exscindendi recentiores utuntur: inchoant nimirum primo curam internis corporis præparationibus, ob id sanguinem superfuum convenienter & sufficienter per V. S. in pede ventilant; primas vias a crassis impuritatibus biliosis ac acescentibus abstergunt per infusa resolventia & laxantia, aliquoties exhibenda; prospiciunt, quo in feminis, mensium vitiis laborantibus, hic fluxus in justum transferatur ordinem; porro, quo humores a confluentibus impuritatibus serosis per convenientia remedia, scilicet absorbentia & Δ ea cum acidis saturata, temperatiora alexipharmacæ, diuretica, abstergentia, digestiva, succinata, interposito placido regimine diaphoretico, repurgentur. Quibus legitime peractis tuberculum, ita, uti superius monuimus, adhuc constitutum sequentem in modum exscindunt: collocant patientem in sellam aut alium convenientem locum & brachium lateris affecti vel extendi vel retro sellam alligari aut con-

N n u 2 tineri



tineri a ministro jubent, ut tali modo musculus pectoralis retrahatur; cancerque magis in conspectum veniat ac ab illo eo facilius separari possit. Tum cutem tumori incumbentem in forma crucis sufficienter aperiunt, labia vulneris quantum ad cancrum eximendum necessarium dilatant ac separant. Postea tumorem cancrosum vel forcipe ab Helvetio in hunc finem excoxitata, & in Cl. Heijsteri, med. Prof. Helmstad. celeberr. chirurgia delineata, arripiunt, vel acum magnam cum filo transfigunt, extremitates fili invicem colligant, ad tumorem hoc modo attollendum & a subjectis partibus abducendum, aut solis etiam digitis unius manus cancrum tenent, & altera manu mediante cultro ita separant & excindunt, ut nil cancerosi relinquant. Si vero cutis, qua cancer tegitur, jam quoque infecta & cum illo unita deprehenditur, haec simul cum cancro excindenda venit. Post canceri excisionem sanguinis fluxus non statim sistendus, sed, si patientis vires perferre possunt, aliquot unciae emittendae sunt: ipsa vero ultra modum debilitata, vulnus statim post operationem deligandum: sanguine secundum patientis conditionem sufficienter emissio, non necesse erit ad Haemorrhagiam sistendam cauteris uti, sed satis erit, dum modo vulnus linteis carptis & pulvere aliquo styptico inspersis repleatur, vel solo alcohol: demum splenia & fasciae convenientes applicentur. In sequentibus delegationibus cura cum digestivis & bals. vulner., uti in aliis vulneribus, prosequitur ac tandem absolvitur.

X X X V.

Quod si cancer occultus jam totam occupavit mammam, & vel per se, vel per medicamentorum abusum in ulcus corrosivum ac putrefactivum seu cancrum apertum degeneravit, tota tunc amputanda est mamma, curaque multo difficilior redditur: diligenter hinc penitandum est, quid ante, & in post operationem observandum occurrat.

X X X V I.

Ante operationem primo inquirendum, num cancer cum glandulis subaxillaribus aut musculo pectorali tantum communicet: quod si prius apprehendatur, minime scindendus est, siquidem radicitus extirpari non potest; idem etiam observari volunt auctores si musculo pectorali adhaereat, affirmat autem Bidloo, se cancros tales etiam cum parte musculi pectoralis optimo cum eventu extirpasse. Deinde corpus patientis convenientibus & supra allegatis remedii præparandum: attendendo probe, num patiens adhuc fluxui menstruo subjecta sit, quibus fluentibus, operatio aliquantulum differenda erit. Tandem die, a qua operatio peragi debet, appropinquante, omnia instrumenta & alia ad eamdem necessaria in ordinem sunt ponenda.

X X X V I I.

In operatione ipsa varii ejus modi operandi veniunt observandi: ubi non nulli extirpationem ita administrare solent; elevato & abducto nimis rumpente

fecti



fecti lateris brachio per mammillæ basin cruciatim duas trajiciunt acus, dupli vel robustiori filo instructas, quo carcinoma melius contineri & a substratis partibus quasi avelli queat; quo facto cultrum falcatum satis latum & acutum mammae basi circulariter adigunt, ita, ut haec celerrimis & paucis incisuris a substratis partibus separetur, inchoando sectionem ab inferioribus potius, quam superioribus, partibus, ut vasa scilicet mammaria ultimo demum quasi iectu discindantur, & hemorrhagia differatur.

XXXVIII.

Alii, ut Solingen & Bidloo, bidentem seu furcam satis magnam & aliquantulum incurvatam basi mammæ cancrosæ a parte ejus inferiori infigunt, & ope hujus mammam elevatam sub furca cultro magno extirpant.

XXXIX.

Helvetius singularem excogitavit forcipem, qua mammam cancrosam arripere, elevare & cultro deinde abscondere jubet. Aliud etiam adhuc instrumentum in chirurg. Heister. delineatum in eundem invenit finem, quo scilicet tota mamma in basi arripitur & unica vice extirpatur.

XL.

In Galliis hodierna die solent mammam absque ullo instrumento, nuda faltem manu sinistra comprehendere, illam elevare & cultro deinde a partibus substratis separare.

XL I.

Nobis Amstelodami degentibus variis mammas cancerö obessas extirpandi methodis adesse contigit, inter quas unam in nosocomio, praesente D. D. van Buren, medico nosodochii hujus ordinario & physico illius civitatis famigeratissimo (cui ob singularem favorem, dum nobis illum in visitandis ægris, quibus nosocomium abundat, comitari licuerit, multum obstricti sumus) ab Hartmanno, nosodochii illius chirурgo dexterrimo, extirpari vidimus instrumento quodam, quod, cum descriptum aut delineatum adhuc nullibi invenerimus, non solum illud ipsum, sed modum etiam applicandi, ea, qua fieri potuit, diligentia accurate æri insculpi, & huic nostræ dissertationi adnecti curavimus. Perficiebatur autem haecce operatio tam citto, ut omnes admirarentur adstantes: collocabatur scilicet patiens in sellam, & brachio affecti lateris bene extenso fasciisque in locis consuetis applicatis, mamma cancerosa vinculo arcte subligabatur, quo discrimen inde mammae a musculo pectorali tanto luculentius manifestaretur; tum instrumentum hoc retro seu post ligaturam applicabatur, & ita mamma, vinculo soluto, ac forcipe, ab Helvetio excogitata, arrepta, una vice ab inferioribus incipiendo partibus quam felicissime & citissime abscondebatur.

N n n 3

XLII.



XLII.

Post peractam operationem hæmorrhagiam , si patientis vires perferant , non statim fistendam , sed uncias aliquot sanguinis emitendas esse : pa- tiente vero jam enervata , statim fluxum ejus fistendum ac vulnus deligan- dum suadent . Tum adhibenda dirigentia & moderata sarcotica , v. g. Eff. balsam. Stahl. super imposito empl. stict. croll. , & in peripheria Spir. cam- phor. ; ad inducendam farcosin vero ol. cereæ vel ovorum . Pars affecta tan- dem fascia convenienti deliganda est . Interne convenienti eadem illa medi- camenta , que superius commendata sunt , scilicet primo analeptica , emul- siva , deinde alexiphar. temperat. absorb. temperant. cinnabar. &c. Si , du- rante cura , febris vehemens , angustiæ circa præcordia , & respiratio diffi- cilis accedunt , signa plerumque deprehenduntur lethalia ; hinc per medica- menta convenientia interna tempestive eis obviam eundum est . Abstineant sibi patientes a cibis crassis , pinguibus , falsis , dyspeptis , aromatibus ni- miis , uti a potu fæculento & spirituoso . Exulent animi pathemata .

XLIII.

Vulnere consolidato , patientes in posterum bonum semper regimen in ci- bo , potu , animi pathematibus &c. sibi commendatum habeant ; venam- que bis in anno circa æquinoctia in pede secandam curent .

XLIV.

Quod si autem cancer exulceratus in eum gradum exulcerationis perva- nerit , ut partes glandulosas subaxillares jam arroserit , nullus tum peritus chirurgus illum extirpare conetur : sed ibi tantum cura sic dicta palliativa , dolorem & nimiam ejus ingravescientiam saltem moderans , locum habet , adhibendo scilicet topica ac resolventia & repellentia , superius dicta , qui- bus insuper addenda abstergentia moderationia v. g. ▽ destillata Hildan. , de pomis putridis &c. , & sic patiens fato relinquenda est suo .

XLV.

Hæc sunt , quæ occasione hujus instrumenti de cancro mammatum in medium proferre voluimus , solidius & fusius quidem omnia tractari debuisse fatemur ; sed cum & ingenii tenuitas & præfixi dissertationis limites id non permiserint , merito hic pedem figimus , & a Te , L. B. , obnixe petimus , ut hasce nostrorum studiorum primitias benevolo suscipere animo velis: DEO autem Ter optimo maximo pro hac tenus concessis viribus devotissimas & hu- millimas agimus gratias ; maneat Deus , Deus noster !

F I N I S.

EXPLI.



EXPLICATIO FIGURARUM.

Fig. I.

- S**icit instrumentum novum pro extirpatione mammæ cancerosæ.
- A. A. Duplex lamina, ex aurichalco vel ferro bene cuso ac polito facta, quæ constituit semicirculum ex opposito B. B.
 - a. a. Monstrat hujus partem inferiorem; in extremitatibus C. haec duplex lamina conjuncta est & unam efficit, ubi de cætero hiat, & ab invicem separata est pro spatio cultri ad operationem rite peragendam.
 - B. B. Semicirculus ex simplici lamina, qui cum præcedenti A. A. constituit integrum circulum pro ambitu & complexu mammæ cancerosæ & hunc in finem cum altero inferne arctissime coit, clauditque.
 - C. C. Duo manubria semicircularum, quorum iste ex simplici lamina D. D. alterum duplice A. A. transversim subit & substringit.
 - D. D. Notat hiatum & distantiam duplices laminæ A. & a. pro intromis-
fione cultri.
 - E. Culter chirurgicus semicircularis in medio convexus & aliquatenus ca-
ve politus pro complexu & extirpatione intimiori mammæ can-
crosoe.
 - F. Manubrium cultri æquale & planum, quod clavis semicirculis A. &
B. per spatiū D. transit, & manu chirurgi hinc pro operatione
inservit, ut patet ex Fig. II. E. D. G.
 - G. Cochlea, quæ intorquetur pro coarctatione partium instrumenti ea-
rumque adaptione ad usum, quæ a parte inferna ubi mammam
attingit plana & æqualis esse debet.

Fig. II.

Repræsentat fæminam, cuius mamma sinistra cancero obsessa est, & in qua applicatio ipsius instrumenti, ut & extirpatio ipsa monstratur.

- A. Mamma cancerosa cum protuberantiis suis.
 - B. Brachium sinistrum de pectori bene extensum, ut musculus pectora-
lis a mamma cancerosa eo melius discerni queat.
 - C. C. Laminæ ex aurichalco vel ferro Fig. I. A. B., quæ mammam cancero-
sam complectuntur, eamque pressione sua integrum e fundo suo o-
perationi exponunt.
 - D. Manus sinistra chirurgi, in qua tenet manubria Laminarum fig. I.
C. C.
 - E. Manus dextra chirurgi, quæ manubrium cultri fig. I. F. firmiter
tenet, illum sursum ducit, & ita strenue operationem suam perficit.
- F. & G.
- Q 10



F. & G. Designant circulum, quem constituit culter mammam resecando.

H. Culter mamimam resecans, qui supra musculum pectoralem ductus totam mammam cancerosam una sectione funditus extirpavit.



D I S



P R O O E M I U M.

Nihil quidem frequentius apud medicos chirurgosque imprimis, repe-
ritur, prompta tetrici cancri extirpatione: sed nihil tamen ea-
dem esse ut plurimum incertius, damnosius & periculosius, simul moestio
cum corde fatendum est. Adeo enim usque immite atque intractabile pro-
fus abominandi illius mali plerumque esse solet ingenium, ut nulla fere hu-
mana ope & arte superabile sit, unde verissime quondam cecinisse videtur:
notissimus ille feliciore ingenio, quam fato, poëta Sulmonensis:

*Ulceris id genus est, quod, quum sanabile non sit,
Non contrectari tutius esse puto.*

Profecto, ne potentissima quidem nature & artis instrumenta & prä-
fida, ignis nempe atque ferrum quidquam sèpius valent ad fecundam il-
lam & immortalem quasi luem penitus extinguendam. Neque enim atro-
cissima illa pestis exscinditur ferro, aut exuritur igni; quin potius,

*Per damna, per cædes, ab ipso
Dicit opes animunque ferro:
Non Hydra, scèto corpore firmior,
Vinci dolentem crevit in Herculem.*

Quam hydra illa cancerorum plus quam Lernæa in medicos chirurgosque
vinci dolentes, aductis subinde viribus, ferociter insurgit, omniaque il-
lorum machinamenta, quantumvis valentissima, eludit atque retundit,
Tam late enim serpit dirum istud immedicabilis mali contagium, ut, licet
uno loco, vindice ferro, resciuum fuerit, mox tamen altero, acrius re-
surgat, immo & hoc repurgato, paulo post tertium, quartumve sedisli-
ma sua tæbe infestet & contaminet, ita, ut in hoc numeroso & feraci ma-
lo plane eradicando, una fere salus sit, nullam prorsus sperare salutem,
& maxima hic scientia pars esse videatur, sanare non posse, uti scitè
loquitur Quintilianus. Non enim eo ipso solum loco, ubi pestiferi illi li-
ventes ac subfusci cancri ramicæ latius dispersi conspiciantur, propria ac
destinata ejusdem sedes esse deprehenditur: sed per omnem potius corporis
affecti & infecti ambitum, ubi musculi, pinguedines & glandulæ potissimum
depositæ sunt a natura, latissime circumspersa latent contagiosa cancri
edacis semina exitium paritura: inde sèvum virus

*urit corpore serpens
Quamcumque arripuit partem, reptitque per artus.*

Mutua namque tæbe mox omnia inficiuntur, & extirpato uno cancro;

O o o 2 por

