

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLV.

VD18 90538919

LXXV. Dissertatio Medico-Chirurgica, De Hydrocele.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16590

L X X V.

D I S S E R T A T I O
M E D I C O - C H I R U R G I C A,

D E

H Y D R O C E L E.

Quam Praeside

D. D. L A U R. H E I S T E R O;

Tuebatur

M A R T I N. A R N O L D. B U T Z E R

E M B D A N E N S I S.

Helmstadii 30 Decembris anno 1743.



WILHELM

ERGASIAS
PHYSICO-CHIRURGICA

10

HISTOLOGY
OR THE SCIENCE OF

THE HUMAN BODY

BY JAMES THOMAS
M.D. PROFESSOR OF PHYSIC

IN THE

UNIVERSITY OF LIVERPOOL
AND OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS
OF LIVERPOOL

WITH A HISTORY OF MEDICAL



Landesbibliothek Oldenburg

I.

Cum superiori æstate cum multis medicinæ Studiosis a Cel. Dn. *Prefide* Introitus, viderim operationem & curationem chirurgicam *Hydroceles* in juvēne perfici, qui hoc morbo laborabat, atque hucusque non viderim dissertationem, quæ de hoc morbo molesto & magni sane momenti egit, operæ pretium esse existimavi, ut hoc argumentum pro themate inaugurali mihi eligerem, atque intimius illius genium ac naturam excuterem.

I I.

Hydrocele mihi definitur, quod sit species hernias sive tumoris scroti, ubi Definitio in tunica ejus, vaginali dicta, magna, immo quandoque maxima seri copia morbi præter naturam colligitur. Scrotum inde nunc aliquo modo tantum, nunc vero in aliis in magnam admodum molem, non solum cum molestia & incommodis ærorum, verum & cum lœsione variarum actionum intumescit.

I I I.

Originem dicit vocabulum hydroceles græcum ab ὕδωρ, aqua, & ξηλη, hernia sive tumor, & hinc Latinis dici solet hernia aquosa: quia ut jam dictum est, aqua sive liquor aquosus præter naturam modo parca, modo larga copia in scroto colligitur, atque hinc nostratis Wafferbruch, Belgis, Water Breuk; Anglis, Water rupture; Gallis, hydrocele sive kernie aquense & Italis ernia aquosa appellatur.

I V.

Quamvis hic morbus ab antiquissimis medicis ad hernias easque veras fuerit relatus, dum quemvis tumorem sive intumentiam scroti pro hernia A quibusdam pro Hernia liber. VII. cap. 18. & seq. videri potest, sumserint; sunt tamen inter recentiores multi pruritu innovandi occupati, qui sub herniae nomine aliter, quam veteribus in usu erat, absque ratione sufficiente non nisi prolapsum intestinorum vel omenti vel utriusque ex abdomine intelligi volunt. Verum ego, ubi de nomine morborum antiquorum sermo sive lis est, sentire hic malo cum medicinæ statoribus ac parentibus, vetustissimis scilicet medicis, quibus jus erat morbis nomina dare, & vulgo, qui quoscumque tumores scroti, sive illi a prolapsu alicujus partis ex abdomine, sive ab alia materia & cauſa oriantur, nomine herniarum, & recte quidem indigitant atque intelligunt.

Tom. III.

T t

V.

Etymologia.

hernia
vera non
habetur.

V.

Divisio
hernia-
rum.

Quidam ergo hernias in *veras* & *spurias* distinguunt, atque hydrocoelen, sarcocelen, varicocelen &c. ad *spurias* referunt; sed *sub herniae verae nomine* tantum illos tumores in scroto & alias circa abdomen, nimurum in inguinibus, umbilico aut alia ventris parte intelligi volunt, *ubi aliquid ex abdomine prolapsum*, tumorem facit, ejusque caussam constituit. Sufficit mihi, quod *hydrocele hernia sit*, sive quis eam inter *veras* sive *spurias* referre velit. In eo tamen omnes convenient, *quod*, sicut in definitione §. I. dixi, *fit tumor scroti, ab aquæ collectione p. n. in eo producetus*, ideoque facilis ero in verbis, dum de lana caprina non litigabo, si modo conveniamus in re, & bona eam curandi methodus doceatur.

VI.

Hydroce-
les diffe-
rentia.

Variæ ejus dantur *differentie*: quædam enim est *recens*, alia *inveterata*; alia *parva*, alia *magna*, unam ad duas libras liquidi aquosæ sive serosi continens; alia *maxima*, sive tam *ingens*, ut caput humanum superet, immo ad genua & supra illa dependeat, quemadmodum Ill. *Dn. Praes* ejusmodi ingentes hernias aquosas vidit. Plerumque tantum est *in uno scroti latere*, sed sine dubio etiam interdum esse potest *in utroque*. Quandoque, præsertim si parvus adhuc est, *mollior* existit, *plerumque vero valde durus*, quia tunicae ab humore contento vehementer extensæ sunt. In calore saepius paulo *molliores* fiunt, in frigore vero rursus *duriores*. In plenisque humor contentus est *pellucidus*, in quibusdam vero *turbidus*, aut *fusca* aut *sanguinolentus*, ut Ill. *Dn. Praes* aliquoties expertus est. Interdum est *simplex*, ubi nullum aliud vitium simul adest; alia *composita* sive complicata, quando nimurum præter liquidum aquosum testiculus *scirrhosus* est, vel intestina simul in scroto adsint. Hanc *hydroenterocele*, illam *hydrosarcocelen* appellant. Nos vero hic potissimum de *simplici* hernia aquosa acturi sumus. Quandoque vero aqua in scroti tantum tegumentis sive involucris communibus, & speciatim in tunica pinguedinis sive adipis, vel ut hodie a multis appellari solet, barbaro vocabulo *cellulari*, quæ vero *ex loco*, ubi aqua hæret, ab affectu nostro distinguitur, quæ de re inferius plura.

VII.

Anatomica
consi-
deratio
partium
est necel-
faria.

Possemus nunc ad signa & caussas ejus considerandas progredi; verum lubet prius *partes illas*, in quibus hernia aquosa sedem suam habet, *anatomice considerare*, harumque *partium fabricam* exponere; quia anatomia fundamentum est solidissimum, sicut in quam plurimis aliis morbis, præsertim



Sertim chirurgicæ subjectis, ita & in hoc nostro: & qui illam non inteligit, neque recte de ejus constitutione, neque rite & folide de ejus curatione judicare, multo minus in ea, quæ per scalpellum, aut per alia chirurgica remedia perficitur, operatione legitime procedere poterit.

VIII

Quoniam vero *scrotum* affectus illius, de quo hic agere constituimus, sedes est, ejus constitutionem & fabricam, una cum partium contentarum, quatenus ad scopum nostrum faciunt, hic dabimus. *Scrotum* dicitur ea pars corporis virilis, quæ sub membro virili, inter femora sita est, & instar sacculi cuiusdam, duplice loculo instructi, testiculos viriles una cum partibus ad hos pertinentibus continet atque asservat, eisque pro involucro inservit.

IX

Testiculi vero in scroto *involuta* *habent duplices generis*; quædam enim *involuta communia*, quædam *propria* dicuntur. *Communia* sunt, quæ utrumque testiculum simul involvunt, qualia sunt generalia illa tria totius corporis *tegumenta* sive *involuta*, *cuticula* scilicet sive *epidermis*, *cutis* & *pinguedo*, quam vulgo *tunicam adiposam*, ob adipem sive pinguedinem, quam continent, & recentiores *cellularem*, ob multas cellulas, ex quibus constat, appellare solent, *cutisque* & *tunica adiposa* in scroto *admodum tenuia* sunt. Quamvis vero haec tria utrumque testiculum involvant, tamen per medium secundum longitudinem, a parte inferiore penis, ubi urethra in eo sita est, species divisionis conspicitur, quæ *sutura scroti*, græce *rāphe* vocari solet, qua scrotum in dextram & sinistram partem dispeſcitur, quamvis hæc sutura non profundius in scrotum penetret sive descendat, quam reliqua cutis scroti, adeoque & ceteras interiores partes non disjungat sive distinguat, sed solum involvat. *Originem* sive *potius continuatam* habet hæc cutis a parte cutis inferiori & anteriori abdominis ac penis, & deinde a perineo, cum quibus continua est, atque testiculis in forma subrotunda superextendit, eosque sic commode sustentare potest. *Huic subjacet tunica pinguedinis sive adipis*, quæ tenuis hic est, & aliquo modo intra duplice parietem septi scroti se insinuat, quæ potissimum in ita dicto *hydropoe scroti* afficitur, & aero ibidem collecto plus minusve tunc extenditur.

三

Ad specialia sive propria tegumenta aut si mavis involucra testium primo referenda est membrana robusta musculosa, forma quasi ovata, prioribus subjecta, quæ *dartus* appellatur, sic tamen, ut in uno scroto duæ ejus- Membrana dartz.

T t 2 modi



modi sint membranæ , altera in dextro , altera in sinistro ejus latere, quærum quælibet seorsim unum testiculum , cum ceteris suis propriis involucris instar sacculi ambit , atque laxe tam cum cute , quam cum subsequenti tunica vaginali cohæret , ejusque ope scrotum corrugari solet . *Figura ejus cum testiculo sicut & subsequentes quodammodo convenit , hoc est , subrotunda sive ovata est , & cum superiori parte penis inferiori parti adhæret.*

X I.

Septum
scroti
quid.

Attamen in medio scroti , eo in loco , ubi sutura in cute ejus extus conspicitur , inter se invicem arcte connectuntur , atque hac duplicitis darti membranæ conjunctione *septum scroti* , quod vocant , efficiunt , quo non solum in statu naturali testiculi a se invicem distinguuntur , & cuivis peculiaris quasi loculus sive camera constituitur ; verum & in statu morboſo , præsertim in *hydrocele* , una cum tunica vaginali impediunt , ne serum vel lympha in uno scroti latere effusum , aut in aliis morbis pus aliave materia noxia , quæ unum testiculum affligit , etiam mox alterum simul afficiat , atque damnum aliquod ei inferat . Hic paries medius duplex , sive septum scroti testiculis interjectum , quia remota cute scalpello per artem a se invicem separari , atque sic in duos loculos dividi potest . *Ravivs* celebris quondam anatomicus & chirurgus Germanus in Belgio *homini non unum , sed duo esse scrota sustinere voluit* , atque hanc ob rem acerbas lites cum Celeb. *Ruyſchio* inchoavit ; qua de re & hujus & illius epistolæ de *septo scroti* Amstelodami tunc anno 1696. & seqq. impreſſæ , uberioris , cui latet , videri possunt .

X II.

Tunica
vaginalis.

Hanc membranam sequitur *tunica vaginalis* dicta , quia testiculum quasi ut in vagina continet cum suo musculo *crenulare* dicto , quæ tunica laxe & fere ad modum pericardii , quo cor ambit , testiculum cingit , figuræ quoque ovatae , & si , facta prius in ea vulnusculo sive foramine , tubulo inflatur , multum magnitudinem testiculi superat , atque lubrico humore semper , qui forte ut liquor pericardii ex testiculo transudat , imbuta est , ne cum testiculo concreſcat , & ut ab hoc etiam testiculus in debita mollitie & flexilitate conservari possit . *Oritur hæc tunica* a tunica peritonæi externa vel potius continua est cum exteriori peritonæi lamina , quæ per annulum musculi oblique ascendentis per inguina ad scrotum descendit , & vulgo *processus peritonæi* vocatur , atque vasa spermatica ex abdomen ibidem egredientia involvit , atque ad testiculos deditur , & quando ad eos pervenit , multum dilatatur , atque *tunicam hanc vaginalem* constituit , ubi tamen adhuc notandum , quod hic processus , ubi fere ad testiculum pervenit , ita cum vasis spermaticis ibidem concreſcat , ut *cavitas tunice vaginalis* cum pro-



processus cavo nullam habeat communicationem, ita, ut si fatus per exiguum foraminulum aut vulnusculum huic tunice in parte ejus inferiori infictum, per tubulum immittatur, ille non in processus peritonæi penetret, neque fatus a regione ventris in processum peritonæi in tunice vaginalis cavum injectus descendat, sed inter hæc duo cava quasi paries membranaceus sive septum interjectum sit, ne fatus, adeoque etiam nec aëris, nec liquores, nec aliae res ex una in alteram partem transire queant, quo sepimento fit, ut varia phænomena circa hernias varias & speciatim hydrocelen & enteroceles explicari atque intelligi possint, quæ ab illis, qui hoc sepimentum ignorant, non intelliguntur & explicari nequeunt, de quibus vero post hæc plura [a].

X I I I.

Hoc unicum solum hic adhuc monere volui, quod musculus *cremaster*, Musculus
cremaster. qui & *elevator testiculi* appellatur, tendinea sua expansione tunicam vaginalis ambiat, hinc & a quibusdam *pro peculiari tunica* habetur, & cum hic ortum sive punctum fixum habeat fibris carneis circa infimam abdominis partem, ex hujus muscularis, quando se contrahit, tunicam vaginalis, & sic simul testiculum intus contentum elevat, & ad colem adducit. Plura quidem de hoc musculo dici possent; verum quia ad institutum & scopum meum non pertinet, hic brevitatis causa ea prætermitto. Qui vero plura de eo scire desiderat evolvere potest Cel. Dn. *Præsidis Compend. Anat.* §. 343. pag. 197. aliosve anatomicos recentiores.

X I V.

Ultima eaque maxime propria testiculi tunica *alba* & *nervea* a *Celso Lib. VII. cap. 18.* recte vocatur; *alba* ob colorem, & *nervea* ob sensum ita *nervea* dicta, admodum robusta & figuræ ovatae arcteque cum substantia reliqua testiculi vasculosa coalita, quæ vasa spermatica, arterias scilicet, venas & nervos recipit, eaque ad testiculum ipsum sive ejus substantiam interiorem transmittit, pro liquido seminali sive genitura inde secernendo. Hæc tunica quoque arcte complectitur *epididymidem* alteram testiculi quasi partem & appendicem, ejusque vascula, ut in testiculo firmiter compingit.

X V.

[a] Hoc septum etiam jam novit *Bonetus*, utpote qui in Sepulchret. p. 1292. obs. 2. ait: *Testis equidem tunica involvitur vaginali; at ea non extendit se ultra testem, sed circa vasorum pyramidalium basis definit, testi unita, adeoque transitus hic loci nullus versus abdomen, & vice versa.*



X V.

Vasa scroti
& testi-
culi.

Vasa sanguifera scrotum habet tam arterias, quam venas, a cruralibus & hypogastricis, unde pudendeæ ex vocantur, quæ ad scrotum in viris abeunt. *Testiculi* vero, præter communia quædam cum scroto, quæ per exteriōres ejus tunicas dartum scilicet & vaginalē disseminantur, arterias obtinent *spermaticas* dictas, exiles, ut plurimum ex aorta descendente, angusto principio ortas, quæ utrinque per annulos muscularum abdominis super os pubis e ventre egrediuntur & per inguina in processibus peritonæi ad scrotum & ad testiculos descendunt, ubi arteria ut plurimum in duos ramos distribuitur, quorum alter ad *testiculum ipsum* & proprie sic dictum, alter ad *epididymidem* abit, ibique in minores ac minimos tandem ramulos divisi per utriusque substantiam undiquaque dispescuntur, partim pro testiculo nutriendo, partim pro liquido genitali inde fecernendo. *Venarum testiculi dextra* in venam cavam, sinistra vero plerumque in emulgentem sinistram se inserit, copiosissimis vero radicibus sive ramulis ex testiculorum substantia prodeunt. Valvulis saepe destitutæ sunt, variaque & mirabiles anastomoses conficiunt, a Graafio lib. de part. genital. virorum Tab. I. fig. 2. optime delineatas, quas nonnulli *corpus pampiniforme* sive *pyramide* ob figuram appellant, quæ per processus peritonæi super os pubis, per annulos muscularum abdominis juxta arterias, eisque intermixtae in ventrem ascendunt, & sanguinem a nutritione ac genituræ secretione supervacaneum, ad venas prædictas & cor revehunt.

X V I.

Nervi &
vasa lym-
phatica.

Nervi a plexibus nervorum pelvis & lumbaribus satis multi ad testiculos cum arteriis abeunt, & per tunicam albugineam, quæ *nervea* propterea vocatur, testiculos ingrediuntur, unde valde sensibilis est, qui spiritus testiculis pro variis ad generationem necessariis usibus inferunt. Denique & *vasa lymphatica* in testiculorum superficie in viventibus animalibus conspicuntur, quæ lympham ex ipsis post liquidi genitalis separationem abundantem per processus peritonæi quoque in ventrem revehunt. In hominibus vero *Glossonius* ea quoque vidisse perhibetur a Thom. Bartholino in *Anatom. Reform.* cap. XXII. de testibus.

X V I I.

Testiculi
& epididymidis
fabrica.

Situs, numerus, magnitudo ac figura etiam *testiculorum omnibus* adeo nota sunt, ut non opus esse existimem his diutius immorari, sed si quis forte hæc ignoret, aut solum quid auctores de iis scriperint, nosse velit, eum ad *Graafii modo laudatum librum* aliquoque anatomicos alegabo. Ratione



tionem *situs* tamen hoc solum monebo, quod *siti* sint in tunica scroti vaginali §. XII. & ope hujus adhaerent septo scroti, ne in nimis motibus, & concussionibus corporis vehementioribus ruidius concurtiantur, & noxam forte inde patientur. Constat *testiculus* quilibet ex *testiculo ipso*, ac deinde ex *epididymide*, sive *parastata*, conf. *Graafii Tab. II.* fig. 2. & 3. quae ex manifesta & mira vasorum seminalium ex *testiculis* ortorum, ac longe ampliorum, quam in *testibus* sunt, congerie compositae sunt, liquidumque genitale in *testibus* secretum, & aliquo modo preparatum ex his recipiunt, uberioris perficiunt, illudque tandem, post diuturnos in his circuitus & coctiones in *vas deferens* dictum dimittunt, per quod postea ad *vesiculos* *seminales* deponitur, & suo tempore pro fetus novi generatione per urethram in arvum muliebrem deponitur. Quod cuius naturae sit, & utrum *verniciuli* aut alia viva *animalcula* ei, ut quam plurimi hodie cum *Leuvenhoekio* & *Boerhavio* statuunt & credunt, insint, hoc loco non investigabo, quia ad scopum meum non pertinent, sed aliis uberioris pervestigandum atque discutiendum relinquam.

XVIII.

Substantia testium ipsa, licet ex *Celsi* sententia *glandulis simile* quid in figura ac substantia habeant, atque etiam aliquid, ut *glandulae* multæ aliæ solent, secernant, tamen nullæ *glandulae* in ipsorum substantia sive corpore conspicuntur; sed ex tenuissimorum vasculorum alblicantium, filis tenuissimis similium, peculiaris generis congerie, mireque & intestinorum more complicatorum fabrica constant [b] membranulis sive sepimentis pluribus & corpore *Highmori* vario modo inter se distincta ac firmata, ut certo ordine & situ contineantur, (sicut videre est in *Graafii Tab. III.* fig. 4. ex cane, atque *Tab. IV.* fig. 4. & 5. ex homine) quo munere suo ad propagationem generis humani adeo necessario tanto melius fungi possint. Atque haec erunt illæ partes, in quibus & circa quas morbus ille, de quo hic agimus, sedem suam habet, & quo quandoque quidam misere corrumpuntur.

Interior
substantia
testiculi.

XIX.

Causam hydroceles proximam esse *serum* vel *lympham* manifesto docet *Caussa hy-*
liquor, qui ut plurimum in ejusmodi malis in cavo scroti deprehenditur. droceles
Serum & *lympa* a physiologis ut plurimum tenuitate, sicut illud est, quod proxima-
in vasis lymphaticis vehitur, distinguuntur, dum *serum spissus* & *glutinosus*, *lympham* vero *tenuius liquidum* esse dicunt, atque vix aliam quam
tenuitatis majoris vel minoris differentiam haec inter liquida constituant.

Hanc

[b] Videri haec possunt *resoluta* in *Cel. D. Præsidis Comp. Anatomi. fig. 24.* eaque
sic in natura in museo ipsius vidi.



Hanc si fundamenti loco assumimus sententiam, serum frequentius ejus caussam esse existimo, quam lympham. Nam in hydrocele illa (§. I.) liquidum erat quidem pellucidum, sed adeo spissum, ut fere albo ovi spissitudine simile fuerit; in aliis vero quam plurimis, quos *Dn. Praes* ab hoc malo curavit, hoc liquidum ita deprehendit, ut licet satis apparet, tamen ad tactum glutinosum esset, & quando in cochleari super candelam vel prunas ignitas per breve tantum tempus teneretur, in massam albi ovorum cocti coiverit, id quod lympha ex vasis lymphaticis collecta tantopere & tam cito facere non solet.

X X.

Quomodo Sed quomodo aut unde in scrotum & speciatim in cavum tunicae vaginalis in scrotum proveniat, variae prostant scriptorum sententiae. Quidam putarunt ex cavo abdominis hoc liquidum per processus peritonaei, vel per vias alias occultas serum, perveniat huc pervenire. Verum quia inter processum peritonaei & cavum tunicae vaginalis, ut supra §. XII. dixi, paries membranaceus interpositus est, ut ne flatus quidem, multominus serum transire possit, adeoque per hanc viam hoc non contingit, praesertim, quia multi sunt ascite laborantes, quorum abdomen fero repletum est, in quibus tamen hydrocele non generatur. In *anasarca* quidem laborantibus scrotum sepe intumescit; verum in his serum non colligitur in tunica vaginali, sed in scrotri membrana adipi destituta. Quidam hoc liquidum, praeceps quia quandoque urinæ colorem obtinet, urinam esse credunt; verum nec pro hac ex vesica vel urethra adest via, neque urina super ignem in modum feri coit. Itaque potius, cum testiculi obtineant vas lymphatica, eisque etiam tunica vaginalis forte non privata sit, vel ex his ruptis provenire poterit, vel etiam ex vasis arteriosis testiculi aut tunicae vaginalis, vel per anastomosis, vel per diæresin, vel per diapedesin, ut veteres locuti sunt, vel &, ut clarius me explicem, per insensibilia tunicarum foraminula quasi transudare; sed a vasis absorbentibus non absorberi.

X X I.

Caussæ remotæ quandoque sunt collisiones & contusiones scroti aut testiculorum, ictus, lapsus, equitatio vehementior, aliæve caussæ externæ violentæ, quibus vasa tenera lymphatica, sive arteriosa sive venosa sint, laedi atque ita debilitari possunt, ut serum suum hic demittant, vel ut Boerhae-
vius ait [c], si humor ibi secretus, suis vasis non absorbetur, sed stag-
nat & accumulatur. Quidam etiam errores in ictu huc referunt: quos
vero valde incertos esse existimo, cum quam plurimi similes aut majores
adhuc errores committant, quam ii, qui his morbis laborant, quorum
mul-

[c] In Aphorismis suis practicis §. 1227.



multos valde sobrios novit Cel. Dn. Praes, & tamen ejusmodi herniis non corripiuntur. Alii alias cauffas & subinde valde absinas adducunt, ut exempli loco *Hildanus*, qui Cent. IV. obf. 66. cum Dodonæo renem sistrum male affectum accusat; cum enim hic urinam ex vasis emulgentibus non attrahere posset, (quia scilicet male affectus esset) per vicinam venam feminalem illam in membrunam vaginali deponi. Sed condonandum est hoc magnis hisce viris, qui vixerunt & haec scripserunt, antequam circulus sanguinis fuit detectus. Pudet vero plures ejusmodi adducere. Pergo potius ad legitimam cognitionem hujus mali, in qua quamplurimos ceterum egregios errasse medicos Dn. Praes siueius expertus est.

XXXI.

Signa igitur, quæ *diagnostica* vocant, in hoc malo probe perpendenda, quia error in his, dum quis verbi gratia medicus *herniam scroti intestinalem* sive *enterocele pro hydrocele* haberet, & chirurgo non melius perito mandaret, ut curationem aut aperturam, vel *per puncturam* cum lanceola, vel cum *acu triangulari cuspide* ac tubulo inclusa, quam *Troicar* vulgo vocant, vel & *per incisionem* scroti cum scalpello perficeret, *intestinae his vulnerentur*, ex quo vulnere curandus in sumnum vitæ periculum conjiceretur, cum maximo hujus medici dedecore & infamia. Ex quo exemplo, cum *enterocele* & *hydrocele* facile inter se confundi possint, dum *signa multa* habent *similia*, patet, quanti sit momenti semiologia sive accurata signorum scientia, licet a variis vilipendatur; dum ex ignorantia aut neglegtū illorum ægri saepe interficiuntur.

XXXII.

Cognoscitur itaque hydrocele generati ex *tumore rotundo* in scroto, sensim nato, quem nullus tumor intestinorum ex abdomen proveniens in inguine, sive nulla *bubonocele* præcessit, qui semper ab initio in scroto permanxit, & neque sponte in ventrem, præsertim in decubitu in lecto, intravit, neque pressione scroti in ventrem unquam repelli potuit, & *ad tactum paulo mollior* est, ut fere vesica humore quodam valde repleta, nec tam durus, ut scirrhi esse solent, neque *murmura in scroto* percipiuntur, neque dolores colici ventris cum tumore hoc scroti communicantes: quibus adhuc hoc accedit, quod si vesperi post hunc tumorem *candela ponatur*, tumor plerumque aliquo modo *pellucidus* appareat.

XXXIII.

Verum haec signa sola, nisi adhuc comparentur cum aliis quibusdam *herniis* in scroto occurribus, quæ quoad signa cum hydrocele multum specialia.

Tom. III.

V v

con-



conveniunt, ac speciatim cum *enterocele* & *sarcocele*, quam cautissimos quandoque fallere possunt, hinc & signa specialia *discretiva* harum heriarum, quibus altera ab altera discernitur, hic subjecere necessarium existimo. Itaque in *enterocele*, præsertim magna, tumor ob intestina contenta, quæ varie contorta, *inæqualior*, si rite inspiciatur atque accurate consideretur, appareat; deinde in *enterocele* (nisi intestina, ut in inveteratis subinde fieri solet, extus in scroto adnata sint) *cum certo quodam murmure* in abdomen reponi possunt, & etiam in decubitu sponte in abdomen relabuntur, scrotumque tunc a tumore illo vacuum proflusque liberum est: qui vero tumor, si ægri surgunt, radit, dum intestina tunc suo pondere foras rursus prolabuntur. In *hydrocele* autem ab initio & quamdiu duravit, tumor *semper in scroto* & *constanter*, sine omni fere mutatione permanet, & neque sponte recedit, neque manibus in ventrem repelli potest. Porro in *enterocele* a scroto versus annulum muscularum abdominis lateris lœsi tumor per inguina extensus, adeoque tumor a scroto per inguinem ad annulum usque oblongus est. Verum in *hydrocele* ordinaria tumor *solum est in scroto*, humorque ultra limites tunicae vaginalis ejusque septi ascendere nequit, atque hinc *figuram magis obtinet rotundam*, ad modum vesicæ alicujus inflatae, aut liquore quodam repletæ.

XXV.

Alia adhuc signa specialia. Præterea *enterocele* laborantes sepius *tornina sentiunt & colicos dolores* & *ventre ad scrotum usque sese extendentes*, imo haud raro quoque *vomitū simul corripiuntur*; quæ vero symptomata in *hydrocele* non sunt usitata, quia nulla appetet ratio, quare hæc symptomata ab aqua in scroto oriri queant, & non nisi in his accidere quandoque solent, quando magnos forte errores in vietu commiserunt, quo in casu quilibet his malis obrui potest. Quare vero illa *symptomata in enterocele frequentia sint*, facile quilibet comprehendere poterit, qui considerabit, quod in *enterocele*, ubi pars eaque *sæpe magna intestinorum in scroto heret*, fæces omnes, quæ per alvum excrenendæ, primo in scrotum descendere, & deinde per angustum in muscularis abdominis foramen rursus ascendere debeant: quo in loco igitur facile excrementa una cum flatibus cohibentur, & in libero progressu versus anum impediuntur: unde fit, ut, præsertim si illi homines cibis crassis, obstipantibus, adstringentibus aut flatulentibus se nimium repleverunt, obstrunctiones alvi frequentes, *tornina ventris ac dolores colicos sæpe patiantur*, & si cibi aut fæces ad partes inferiores, ob vias obstructas, pergere nequeant, ad ventriculum regurgitent atque sic, irritato ventriculo, *vomitum concident*, quæ mala cur in *hydrocele* orientur, nulla est ratio; quia hæc cum intestinis nullam habet communicationem, novitque Dn. *Præses* ægros aliquot, qui frequentissime & quandoque *angulis hebdomadibus colica & vomitu vehementi misere afflicti fuerunt*, qui, quod



quod hæc mala ab hernia orientur, ignorarunt, & a colica & vomitu illo frequenti liberati fuerunt, postquam ipsis intestina in ventrem repulsa & ope apti vinculi intus retenta fuerunt; cum antea, quod hernia laborent, celaverint & nemini aperire voluerint: immo non pauci, & præsertim etiam nonnulli magnates & verecundiores *passione iliaca* inde correpti, omnino præmature mortui sunt. Contra hydrocele ut plurimum est indolens, & cum primis si parva aut mediocris. Verum si tandem magna fit, magis tamen tantum molesta, quam dolens fit; dum ægri difficulter ob molem illam ambulare adhuc difficilius aut vix amplius *equitare*, variose alios motus satis promte perficere queunt. Præterea *enterocele prias in inguine ut plurimum*, quam in scroto percipitur, in quod tandem, si negligitur, descendit; *hydrocele vero mox in scroto incipit* & sentitur atque nunquam fere in inguen ascendit, nisi novum malum in inguine superveniat; id quod tamen valde rarum est, quod extraordinarii quid ejusmodi superveniat. Præterea in *hydrocele ordinaria*, de qua haec tenus dixi, *testiculus digitis percipi* nequit, id quod tamen utplurimum in *enterocele* fieri potest: ubi intestina extra tunicam vaginalem, in processu peritonæi in peculiari facco, supra septum tunicæ vaginalis hærent.

XXVI.

Verum longe *difficilis hydrocele a sartocele distinguatur*, ut haud raro & medici & chirurgi satis prudentes atque experti hac in re decepti fuerint, sicuti notabile exemplum *Dn. Præsidij* notum est, ubi magnus & expertus chirurgus, dum ejusmodi herniam, præsentibus multis medicinæ & chirurgiæ studiosis pro hydrocele aperuit; sed aperto tumore, videns malum sartocelem esse, gallice exclamavit; *Messieurs je me suis trompé*. Nam primo uterque hic morbus oritur in scroto, & quidem eodem fere prorsus in loco, eodemque fere modo sensim sensimque crescit. Deinde uterque tumor durus & renitens, ac pondere molestus fit, uterque etiam sine dolore utplurimum & oritur & crescit, atque satis diu sine dolore manet. Interea tamen in *sartocele* successu temporis quandoque, attamen non semper dolores percipiuntur. Eamdem etiam uterque *figuram subrotundam* scilicet sive *ovatam* obtinet, ita, ut mirum haud sit, quod ob tam multa similia signa quam facilime inter se confundantur, & quale horum maiorum in hoc vel illo æstro adsit, satis exercitatis, multo minus nondum satis bene his in rebus versatis, certo dicere, sit sœpe difficultinum. Interea tamen *Dn. Præses* certissima distinctionis signa inter has duas hernias, dum quamplurimos vidit & curavit, esse me docuit, primo quod in *sartocele major* *digitis percipiatur durities*, quam in *hydrocele*, si exploratio digitis rite instituatur, & quod in *hydrocele* aliqua in scroto percipiatur mollities, & alicujus humoris fluctuatio, quasi in vesica liquore summe infarcta ac distensa. In *sartocele* vero sœpe aliquæ *lancinationes* & dolores,

Diffin^{tio}
hydroce-
les a sarto-
coele.

V v 2

si



si malum præsertim jam inveteratum est, adsunt. Deinde etiam quidam pro certis distinctionis notis tradunt, quod, quando æger in obscuro loco lumini claro aut candelæ opposito ponatur, & tumor scroti tunc pellucidus appareat, hydrocele certo adsit, id quod etiam facile concedo; verum hoc solum moneo, quod ratiocinatio a contrario hic non valeat, quod nimurum, si tumor non pellucidus reperiatur, non mox argumentari liceat, morbum esse *sarcocelen*. Nam iu farcoele scrotum quidem opacum conspicitur; verum dantur etiam hydrocelæ, ubi scrotum haud pellucidum, sed opacum est, quando scilicet humor intus contentus, ut supra §. VI. jam dixi, atque *Egineta* jam notavit, *sanguinolentus*, *fusca* aut *nigricans* existit, atque sic transitum etiam radiis non concedit, ita, ut tactui curioso hic magis, quam visui sit fidendum; at si tamen deinde tumor, adhibita candela, rubicundus intus appetat, liquorum contentum *rubrum*, sive *sanguinolentum*, aut alio modo *opacum* esse suspicari possumus, quam speciem herniæ Dn. *Præses* in chirurgiæ part. II. cap. 123. *Hematocelen*, forte haud inepte, vocavit. Denique adhuc notari velim, quod farcoele saepe sit in utroque scroti latere; hydrocele vero plerumque tantum in unico latere.

XXVII.

Hydro-sar-coele difficulte difficulte cognoscitur.

Quando autem *hydro-sarcoele*, sive *hernia aquosa* & *carnosa* simul adsunt, difficillime cognoscitur: quia aqua carnosum tumorem sive scirrum testiculi ambit, ita, ut humoris præsentia fluctuatione quidem cognoscatur, sed testiculis durus quandoque tactu percipi nequit. Interea tamen Ill. Dn. *Præses* magnam ejusmodi herniam anno 1728. in rhedario curandam habuit, in qua sub humore fluctuante etiam tumorem durum sive testiculi scirrum, qui ovi struthionis fere magnitudinem habebat, tactu percipere poterat. Num vero hoc semper, præsertim in scirris testiculorum minoribus, & ubi magna liquoris copia eum ambit, fieri possit, haud affirmare audet, & in quavis potius hernia aquosa curanda ægris antea indicat, quod non certe initio dicere possit, *an sib aquosa hernia non etiam carnoſa adhuc lateat*; quæ, si emissâ aqua reperiatur, peculiarem suam curationem desideret. Præterea si hernia aquosa sola adeat, ad lumen adversum inspectum, *pellucida*, præfente vero farcoele, *opaca* erit. Hinc nescio, quomodo factum sit, quod *Hildanus* cent. IV. obl. 65. casum referat, ubi scrotum sibi pellucidum apparuerit, & tamen scroto aperto, cum hydrocele *simul sarcocelen* invenerit. Sed suspicor hanc explorationem non satis accurate institutam fuisse, cum *testiculus scirrhosus pellucidus esse nequeat*, neque etiam, se illum, aperto scroto, pellucidum deprehendisse, scribit.

XXVIII.



XXVII.

Atque hæc sunt signa hydroceles ordinariae sive vulgatissimæ, atque antiquæ notæ, quibus hæc & satis cognosci, atque etiam ab aliis affinibus malis distingui potest. Verum primo, quod sciam cel. Boerhaevius in aph. pract. §. 1227, & postea variis alii, qui in Dn. Praesidis chirurg. p. 342. citantur, memorant, quandoque istiusmodi hydroceles casus observari, ubi etiam supra testiculum in peritonæi processu, qui vasa spermatica involvit, & quidem speciatim supra illud sepimentum, quod hunc processum a cavo tunicae vaginalis disjungit, §. XX. indicatum, humorem quandoque colligi p. n. ac tumorem ibidem in inguine ac supra scrotum concitare, testiculumque tunc in scroto digitis tangi posse, tumorem vero in inguine se ostendere oblongum, qui prope testiculum desinit. Quibus vero signis hic ab enterocele distinguatur, difficile mihi videtur, illudque etiam apud scriptores illos reperire non potui, velimque, ut illi, qui hujusmodi hernias accurate viderunt, & pervestigarunt, signa vera pathognomonica publicarent. Palfinus in chirurgia sua cap. XIV. refert, atque observationibus ibidem enarratis quoque confirmat, liquidum in hydrocele subinde in diversis cellulis hærere, ita ut una tantum incisione liquor non omnis effluat. Alii scribunt [d] subinde tam in processu peritonæi, quam etiam in tunica vaginali simul, adeoque supra & infra illud claustrum, humores diversis quasi in vesicis sive loculis colligi, sic, ut hydrocele in utroque hoc processus peritonæi cavo hæreat, atque sic duplex quasi hydrocele adsit. Imo quandoque claustrum illud etiam rumpi illi autores perhibent, atque sic humorem illum p. n. utrumque cavum replere, & quidem sic, ut postea non nisi unum cavum atque unam hydrocelen constituant; quæ vero mala si adsint, difficillime profecto ab entero- & epiplocele distinguiri poterunt. Interea tamen præcipue distinguenda erunt ex illis signis, quæ §. XXIV. & XXV. dedi, & aliquo fluctuationis signo. Namquam Dn. Praes quamplurimas hernias aquosas viderit & curaverit, tamen tales sibi se nondum representarunt [e], adeoque eas raras imo rariissimas esse existimat, & forte nomine hydroceles extraordinariae vel anomale donari posse, dum proprio nomine nondum eas donatas esse novit; quæ vero si sunt, & distinctionem hydroceles ab aliis affinibus, imo & curationem valde intricatam ac difficilem reddunt.

Hydroceles extraordinariae.

XXIX.

Hydrops scroti ab hydrocele & affinibus distinguitur, quod nimurum scrotum æqualiter & in utroque latere, instar cuiusdam vesicæ intumescat, cu-

Hydrops scroti diversitas.

[d] Ut de la Faye sive Faius in notis ad chirurgiam Dionis p. 364.

[e] Sharpius novus scriptor chirurg. Anglus in operat suis chir. has hydroceles species negat, & non nisi duas, vulgares scilicet, quæ in tunica cellulari & quæ in vaginali est, existere sustinet. Quo autem jure, ipse videat.



temque æqualiter ubique in scroto distendat, quæ inde plerumque nitet, & ut plurimum foveas digitorum impressorum aliquandiu servat; cum in hydrocele vestigia digitorum non maneat, cutisque rugosa sit, venæ sœpe valde intumescant, & plerumque tumor tantum sit in alterutro scroti latere; neque ullum adhuc novi exemplum, ubi hydrocele in utroque latere, id quod in farcoele D. Praeses sœpe vidit, simul sit observata; licet rationem non videam, cur non esse possit: dum in utroque latere eadem adsumt partes, membranæ & vasa, eademque hic etiam adesse possint causæ. Sin vero adisset in utroque latere, tamen cutis cum cuticula in hydrope scroti æqualiter expansæ sunt, lœves, splendidæ atque nitentes, cum aqua tunc in adipis tunica hæreat, unde sœpe in eamdem tunicam, quæ penem quoque sub cute ambit, se extendit, atque penem tunc valde tumidum reddit; cum in hydrocele majori penis minor fiat, & quasi in tumorem se retrahat & abscondat. Pueros recens natos cum hydrope scroti sœpius nasci Dn. Praeses alii que plurimi cum eo observarunt.

XX.X.

Quomodo ventosa & græce pneumatocelen adpellant, ut plurimum quoque mentionem faciant, aquosa eamque ut herniæ aquosæ valde similem describant, & quod non nisi loco aquæ sive serì, aër in scroto contineatur, atque homines fere promiscue omnes, qui medici aut chirurgi experti non sunt, de herniis ventosis sœpe loquantur, immo plerumque, si vel ipsi, vel pueri eorum enterocele laborant, & flatus e ventre in eorum tumorem ingredi sentiunt, tumoremque sœpe inde augeri atque dolores frequentes in eorum herniis intestinalibus oriri, aut jam præsentes inde multum augeri precipiunt, se eorumve pueros pneumatocelen laborare, sed falso existimant, dum revera sint herniæ intestinales, ubi flatus in intestinaliis multa incommoda iis concitant. Ideoque cum Dn. Praeses hucusque nullam veram ventosam herniam viderit, neque certum aliquod exemplum apud ullum auctorem invenitur, de ejus existentia, sicut in chirurgia sua cap. CXXVII. p. 855. scripsit, adhuc & ego cum ipso dubito. Interea tamen, cum haud impossibile videatur, dari posse pneumatocelen, sive ejusmodi tumores ventosos in scroto æque ac in abdomen, distinguui eam posse, si quæ forte aliquando alicui occurrat, existimo ab hydrocele & farcoele, insigni levitate, & forte etiam certo sono, si percutitur, quia scrotum aëre tantum repletum, ut pila major, quam Ballon vocant, vel vesica aëre repleta, se habebit, quæ propterea necessario longe minus habebit pondus, quam hydrocele aut farcoele, ubi liquore, præsertim crassfo & glutinoso, aut omnino corpore duro ac solido, repletum est.

XX.XI.



XXXI.

Quod ad *Prognosin* attinet, sciendum, malum hoc *non facile mortem inferre*, attamen *haud facile etiam quam valentissimis medicamentis cedere*, præsertim in adultis, maxime si jam inveteratum est; attamen in *infantibus ac pueris* subinde adhuc curari. Deinde quod, etiamsi liquor contentus *sectione aut punctura* semel eductus sit, atque sic ignaris malum ablatum esse videatur, tamen successu temporis, & quidem saepè intra paucas hebdomades *redit*, nisi in curatione perfecta, quæ eductionem liquoris insequi debet, debitibus remediis, eisque prudenter adhibitis bene propiciatur. Adeoque *eductio liquoris per lanceolam vel acum triangulari cuspide* & tubulo donatam, quæ vulgo *Troicar* vocatur non perfecta, sed *palliativa*, temporaria & *inconstans* utplurimum est, quamvis magni chirurgi vix ultra hanc progrediantur [f]. Præterea sciendum, quod *hydrocele* saepè sit morbus perquam *molestus*, præsertim quando valde magnus & gravis evadit, sic, ut ægri difficerter incedere, atque adhuc difficilius equitare queant; interea tamen, ut jam dixi, *vita periculum non facile infert*, novitque Dn. *Præses* multos, qui ceteroquin sani cum hoc malo vixerint, & ex parte adhuc vivunt, atque ad magnam æstatem pervenerunt: quæ incommoda tanto facilius ferenda, quia *plerumque, nisi alius simul morbus adsit, malum hoc est sine dolore*. Attamen quia saepè, imo utplurimum quando valde magnum sit, penis in tumorem vel omnino, vel saltē magnam partem se abscondit, *coenidi* & *genuerandi potentiam minuit*, aut omnino tollit; quod juniores, aut qui liberos adhuc desiderant, magnopere excruciat; verum in senibus, aut qui liberis instructi sunt, tanto facilis ferendum, quia illa vis etiam ex aliis causis in illis imminuitur. Præterea etiam si se penis omnino abscondit, *urina quoque excretionem* in nonnullis minus commodam, imo prorsus difficilem reddit.

XXXII.

Mirandum quoque est, serum hic saepè diu subsistere & quiescere *sine corrup-* Tunica
tione; attamen testiculorum tunicas, & præsertim dartum & vaginalē, ad- scroti val-
modum saepè crassas reddit, utpote quæ in fano vix duarum linearum habent de crassæ
crassitudinem, in ægris vero hydrocele, præsertim antiqua laborantibus, fiant.
quinq[ue] vel sex linearum & quod excedit, sicut Dn. *Præses* vidit, crassitudi-
nem induunt, ita, ut acu illa apice triangulari plerumque non nisi difficilli-
me perforari possint, quando ea humores inde educere volumus, videntur
que hæ tunicæ, imbibendo quasi hunc humorem serosum eo fere nutriti;

&

[f.] Retulit mihi Dn. *Præses*, se aliquoties a *Razio*, celeberrimo illo chirурgo, hanc palliativam curationem, sed nunquam perfectam institutam vidisse, ita & *Erudelius*, qui Regis Poloniae Archiater postea factus est, in itineri suo Angl. & Batav. pag. 121. hanc operationem ab eodem ita institutam descripsit; nullam vero perfectam unquam ab eo institutam esse aut legi aut audivi. Ita & *Sharpius* palliativam perfectæ præfert.



& sic intumescere atque crassescere. Præterea etiam interdum *testiculus ab hoc liquore male affici videtur*, quia varii notarunt, quod hydrocelen etiam *sarcocele* & *testiculus corruptus*, inde secutus sit: conferri hac de re possunt *Hiliani* observat. cent. IV. obs. 64. ad obs. 68.

XXXII.

Prognosis
hydropsis
scrota, &
hydrofarc
coceles.

Hydrops scroti in infantibus, si ceterum sani, saepe & subinde facile curatur; in adultis autem, cum plerumque sit symptoma alterius morbi, non, nisi curato prius morbo primario, tolli potest. Si *sarcocele cum hydrocele conjuncta sit*, sive in hydrocele simul testiculus scirrho corruptus adsit, sine provida resectione totius testiculi, una cum tunica vaginali ac processu peritonæi, haud curatur; hoc autem modo, uterque morbus simul, quamvis non sine periculo, tolli potest.

XXXIV.

Curatio
per medi
camenta.

Quod igitur ad curationem attinet, quia *indicatio hic est, aquam congetam, vel digerendam sive discutiendam, vel evacuandam esse, hydroceles & cumprimis hydropsis scroti curatio in infantibus*. Et pueris saepe obtinetur medicamentis digerentibus, discutientibus, roborantibus & evacuantibus. Speciatim vero in *pueris recens natis*, ubi scrotum saepe instar tenuis vesicæ ab aqua expansum est, egregie prodest, si homo aut mulier sana frustulum nucis moschatæ dentibus aliquoties in die comminuat, atque halitu deinde hoc aromatico scrotum tumidum afflet; id quod etiam eodem fere cum emolumento per spiritum vini ore detentum fieri potest, exhibito simul infantis semel iterumque idoneo purgante, & dissipandi ac roborandi scopo *pulverem aut confectionem semiinis anisi*, vel solum, vel pauxillo cinamomi addito, ita enim Dn. *Præses* se plures hac ratione curasse, me certiore fecit, præser-tim si nutrix simul aptum victus regimen servat. Quodsi tamen forte aliquando hæc malum non sustulerint, *aquam calcis tepidam*, qua splenium vel spongiam aliquoties in die irroravit, scroto applicuisse, atque inde optatum effectum vidisse. Ita & *spiritus anisi* cum fructu ope spleniorum superimponitur. Si pueri jam paulo adultiores hoc malo conflictantur, egregie iis beneficit, si externe emplastrum de cumino, vel etiam illud de baccis lauri calide scroto circumponatur, huicque splenium spiritu matricali, vel aqua an-haltina, vel & aqua calcis calida, sale ammoniaco admisto, imbutum superimponatur, adhibitis interea *interne sape purgantibus mercurialibus, decocto lignorum, effentia lignorum, tinctura tartari, vel antimonii tartarisata, exspectato subinde matutino tempore sudore in lecto*, ad serum in scroto collectum tanto valentius dissipandum atque exsiccandum; quibus superiori adhuc anno puerum septem annos natum Dn. *Præses* brevi tempore curavit. In his & magis adultis *arcuum duplicatum*, quod a cel. quondam

prac-



practico Ludovico magnopere hoc in malo, præfertim recentiori, ut efficacissimum medicamentum commendatum est [g], itemque pulvrem millepedum, nunc cum tantillo mercurii dulcis, nunc sine eo egregia quoque deprehendit. Extus etiam, si laudata emplastrum nihil efficient, spiritus modo commendati, vel aqua calcis spongia vel spleniis, vel lixivia e cineribus, præfertim ligni quercus, vel e sapone, aut sola, aut spiritu vini roborata, egregie subinde has aquas dissipant. Spiritus C. C. aut liquor C. C. sufficiens saepe illitus, itemque olea carminativa a nonnullis etiam valde commendantur, servata simul semper parca & apta dieta, abstinendo a crassis, crudis, flatulentis, &c.

XXXV.

Attamen si haec aliave medicamenta non satis proficiunt, quemadmodum *Caratio* *chirurgica*, hoc saepe fit in vera hydrocele, præfertim in adultis, & ægri a molesto hoc malo liberari desiderant, secundum divi Hippocratis præceptum, ad chirurgicas curationes, tanquam ad sacram anchoram, & medicorum & ægrotantium, est progrediendum; ubi vero mox monendum, quod duplex haec sit curatio, prout supra jam §. 31. innui, nimurum vel perfecta aut radicalis, vel imperfecta, quam palliativam etiam appellant. Duplex enim in hujus mali curatione medicorum scopus est, primo scilicet, ut humor noxious ex secrete emittatur sive removeatur, ac deinde, ut nova ejusdem in hoc collectio, (quæ alias facile fit, atque sic malum recrudescit,) prohibetur. Ad utrumque hunc scopum obtinendum curatio, quæ perfecta dicitur, maxime idonea est; verum per palliativam tantum liquor ille p. n. educitur, & malum raro sine reditus metu hac ipsa perfecte sanatur. Interea, quia tamen interdum sicut nonnulli scriptores referunt, malum tollit [h], ægris magis comoda minusque dolorifica est, promisusque perficiatur perfecta, haecque etiam desiderat, ut curandi per aliquot hebdomades non solum domi, verum etiam in lecto se contineant, atque perfecta etiam majores inferat doles, majorique periculo ægros, præfertim si chirurgus non rite procedat, nec prudentem medicum, cum ad avertenda, tum ad tollenda mala accidentia adhibet, aut curandus non satis apte se gerat, exponit, & palliativa longe facilis etiam, si malum recrudescit, absque adeo magno incommmodo aut dolore iterari semper potest, chirurgique etiam minus habiles facilis palliativam, quam radicalem perficere possunt, haud mirandum est, quod haec modo ab ægris, modo a chirurgis perfectæ, utpote molestiori, magis dolorificæ & periculosiori, saepe præferatur, quamvis & quandoque ab hac gravia mala observata sint [i]. Quare & nos hic primo palliativam hanc describemus.

Tom. III.

XX

XXXVI.

[g] In milc A. N. cur. dec. I. ann. IX. & X. obf. 158. item in ejus operibus p. 720.

[h] Ut *Maffierius*, *Sharpius*, aliqui cap. de hydrocele.[i] Videri hoc potest in *Sharpii* obseruat. chirurg. cap. de hydrocele, quamvis hic magnus hujus curationis patronus sit.

**Curatio
palliativa
quomodo
fiat.**

Antiquiores Chirurgi, ut ex Celsō, lib. 7. cap. 22. atque Fabricio ab A-
quap. in operat. chirurg. patet, scalpello scrotum inciderunt, aquam emi-
ferunt, & postea vulnus denuo glutinarunt, eaque ratione multos curatos
esse referunt. Verum hac ratione cavum plerumque non satis purgatur &
malum facile atque utplurimum reddit. Paulo recentiores, doloris forte mi-
nuendi gratia, scalpello phlebotomo Gallorum loco vulgaris, vulnusculum
parti scroti inferiori inflixerunt, atque vel per hoc foraminulum, vel me-
diante immisso tubulo plumbeo aut argenteo aquam contentam emiserunt,
*eaque emissā vulnusculum rursus glutinarunt. Nostra autem ætate *acus* sive*
**clavus* teres, apice triangula, fistula argentea aut ferrea aut orichalcea in-*
*clusus, quem Galli *Troicar* vocant, quique in Dn. *Præsidis* chirurgia tab.*
XXIV. fig. I. ad 4. aliisque variis recentioribus libris chirurgicis delineatus
est, aquam educendi scopo, longe commodius in hunc finem adhibetur:
quo ægro stanti vel in extrema alicujus sedilis parte considenti, pars scroti
inferior atque exterior caute, ne testiculus lœdatur, donec prementi chirur-
go nihil resistat, pertunditur, id quod ferramentum in cavum tumoris pe-
*nentrasse indicat: ubi simul sciendum, quod, *quia scroti tunicae hoc in malo**

sæpe valde & quidem ad transversi digiti latitudinem & quod accedit, incrassescunt, (vid. §. 32.) apex non nimis cito retrahendus est, quia alias tuni-
 cæ non perforatæ essent, & liquor non sequeretur. Verum si ferramentum in cavum usque scroti penetrasse certo percipitur, quod uti dixi, inde cognoscitur, si prementi nihil amplius resistit, vel aqua juxta tubulum immis-
 sum fig. 4. effluit, clavus, relicta fistula in scroto, retrahitur, ita aqua e-
 um mox sequitur: quæ, ubi omnis effluxit, scrotumque collapsum est,
 etiam e vulnere retrahitur, atque sic universum opus confectum est, ip-
 sumque vulnusculum sine emplastris aliisve medicamentis sponte utpluri-
 mum coit: imo *ipſi ægri etiam sine omni molestia statim plerumque rursus ambulare* atque negotia sua perficere *valent*. Verum quia post ejusmodi aque extractionem adeo simplicem, & præsentim duas ultimas recentiorum, ubi tam exigua vulnuscula fiunt, per quæ cavum mali purgari nequit, nec solet,
 scrotum plerumque brevi, aliquot scilicet hebdomadum vel mensium spa-
 tio, simili humore denuo impletur, malum exigit, ut ad molestiam a tumo-
 re isto removendam modo descripta curatio sibi iteretur, eaque eo magis,
 ne humor hic subsistens testiculum corrumpt. Quod igitur si rite perficiatur,
 ægri hocce malo infestati, sine adeo magna molestia sanescere possunt.
 Verum quia hic modus raro istos homines perfecte sanat, curatio hæc, ut
 sæpe jam diximus, *palliativa* & *imperfecta* a medicis appellatur. Quod si
 forte in effluxu humoris aliquid fistulam illam obstruat, specilio immisso hoc
 removendum est. Denique adhuc hic sciendum, quod si *humor effluens cras-*
sus aut turbidus, vel omnino fætidus sit, tempus esse videtur curationem per-
 fectam



fectam instituere, ne testiculus corruptis ejusmodi humoribus quoque corrupatur, vel omnino in *carcinoma* abeat.

XXXVII.

Quando igitur ejusmodi mala incident, vel ægri, præsertim juniores, alias ob causas omnino ab hydroceles molestis liberari & perfectam rursus sanitatem recuperare desiderant, *quintuplici ratione* hoc obtineri potest. *Primus curandi modus* est, ut æger in sedili sedeat, & a ministris, quantum opus esse videtur, probe firmetur. Deinde scrotum circa partem superiorem, ubi aqua continetur, scalpello usitatissimo chirurgico, qualis in D. *Præsidis* chirurg. tab. I. litt. G. vel I. repræsentatur, aliove idoneo, a latere inciditur, donec scalpellum in cavum, ubi humor p. n. hæret, penetravit; id quod ex humoris aquos effluxu cognoscitur [k]. Postea in hanc plagam immittitur specillum fulcatum, vel quod melius est, index manus sinistræ, si satis patet, atque juxta hujus vel illius ductum immittitur quoque vel scalpellum vel forfex idonea, vel etiam *novacula*, eisque totum fere scroti latus risque ad fundum aperitur, quo fit, ut non solum omnis humor p. n. penitus effluat, verum etiam medicus vel chirurgus observare recte possit, utrum forte in testiculo quoque, an alibi in scroto aliquod vitium sit, & secundum explorata postea ac reperta curatio tanto rectius continuari queat; quæ in junioribus & ubi malum non adeo diu duravit, fere sine omni periculo fieri potest. Si itaque testiculus *salvus* & nullum aliud grave vitium in scroto *deprehenditur*, mox solis linamentorum aridorum leniter contortorum fasciculis (quos *bourdonets* vulgo chirurgi appellant,) totum hydroceles cavum modice impletur, postea splenio contegitur & fascia firmatur. *Ante tertium diem* hanc deligationem D. *Præses* non solvit, & quando tunc illud facit, nihil illorum linamentorum vi evellit, sed tantum quicquid vel sponte excidit, aut facili negotio tollere potest; labia vulneris tunc unguento digestivo foventur, & novis fasciculis linamentorum carporum eodem unguento obductorum cavum denuo repletur, oraque conteguntur, siveque alternis diebus continuatur, donec priora linamenta omnia exciderunt, id quod saepe post plures demum dies fit, quo tempore totum scroti cavum simili ratione quotidie deligatur, ita *larga sequitur interioris tunice suppuration*, quæ, ut bona ejus purgatio & constans glutinatio sequi atque obtineri possit, hic valde necessaria est; nam ab hujus neglectu malum rediisse Dn. *Præses* aliquoties notavit. Interea tamen, ne scrotum nimis inflammetur, fomentum ex aqua calcis vive cum spiritus vini camphorati quarta parte, addita cerussa & pauxillo salis ammoniaci, superimponatur, non neglectis medicamentis internis, inflammationem & febrem vulnerarium nimis vehementem avertentibus.

X x 2

XXXVIII.

[k] Multi pungendo aperint scrotum. Rectius vero cum Dn. *Præside* hoc secundo fieri existimo: quia sic non tam facile vel testiculus vel vasa spermatica laeduntur.



XXXVIII.

Cautiones
circa
membra-
nas valde
craffas.

Quando autem *interiores istae membranae nimis crassae nimisque induratae reperuntur*, quemadmodum plerumque in malis inveteratis, ut supra §. 32. a nobis dictum est, esse solent, unguentum digestivum solum iis exedendis & destruendis saepius non sufficit, facies interior earum aut bene *scalpello*, cavendo testiculi laesionem, *scarificetur*, aut *mercurius precipitatus ruber*, una cum alumine usque iis subinde inspurgatur, vel una cum unguento digestivo modica quantitate commisceatur, donec tota munda ac carne rubra contesta conspicatur, ubi balsamo vulnerario tandem glutinatio procuretur. Quodsi inter mundificandum *corpuscida adipi similia*, ut haud raro fit, in membrana interiori conspiciantur, vel forfice simul & semel, vel praedictis rodentibus sensim sunt auferenda.

XXXIX.

Cautiones
adhuc
aliae.

Quod si forte deoperto scroto *vasa seminalia* ad partem testiculi superiorem valde tumefacta deprehendantur, quidam suaserunt, ut *testiculus hic tanquam corruptus, mox resecetur*. Verum hos minime imitari convenit; quoniam haec, postquam ab onere isto aquae liberata sunt, & praedicto foemento §. XXXVII. foventur, vel etiam sponte, sicut ut plurimum sit, rursus detumescent, & ad statum naturalem redeunt. Quod si vero *haec vasa via* *cum testiculo valde induruerint* ac dolent, atque carcinoma minitantur, *excindendus est*, sicut hac de re infra mox uberiorius acturus sum. Ita si *testiculus*, scroto aperto & humore evacuato, *juxta tunidior deprehendatur*, digitis probe explorandum, *utrum scirri duritatem affunserit*, an fluctuans quedam materia, ut quandoque etiam in eo sub tunica nervea deprehenditur, ibidem sentiatur. Si prius est, ejus curatio infra dabitur; sin vero posterius, *testiculus* quoque non pro omnino corrupto, ut quidam fecerunt, mox est habendus, & ut varii suaserunt, *extirpandus*; sed potius scalpello in loco aptissimo est *aperiendus*, humor noxious *emitendus*, unguento digestivo purgandus & balsamo postea consolidandus, ita saepe rursus sanescit, & officio suo imposterum fungi potest. Sed si omnino corruptus deprehenderetur, ut inutile corpus, unde nova mala essent metuenda, prout farcocele extirpari potest. Atque hanc primam methodum plerique recentiores scriptores, *Shapiro* excepto [1], commendant ceterisque preferunt.

XL.

Alter cu-
randi mo-
dus per
rodentia.

Quoniam vero multi *aegri scalpellum nimis pertimescant*, eique se vel pror-

fus

[1] Hic, ut suam sententiam tueatur, varia exempla recenset, ubi huic operationi, forte ob non satis apte institutam curationem, gravia mala inciderunt; interea tamen omnes isti aegri, quos in exemplum adducit, convaluerunt.



Et non, vel saltem maximo cum metu & mortis fere terrore se submittunt, quorum vis tanta est, si veteribus atque cel. Winslovio credimus, qui ægrum præ metu ante calculi excisionem mortuum esse asseverat [m], alteram methodum in horum commodum prudentiores chirurgi excogitarunt, qua nempe apto medicamento rodeute, sive ut græco vocabulo indicari solet, caustico, scrotum hydrocele conflitatum quam commodissime aperiri, & liquor peregrinus emitti potest. Atque hac ratione Dn. Praeses non solum & adultos & senes, verum etiam superiori adhuc æstate juvenem, qui occasio nem mihi ad hanc dissertationem conscribendam dedit, me multisque aliis medicinæ Studioſis, aliisque variis hominibus praesentibus, tanquam tot testibus, perfecte inde curavit.

XL I.

Juvenis nimurum erat ex Principatu Anhaltino, sedecim annos natus, cæterum satis sanus, quem parentes huc ad D. Praesidem ab ejusmodi hernia, qua jam per plures menses laboraverat, ut ipsum sanaret, miserunt. Magnitudo herniae ovum gallinaceum majus superabat, & in figura I. nostra in lateri scroti dextro [n], sed ob tabulæ parvitatem minor multo, quam erat, exhibetur. Hunc vero juvenem non mox, ut inimici ejus aut ignari saepe calumniantur, scalpello sive cruentæ curationi submisit, verum quia ægri, & praesertim juvenes, cæterum fani, saepe medicamentis adhuc ab hoc malo liberantur, prius optima quæque tentare, qualia §. XXXIV. commendata sunt, atque effectum eorum experiri voluit. Postquam vero hic æger per hebdomades quatuor una cum modica diæta iis usus est, ea vero nihil quicquam, ut saepe in obstinatissimo hoc morbo fieri solet, proficere voluerunt, parentes vero eo ob negotia diutius carere non potuerunt, ipsis itemque affinibus & ægro significavit, vix a remedis hic auxilium sperandum esse, quia tamdiu haec tenus frustra adhibita fuerunt; verum ad chirurgicam curationem, si liberari ab hoc malo vellet, nunc progrediendum esse, dixit. Cum itaque huic consilio morem gererent, die quarta Augusti hujus anni, sequenti modo, per rodens medicamentum curationem inchoavit.

Historia
morbi.

XL II.

[m] Vid. Dn. Praesidis chirurgicæ instit. cap. 143. §. 13.

[n] *Hildamus* Cent. IV. obs. 64. & *Palinius* cap. de Sarcocele p. 163. volunt, sarcocelen plerumque in dextro, & hydrocelen in sinistro observari latere. Verum *Ulbornius* in notis chirurgicæ D. Praesidis belgicæ adjectis, scribit, *Sarcocelum non in sinistro, & hydrocelum non in dextro latere oriri*, p. 943. atque ex latere certam harum distinctionem docere vult. Imo adhuc addit, *Si forte hydrocele aliquando in dextro latere adsit, certo sarcocelum simul adesse*, adeoque monet, ut cautissimi hic simus in aqua lateris dextri per acum educenda. Verum hoc vanum esse, non solum *bic noster casus docet*, sed D. Praesidis etiam has hernias, sicuti enterocelen, modo in hoc, modo in illo latere vidit & curavit.

X x 3



2. Curatio **Nimirum emplastrum** tres circiter pollices longum & duos latum, foramine duos pollices longo, quod digiti latitudinem habuit, externo sive dextro scroti hujus lateri, dum æger in lecto decumbebat, agglutinavit, ita, ut per foramen ejus, spatum litt. E. F. in fig. I. indicatum, conspicu potuerit. Huic alterum simile emplastrum superimposuit, ut oræ foraminis altiores redderentur, ne rodens medicamentum huic spatio imponendum, ex eo facile decideret, eique deinde horis matutinis hoc medicamentum in tanta copia immisit, quam sufficere judicavit, pro tegumentis scroti communibus omnibus, & ex parte etiam specialibus, *ad tunicam scilicet vaginalem usque erodendi*; illud linamentis carptis & emplastro integrō præcedentibus paulo majore, tegit, splenium superimposuit, & fascia quatuor frondibus firmavit, ægrumque ut per aliquot horas strenue quietat, jussit. Horis sex septemve elapsis, ægrum sedili imposuit, ligaturam solvit, splenium & emplastra removit, medicamentumque, quantum sat est, partes perforandas erosisse, invenit, ita, ut si inciderentur, nullum amplius sanguinem funderent, ægerque nullum a perforatione sive sectione dolorem perciperet. Itaque partem erosam primo circa medium, ubi in fig. I. litt. B. posita est, scalpello obtuso, incidit, & immisso postea digito, vulnus sursum & deorsum, ad litt. E. & F. ampliavit, ita *liquoris glutinosi, albicanis, albo ovarum fere similis*, quantitas trium quasi unciarum effluxit. Cavum vulneris in quo, ut in fig. II. litt. G. H. indicatur, testiculus litt. I. conspicu poterat, linamentis carptis probe replevit, illudque postea ita deligavit & tractavit, ut in præcedentibus modo §is XXXVI ad XXXVII. dictum est, atque sic illud sex hebdomadum spatio, sine gravibus supervenientibus symptomatis, nisi quod prima hebdomade febricula aliqua, diætæ tamen aliquo magis errore, quam vulneris culpa, supervenerit, quæ tamen sine venæctione, solis medicamentis calorem p. n. temperantibus, brevi rursus profligata est.

X L I I I.

Hicmodus **Garengot**, quem *Sharpius* in operat. suis chirurg. & *Faius* in notis ad *Dionisium* sequuntur, *rodentium medicamentorum usum* in hoc morbo rejicit, atque ab his multa mala pertimescit: quia putat, hæc medicamenta in scroti cavum intrare, ibidemque testiculum arrodere, imo destruere &c. Verum omnes hi scriptores hic non ab experientia sive ex usu loqui, dum nullus exempla, aut observationes hoc probantes adducit, sed se invicem tantum sine experientia hac in re sequi mihi videntur. Nam certum est, illud quod metuunt, neque in hoc, quem recensui casu §. XLI. & XLII. *neque in nullo alio ægro, quorum tamen plures*, & inter hos etiam magnates & nobiles



biles ab hoc morbo hac ratione liberavit, *contigisse*, quippe quibus nihil mali, neque in testiculo, nec alibi in corpore ab his remediis illatum est. *E* si quid forte adversi quibusdam chirurgis hic acciderit, profecto id non medicamentis his, sed potius incauto, vel perverso eorum usu factum esse censeo, atque sic huic mala, quae forte contigerunt, adscribenda esse existimo. Nam si rodens ita dirigitur, ut non in cavum usque scroti partes exedat, sed in tunica vaginali subsistat, id quod prudenti usu fieri potest, testiculo etiam nihil nocere potest. Imo si etiam aliquando forte fortuna contingere, ut & hanc eroderet, liquor tunc impetu quasi erumpens medicamentum rodens repellat, aut si quid forte etiam incideret, primo jam vis ejus rodens in exedenda cute, pinguedine, membrana darto, & tandem valde crassa hic plerumque tunica vaginali, ut §. XXXII & XXXVIII. indicavimus, in his ægris jam valde imminuta aut destructa est, & deinde, si tantillum etiam cum liquore intus hærente commisceretur, partim ab eo uberioris temperatur, partim cum eo rursus effluit, ita, ut vix ulla lœsio in testiculo inde sit metuenda, nisi quis quam imprudentissime procedat, & in rodentis copia excedat. Nam D. *Præses in recto usu*, *E* in hoc *E* aliis, nihil quicquam mali inde vidit, & cum eo etiam præstantissimus ille chirurgus Anglus *Joh. Douglas* consentit, qui in syllabo operat. chirurgicar. pag. mihi 39. aperte causticum sectioni, purgationi *E* setaceo præfert.

XLIV.

Tertius modus, quo perfectam hydroceles curationem quæsiverunt medici, est *setaceum*: quando nimirum acus, setaceis alias excitandis destituta, (quæ videri potest in *D. Præsidis chirurgia* tab. 18. fig. 12.) linoleum digitæ latitudine & pedis circiter longitudine trahens, in latere scroti externo, ut verbi gratia in figura nostra I. ad litt. E. sic infigeretur, ut juxta litt. F. rursus egredetur, cavendo ne testiculus aut vasa spermatica ea lædantur, quemadmodum etiam *Sculptetus* hoc figura illustravit in *Armam. chirurg. Tab. XL. fig. I.* licet de alio malo ibidem, quam de hydrocele agat, qua acu linoleum a scroti parte superiori ad inferiorem per cavum, ubi aqua hæret, inducitur, quod in eo relinquitur, & quotidie inuncto digestivo unguento, sicut in setaceo cervicis, hinc inde sursum ac deorsum commovetur, ita enim non solum humor vitiosus inde sensim educitur, verum etiam suppuratio ejus ope intus in scroto excitatur, qua, si per aliquot hebdomades, donec scilicet nihil vitiosi humoris amplius profluit, conservatur, & subinde digestivo aliquid mercurii præcipitati rubri, cum alumine usto admiscetur, ita partes noxiæ inde expurgantur, ut constans curatio inde sèpius secuta sit; postquam extracto tandem rursus linoleo, utraque vulnuscula balsamo vulnerario glutinantur. Verum quia hac in methodo testiculus primo lœdi potest, *E* deinde intro inspicere, &

3. Curatio
per seta-
ceum.

recte



recte scire non possumus, an carum scroti sic satis sit purgatum, itemque utrum testiculus satis sanus sit, an vitium aliquot in eo lateat, ea ceteris, me judice, merito postponenda: quia hæc curatio valde est incerta, atque post eam, ne malum recrudescat, semper metuendum.

XLV.

Quarta
methodus
Ruyshchi &
Marini.

Quarta methodus Ruyshiana dici potest, qui in Advers. Anatomi. Dec. II. p. 22. ait. Si curationem (hydroceles) aggredieris, aperiendo scrotum in parte superiore ad latus, tumque vulnus turunda oblonga, unguento rosaceo, mercurio precipitato rubro permisto, inuncta oppleveris, donec lenis inflammatio, eique succedens suppuratio parva, membranulas fillantes putreficerit, tuque eas tenaculo eduxeris, sepe deinde perfecte sanatas observavi. Cum hac curandi ratione convenit fere ea, quam Marinus poltea, unus ex recentioribus chirurgis italis haud adeo pridem, tanquam usitatissimam, ut dicit, (*sed forte in Italia non in Germania, neque in Gallia aut Magna Britania*) descriptis, ceterisque omnibus prætulit. „Nimirum, præparato prius corpore, scrotum mox sub inguine, in parte scilicet ejus superiore, sicut Ruyshius incidit, ea magnitudine, ut per plagam digitus & postea turunda digitii crassitudine, & trium digitorum transversorum longitudine, ex cera facta, immitti queat, cujus apex, ut ait, paululum incurvata sit. Hæc unguento dialthæ inungitur, & per plagam cavo scroti immittitur; ubi, postquam per XXIV. horas relinquitur, pars inflammatæ reperiatur. Aqua non evacuatur, sed turunda sensim brevior efficitur, prout scilicet cavum minuitur; tumor vero emplastro emolliente digeritur. Quando suppuratio bene succedit, turunda unguento digestivo imbuitur, in scrotum vero unguentum rosatum immittitur. Septem diebus præterlapsis turunda oleo hyperici composito inungitur, sinus bene purgatur, & tumore resoluto vulnus sensim minuitur, carne impletur, & tandem turunda tollitur, servataque diæta vulnus glutinatur. Patet ex his Marinum in rebus præcipuis sive essentialibus, ut aiunt, a Ruyshio vix differre, nisi quod medicamenta forte præter necessitatem multiplicet & quod præcipiat, ne curatio hæc scorpione dominante suscipiatur, quia hoc curationem valde protraheret. Verum ad signa celestia in curationibus respicere velle, hodie ridiculum, superstitiosum & medico genuino indignum, merito a prudentibus habetur, idque eo magis, quia Dn. Præses ante biennium demum, virum in hoc ipso scorponis signo ab isto malo, æquali temporis spatio, quo aliis temporibus sive signis alii curantur, perfecte restituit. Verum circa hanc methodum adhuc monendum, quod quidem, uti testiculus adhuc salvis, ut plurimum bene succedat; sed si vitium in testiculo subesse suspicamur, vel certo adesse antea scimus, primam vel alteram, §. 37. ad 40. descriptam, huic præferendam esse censeo.

XLVI.



XLVI.

Circumforanei nostri Chirurgi radicalem hydroceles curationem sequenti ratione, sed pessimo consilio, perficiunt. Nimirum inguen & scrotum superimum eodem modo, ac si enterocelen vel sarcocelen secando curare vellent, incident, peritonaei processum digitis querunt, eumque a vicinis liberant; postea & tunicam vaginalem, in qua haec hernia una cum testiculo, sive fanus hic sit, sive corruptus, e scroto & quidem saepe admodum rudi & dolorifico modo evellunt; processum peritonaei funiculo firmiter ligant & constringunt, atque sub ligatura facta totum rescindunt. Quidam ligaturam processum peritonaei jam injiciunt, antequam testiculum evellunt, quod fere perinde est. Verum, hunc agyrtarum curandi modum, quia histriones illi pessimi praeter necessitatem aegros non solum evellendo testiculum crudeliter tractant, eoque ipso convulsiones & mortem saepe aegris inducunt; vel saltem, si morti se subducunt, testiculo bono, parte ad generationem adeo necessaria, quae servari potuisset, privant, in simplici & ordinaria hydrocele prorsus rejiciendum esse censeo: conferri potest Hildani cent. IV. obs. 68. qui periculum hujus curationis satis probavit.

Quintus
curationis
perfectæ
modus.

XLVII.

Sed si hydrocele cum sarcocoele, sive testiculo in scirrum corrupto, combinata, vel testiculus alia ratione, ut putredine vel ulcere mali moris corruptus effet, tunc omnino haecce methodus, quamvis paululum emendata, recte adhibetur, ut sic hac ratione & testiculus vitiatus & tunica vaginalis, quæ sedes est hydroceles, & forte quoque organum secretionis humoris vitiosi, simul tollantur; quo vero in casu prudens chirurgus blandiori, securiori & minus crudeli modo, quam rudes illi circumforanei agunt, procedere potest: nimirum non vi evellendo tunicam vaginalem cum testiculo, a tunica darto, & lacerando partes annexas, valde sensiles & nervosas, quæ evulsio vehementissimos dolores & facile inde sequentes convulsiones ac mortem concitat; sed potius, majore scroto incisione, & deinde cauta tunicae vaginalis a scroto per scalpellum & forcipem separatione, qua dolores inducuntur minores, & sic etiam leviora utplurimum sequuntur symptomata, atque curatio sic facilis, certius ac citius obtinetur.

Hydroscar-
coceles
curatio.

XLVIII.

Denique adhuc monendum, quod maxima semper cautione opus sit, ne Monita forte hernia scrotri intestinalis sive enterocelle pro hydrocele habeatur, & pro quædam. hac scalpello incidatur: quia sic intestina imprudenter facile discinderentur,

Tom. III.

Y y &



& ægri ex imprudentia ejusmodi chirurgi interficerentur. Præterea ne curatio perfecta facile in senibus decrepitis, aut alias valde debilibus instituantur; quia in his symptomata supervenire possunt, quibus æger interimitur. Adeoque suadeo, ut in his chirurgi malum vel intactum relinquant, quia multi cum ejusmodi herniis ad magnam senectutem perveniunt, vel ut solum cura palliativa per intervalla eos tractent, quo ad tempus a molestiis nimis magnæ hydroceles eos liberent, atque negotia sua promptius peragere possint. Ita enim Ulhorius vito nonagenario, ut scribit, aquam hoc modo feliciter, trium mensurarum pondere, acu cannulata eduxit, loco cit. p. 944. sic in pueris etiam haud facile curatio perfecta est instituenda; eaque omnium minime cum testiculi extirpatione, ut agyrtae sepius facere solent; quia palliativa eis sèpe sufficit, eaque haud raro curantur.

XLIX.

Curatio
hydroce-
les in pro-
cessu peri-
tonæi.

Tandem etiam de ea hydroceles speciei curatione, que secundum nominis supra illud septum transversum tunice vaginalis, in processu peritonæi, juxta inguina, hæret, quamvis a Dn. Preside nondum sit visa, & a recenti supra citato chirurgo Anglo Sharpio nimirum, ut alias jam dixi, (p. 25.) prorsus negetur, verbum addam. Scilicet, si hanc speciem hydroceles certo adeisse cognoscimus, atque evacuantibus ac resolventibus supra §. XXXIV. laudatis, cedere recusat, incidi eo in loco debet, ubi humor p. n. hæret, & per factum vulnus emitti, locus vacuus postea, sicut de tunica vaginali purganda supra §. 37. & 38. diximus, mundari & postea glutinari. Verum hic rursus, prout §. 48. docuimus, quam maxime est prospiciendum, ne bubonocele sive hernia intestinalis in inguine hærens, loco ejusmodi hydroceles incidatur aut acus punctura aperiatur, ob periculum & rationes ibidem modo indicatas.

L.

Si aqua in
pluribus
cellulis.

Postremo si hydroceles materia in diversis cellulis continetur, prout Palfinus in chirurgia, cap. de hydrocele, aliique se vidisse scriperunt, sic, ut una aperta tantum pars ejus effluat, cæteræ vero ab humore distentæ maneant, hæ quoque seorsim sint aperienda, donec omnes depletæ sint; hunc vero in finem Palfinus medicamentum rodens ferro præfert: quia illo omnes cellulæ, ut existimat, simul aperirentur [o]. Aut, si, ut Fajus

[o] Si pluribus in cellulis hydrocele hæret, morbus hic forte magis erit in tunica, que cellularis vocatur, quam in tunica vaginali: quia haud manifestum est, quomodo in vaginali, quæ unicum tantum cavum habet, plures cellulæ esse possint, & nullus adhuc ejusmodi cellulas ex cadaveribus incisis probavit.



Faustus tradit, aqua tam infra, quam supra septum illud processus peritonei transversum collecta sit, tam tunicam vaginalem in scroto, quam processum peritonei in inguine aperiendum esse docet l. c. p. 395. Verum quia de purgatione horum locorum nihil dicit, curationem tantum docet palliativam. Itaque si radicalis desideratur, non solum erunt aperienda, sed etiam purganda, atque tunc demum rursus consolidanda, observatis probe illis cautionibus, quas §. XLVIII. circa incisionem herniarum aquosarum dedimus. Quodsi rupto claustro illo processus peritonei, tam hic, quem vaginalis tunica repleta sit aqua, unica quidem punctura circa partem inferiorem tota cavitas, ut Faustus ait, evacuari potest; sed cum quoque de perfecta curatione taceat, totum carnium aperiendum atque purgandum esse, ut in vulgari hydrocele, existimo. Atque haec optima mihi esse videntur, quæ de hisce herniis hodie optimis medicis atque chirurgis sunt perspecta.

F I N I S.

Y y 2

D I S-

DISSE



(356)



DISSE-



Landesbibliothek Oldenburg

L X X V I

D I S S E R T A T I O
M E D I C O - C H I R U R G I C A ,
D E S A R C O C E L E .

Quam Praeside

D. D. L A U R. H E I S T E R,

Tuebatur

C H R I S T I A N . D A N I E L H E I S E ,

O B I S F E L D A - M A G D E B U R G E N S I S

Helmstad. 15 Junii anno 1754.

Y y 3

