

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Disputationes Chirurgicæ Selectæ**

**Haller, Albrecht von**

**Lausannæ, MDCCCLVI.**

**VD18 90538986**

CXXXII. Dissertatio Chirurgica, De Arteriae Cruralis Vulnera Periculosissimo  
Feliciter Sanato.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-16618**

C XXXII.

DISSERTATIO  
*CHIRURGICA,*  
DE  
ARTERIÆ CRURALIS VULNERE  
PERICULOSISSIMO FELICITER SANATO.

*Praefide*

LAURENTIO HEISTERO.

*Proponebat*

JOAN. ANDREAS REINIG

*MAGDEBURGENSIS.*

Helmstad. 22 Decemb. 1741.

R 2



Landesbibliothek Oldenburg



## P R O O E M I U M.

## B E N E V O L E L E C T O R.

**A**ccedente temporum illa periodo, qua literarum meartim moderatores, more consueto, absoluto studiorum curriculo, me privilegia ac honores doctorales capere admonerent, de argumento quodam pro inaugurali disputatione cogitanti mihi nūl tum animus obloquebatur. Anceps enim erat atque dubius, imo nescius, quānam illa foret materia, quā pro hoc scopo obtinendo esset idonea atque sufficeret. Cum animus itaque modo hinc, modo inde volveretur, factum est, ut casus quidam chirurgicus gravissimus & notatus, ut mihi saltem videtur, haud indignus, quem superiori vere una cum aliis commilitonibus ab Excell. Domino Pre-fide curatum, hac in urbe vidi, *de arteria nimirum cruralis vulnera gravissimo atque periculosissimo*, mihi prae aliis arrideret. Quod argumentum igitur eo lubentius illustrandum atque de eo disputandum elegi, quo magis, à natura quasi, me ad chirurgiam, partem illam medicinæ antiquissimam atque præstantissimam ferri, viderem. Scio equidem, fore permultos, qui mihi obganniant, dari adhuc quam plurima alia themata, hoc longe præclariora, imo inauguralis argumenti loco, casum potius medicum quam chirurgicum, quia summos in medicina honores ambio, præstissem. At quis est, qui non videat, hos ex eorum esse censu, qui nobilis artis chirurgicæ contentores, imo juratos quasi hostes se profiterunt, & qui putant nullum aut saltem perquam exiguum chirurgiæ in medicina usum esse, aut chirurgiam medico indignam, atque ad chirurgos curationes chirurgicas esse relegandas. At hinc illa labes, hinc tot acerbæ multorum lacrymæ, qui, cum ab ejusmodi medicis, in chirurgia hospitibus, salutem sperare non licet, tandem ad rudes tonsores, balneatores, histriones, imo ipsos sēpe carnifices configiunt; à quibus vero m̄trum in modum sēpius ejusmodi miseri excruciant atque peiores sēpe, quam antea fuerunt, derelinqui solent. Et qui, quæso, hoc aliter fieri potest? ejusmodi enim homines, texturæ ac fabricæ corporis humani utplurimum prorsus rudes atque ignari, partes lœsas nullo modo legitime possunt restituere, quarum structuram, compositionem ac naturam nesciunt. Neque prudentes illud ab iis desiderare jure possunt: quippe quibus utplurimum institutio & discendi occasio, sēpe sumptus, sēpe ingenii vires defunt, ut hæc acquirant, quæ ad chirurgum genuinum, qualē nos volumus, constituendum efformandumque, sumopere sunt necessaria. Non illum enim chirurgum hic intelligimus, quem rudis quædam empiria, levia imo levissima quædam vulnera curare condocuit,

R 3

quem



quemque in aliis rebus ad chirurgiam pertinentibus, ubique cœcutientem deprehendimus; sed illum potius chirurgum appellandum esse putamus, qui in difficilioribus casibus chirurgicis, imo in ipsis, qui vita jacturam minantur, (si ullo adhuc modo sanari possunt) ea remedia easque curationes, quæ manu sunt, prudenti consilio atque manu adhibet, quibus æger, miserrime sepe vexatus, imo morti quam proximus, conservari potest. Quod difficilis hæc omnino res sit & arduum opus, singulari tamen etiam cum honore conjunctum, qu'vis studio medico atque chirurgico modo leviter imbutus, sepositis præjudicatis opinionibus, facile viderit. Non enim cum illis medicis sentio, qui nobilissimam hanc artem generique humano quam maxime proficiam, contemnendo imo convitiis afficiendo, omnibus ejus genuinis cultoribus, sine ratione sufficiente maculam incurunt turpisissimam [a]. Neque cum illis mihi res est, qui temere asseverant, quod medicus non debet esse chirurgus. Non cum illis, qui chirurgiae usum in medicina denegant; hos enim ego omnes, ut pro genuinis *Æsculapii* aut *Hippocratis* filiis declararem, impetrare à me nullo modo possum. Provoco potius ad eos, quibus e meliori luto fixit præcordia Titan, sanioribus mediis principiis imbutos, quibus datum est discernere pondera rerum; hos omnes in meam sententiam transisturos esse confido [b]. Quorum igitur innexus autoritate & judicio, contumelias eorum, qui præsentia legent, facile feram, imo honori mihi tribuam, quod hac in re, multorum celeberrimorum virorum fatum & me maneat. Non habeo vero quod verear! nam res mea ipsa loquitur, artisque hujus præstantia se ipsam satis manifestat atque defendit; imo e longinquo quasi eorum audio applausus, qui ope nobilissimæ hujus scientie, à viris in hac arte peritis, e mortis fauibus erexit, adhuc dum vivunt. Exempla talia e longinquo accersere atque studiose colligere non opus est; cum præter casum, quem antea jam indicavi, hoc & præcedenti anno varios hic vidimus notatu dignissimos, ex quibus vero nunc tantum unicus, ut afferatur, sufficiat, ubi ipse Dom. *Praeses* virum quendam satis honoratum, superiori æstate in integrum restituit, cui in collo tumor erat ingens, peculiaris naturæ, & totam anteriorem colli partem ambiens, quo jam ab octo circiter annis æger se vexatum senferat; qui vero tandem ita auctus est, ut vix amplius deglutire & respirare potuerit, adeoque fere confectus fuerat, ut suffocari sibi videretur. Nonne exempla hæc artis chirurgicæ valorem ac præstantiam satis indicant? nonne clare evincunt, quod chirurgia sepe efficac, quod medicina negat? Ipso enim cum multis aliis commilitonibus harum curationum sive operationum periculosisimarum testis fui oculatus, ipse vidi, quod medicamenta sola,

cen-

[a] Ita fere sentire videtur Gualterus *Harris* in dissert. suis medicis & chirurgicis variis in locis.

[b] Vid. graves ejusmodi autores in Excell. Dn. *Præsidis* instit. chirurg. pag. 10. & seq.



centies adhibita, ut & ipsa cura, quam *Sympatheticam* dicunt, & quam multi egregii viri, dum medicamenta omnia frustra adhibuerant, in hoc casu ultimo summopere laudaverant, nihil effecerunt, sed brevi ægrum certe mori tradidissent, nisi manu chirurgica servatus esset. Video ex his omnibus resutare, quod una pars medicinæ alteri manum præbeat, quod chirurgia ac medicina à se invicem separari nequeant, sed comites esse debeant individuae, si alias medicus ac chirurgus suo munere rite volunt defungi. Taceant itaque chirurgiæ osores & calumniatores; taceant, qui studium hoc nobilissimum vilipendunt aut contemnunt, illudque medico indignum esse clamant. Hæc sunt ea, Lector Benevole, quæ animum mihi addiderunt, ut argumentum chirurgicum pro disputatione inaugurali elegerim; atque id quidem, quod in hac musarum Julia, in cive quodam honesto contigisse, ipse vidi. Det modo D. T. O. M. ut hæc studiorum meorum prima conamina in sui laudem & ægrorum emolumen-tum cedant. Tu vero B. L. mendas, si quæ forte irrepserint, censorio superciliosim nimis rigide perstringere noli, me, data occasione, æqualia humanitatis officia præstirum esse, ut certo tibi certius persuadeas, est, quod enixe oro atque rogito, vale ac fave.

## C. A. S. U. S.

## I.

**S**Utot quam ex primariis hic Helmstädtii, die 14 Maii hujus anni, tempore matutino, hora circiter septima, cultro quodam acuto, qualis plerumque ad calceos conficiendos, coriumque exscindendum atque adaptandum uti solent hi artifices, malo fato arteriam cruralem in femore dextri pedis, amplio satis vulnere, graviter se vulnerat, id quod sequente modo contingebat. Sedebat in sella, atque in calceo quodam perficiendo sive exasciendo occupatus, forte fortuna culter iste ipse manu excidit, genibus vero fortiter adductis eundo subito excipere satagens, id quod homines in ejusmodi casibus plerumque facere solent, manubrium cultri, qui transversam acquisiverat posituram, in sinistri femoris partem inferiorem impingit; cuspis vero acuta dextri femoris interiorem partem respiciebat, quam itaque ea contractionis genuum vi ac impetu, mala fortuna, ita in femur dextrum, ad sex circiter digitos transversos supra genu impellebat, ut arteria cruralis, sive rectius *femoralis*, hoc ipso secundum lineam rectam, (vid. figuram nostram I. litt. A.) graviter vulneretur. Factum enim est statim, ut ingens sanguinis copia, sicut in omnibus majorum arteriarum lassionibus accidere solet, ex hoc vulnera cum impetu mox profiliret.

## I.



## I I.

Vulneratus satis intrepidus, partim ipse, partim præsentes & adstantes ejus domestici, quum id viderent, concurrentes ægroque subsidio venientes, vulnus partim digitis, partim linteis comprimere, sanguinisque profluviū vehemens cohībere tentant ac student, non putantes, quod vulnus hoc adeo grave ac pericolosum esset; cum vero illud non poīsent, & æger jam ex magna sanguinis profusione valde debilitaretur, de salute sua sollicitus, chirurgum legionis militum primarium, qui non adeo remote à vulnerato degebat, advocari curat, compreßo interim vulnerē, quantum poterant. Qui cum veniret, vulnus adhuc multum sanguinis fundebat, id quod linteamentis carptis, liquore quodam styptico imbutis, itemque *lycoperdo*, quod *bovis* vulgo appellant chirurgi, probe replebat superimpositis splenii variis, ea spē, fore, ut sanguinis profluviū ita cohīberi queat.

## I I I.

Cum vero hoc non sufficere videret, dum sanguis hæc omnia, licet digitis ea comprimeret, larga adhuc copia penetraret, chirurgus hic se n̄ex & satis expertus, alios adhuc in auxilium vocari desideravit; præfertim cum ægrum sensim valte languescere consiperet, & mortis periculum satis inde agnosceret. Vocabatur itaque ex ædibus *Ill. Dn. Præsidis* Studiosus quidam medicinæ ac chirurgiæ veteranus & probe exercitatus *Wagenerus*, amicus meus conjunctissimus, qui, cum ex nuncio locum vulneris & gravitatem profusionis sanguinis intelligeret, *machinam tortilēt*, vulgo *toreular* sive *tourniquet*, dictam, & speciatim eam à *Dm. Præside* correctim [c], cum ceteris ad hanc rem requisitis necessariis mox secum fert, atque ad ægrum adveniens, arteriam cruralem laſam esse, ex loco vulneris & ingenti copia sanguinis, quam in terram jam profusam conspiciebat, & qui adhuc fluebat, neque chirorgi castrensis compressione penitus cohīberi poterat, haud sine ratione iudicabat.

## I V.

Præ omnibus igitur, dum chirurgus castrensis os vulneris linamentis & digitis, quantum poterat, comprimebat, torcular indicatum, præstittimum atque divinum in his malis remedium, femoris parti superiori admovebat. Vid. fig. I. Litt. B. C. imposta scilicet fascia convoluta & craffa, loco B, ubi truncus hujus arteriæ femoralis situs est, & circumducto idoneo splenio clausoque cingulo B C, torcular ad locum C, sive exte-

[c] Vid. ejus, Institut. chirurg. Tab. V. fig. 6.



exteriore femoris parte, supposito & huic splenio crasso, trochlea stringebat, donec in vulnere sanguinis profluvium cessaret.

## V.

Cum vero & hic, dum casum ejusmodi nondum vidisset, & multa adhuc agenda superesse probe cognosceret, viribusque suis, ut prudentis junioris medici & chirurgi est, in re tam ardua & periculi adhuc plenissima, non satis consideret, prudentiorem magis in his rebus expertum virum ac nominatim *Exc. Dn. Präsidem* adhuc advocandum esse ægro uxori & amicis ægri mox suadebat, qui eum etiam cito advocandum curarent.

## VI.

Hic etiam, cum una cum aliis Studiosis medicinæ, mox advenisset, & torcular rite adhibitum esse vidisset, hoc nondum sufficere dixit, sed præmisso prognostico de curationis summa difficultate atque eventu dubio, aptum vulnus hoc arteriæ periculosissimum deligandi modum se primum ad vitam & pœdem ægri servandum adhibitum esse, ait, qui si feliciter succederet, ut spes ipsi adhuc superesset, bene pro ægro esse; e contrario, si ille, laxato, quantum satis est, torculari, non succederet, & sanguinis profluvium hoc non cohiberi queat, vulnus incidendum arteriamque læsam quærerendam & circumducto filo supra vulnus constringendum sive ligandam esse, imo si forte non nisi unicus arteriæ cruralis trunca hoc in femore adesset, sicut sepe observari solet, subinde ne ligaturam quidem arteriæ læsæ ad sanandum hoc malum sufficere, quia tunc partes infra ligaturam positaæ, ob sanguinis arteriosi hac ipsa sublatum influxum, sphacelo rupri solent, ita ut æger tunc sine ablato crure summoque vitæ discrimine servari non possit.

## VII.

Interea tamen se blandiorem & meliorem, qui apta deligatione se modum primum tentaturum esse promisit, cum spes ipsi esset, eum una cum prudenti torcularis usi hic succedere posse: quia scalpellum arteriam forte non transverse divisisset, aut omnino inferiore arteriæ partem à superiori resecuisset, sed secundum longitudinem tantum incidisset, que læsio faciliorem curationem admitteret.

## VIII.

Itaque vulnera, linamentis carptis ac probe contortis, alchohole vini bene imbutis, repleto, lycoperdum, his superimposuit, super hoc splenia Tom. V. S tria



tria crassa, gradatim majora, quorum primum longitudinem vulneris paulo superabat; alterum hoc rursus paululum majus, tertium vero rursus hoc alterum magnitudine superabat, eaque chirurgo firmiter continenda, committebat.

## I X.

Postea *splenium longum angustum*, & duos digitos *crassum*, ea longitudo, ut fig. I. a litt. A. ad B. se extenderit, ei tractui femoris interiore, qui hic punctulis D D. indicatur, ubi truncus arteriae laesæ situs erat, imponebat. Hoc facto, *fasciam* longitudine sex ulnarum parisiensium summis, quæ tres digitos lata erat, eamque circa vulnus & splenia, gradatim ipsi imposita, sexies ad splenia hæc supra vulnus probe firmando circumduxit; postea per ductus spirales obtusos ad genu descendit, factisque uno circuitu infra genu, sursum ad femur & vulnus reascendit, factisque iterum aliquot super primis in loco vulneris ductibus, ad os vulneris tanto melius comprimentum & claudendum, sicut fere alias in fracturis simplicibus hujus femoris ossis fieri solet, à vulnere sensim per ductus similes spirales obtusos sursum versus torcular B. C. ascendit; verum ab hoc loco femoris supremo sic sensim versus vulnus rursus descendit, hisque spiris *splenium* illud longum & crassum in loco D D. positum rite firmaret, eoque modo arteriae truncum subtus positum apte comprimeret, ut relaxato postea torculari, impetus sanguinis in hanc arteriam & vulnus multum imminueretur, atque sic sanguinis nova profusio nonsolum impidiretur, verum ora vulneris rectius rursus glutinari queant. Denique factis adhuc aliquot ductibus laxioribus, spiralibus, modo sursum, modo deorsum, ad praecedentes melius firmandos, finem fasciæ, ubi desinit, acu & filo firmari jussit.

## X.

Fascia itaque sic injecta, ægroque in lectulo commode collocato, torcular non removit, sed tantum ejus trochleam ita blande relaxavit, quantum pro aliquo influxu sanguinis in femur & totum pèdem procurando, opus esse credidit, id quod ex modico tantum & tolerabili doloris sensu, quem æger percipit, dijudicandum esse docuit. Nam quam diu vehementem æger dolorem in loco, ubi torcular collocatum est, percipit, nimis hoc adhuc constrictum esse inde colligi, satis vero eum relaxatum esse docet, quando dolorem & constrictionem tantum modicum eumque satis tolerandum æger sentit.

## X I.

Hoc itaque in statu, ordinatis tamen prius medicamentis roborantibus, subin-



subinde sumendis, præscriptoque apto victus regimine ab Excell. D. *Præfide* relicta, verum curæ & Studiosorum medicinæ & chirurgi, qui primus apud ægrum aderat, ab eo commendatus erat, quorum duo nimis per plares dies atque noctes vigilias apud ægrum egerunt, quique non solum novis adhuc spleniis & fasciis, atque simul, si forte hæmorrhagia quædam nova incideret, quomodo torcular dirigerent, illudque rurius constringerent, ab ipso instruebantur. Ita æger e mortis periculo non solum ereptus & ut dici solet, ex orci faucibus extractus, verum etiam tandem feliciter, duorum circiter mensum spatio, perfecte curatus est, ita ut postea ad confuetos suos labores redire potuerit, & optima adhuc dum sanitatem sine ullo incommodo fruatur. Quid vero in curatione actum, quomodo vulnus deligatum ac glutinatum sit, quæ post glutinationem facta sunt ad aneurysma avertendum, & quæ alias scitu digna ac necessaria sunt circa ejusmodi mala, in subsequentे explicatione & illustratione hujus casus dicemus.

## EXPLICATIO ET ILLUSTRATIO HUJUS CASUS.

## X I L

**C**um de arteriæ ejusdam & quidem *cruralis* pericolosissimo vulnere in nostra dissertatione agimus, necessarium esse existimo paucis indicare, *quid nomine arteriæ*, *quid postea cruralis*, & deinde etiam *vulneris* intelligamus.

## X I I L

Arteria describitur ab Anatomicis, quod sit vas sanguiferum, conicum, pulsans, elasticum, pro sanguine à corde ad omnis corporis partes, pro variis iisque diversissimis usibus devehens.

## X I V.

Due primarie sunt in corpore humano aliorumque animalium arteriæ, pulmonalis scilicet atque magna, quæ aorta quoque dici solet. Pulmonalis à ventriculo cordis dextro, quem quidam recentiores anteriorem, alii superiore, vocare malunt, incipit, per solos pulmones innumeris ramulis distribuitur, sanguinemque à ventriculo cordis dextro propulsum, per pulmonem dextrum & sinistrum in venam pulmonalem, & ex hac in auriculam & ventriculum cordis sinistrum, postquam respirationis beneficio magis, quam antea fuit, in his comminutus est, multo floridiorem, &

S 2 te-



tenuorem impellit. Sed cum haec nihil prorsus faciat ad nostrum scopum, nihil amplius etiam de hac hic sum dicturus.

## X V.

*Altera corporis arteria princeps, quæ magna sive aorta appellatur, e sinistro sive posteriori cordis ventriculo, magno eoque unico oritur trunco, qui sicut pulmonalis arteria in principio suo tres habet valvulas, semilunares dictas, ita positas ac fabricatas, ut sanguis, quem e corde contracto, sive in systole ejus acceperunt, in diastole ejus in cor regredi nequeat: dum ita sese expandunt, ut viam ex arteriis his in cor occludant: adeoque, dum arteriae se tunc constringunt, sanguis in eis contentus, à vi elastica arteriarum fortiter comprehensus in cor non remeare, sed vi arteriae coactus, versus partes omnes corporis, per innumeros ejus ramos & ramulos ad ultimas usque extremitates progredi cogatur.*

## X VI.

Non vacat jam distributiones trunci arterie aortae omnes recensere, quia hoc me nimis à scopo meo abduceret; interea tamen, qui eas scire, aut in figuris æneis videre cupit, illi autor sum, ut figuræ totius hujus arteriæ apud *Vesalius*, *Eustachium*, *Verheyen*, *Cowperum* vel *Draconium*, Autores Anatomicos celeberrimos, inspiciat, sic inde motus & distributionis sanguinis per totum corpus aptam aliquam ideam sibi formare poterit. At, cum speciatim de *cruralis arterie vulnera* hic agimus, de hac paulo uberioris nobis exponendum erit.

## X VII.

Nomen habet haec arteria à *cruribus*, quia crurum nomine integri subinde pedes, ab infima scilicet abdominis parte, usque ad calcem intelliguntur. Attamen quia pedes integri, sub *crurum* nomine ita saepe intellecti, ab accurioribus Anatomicis rursus in *femora* & *crura*, stricte sic dicta, dividuntur, intelligitur tunc femoris nomine pars pedis superior & crassior, ab imo ventre incipiens & ad genu usque se extendens; cum contra *crurum* nomine strictius ea pedum pars solum accipiatur, quæ inter genu & pedem extrellum interjacet, vulgoque *tibia* hodie adpellari solet. Hoc itaque sensu arteria illa, quæ in futore nostro læsa fuit, *femoris rectius* ac *distinctius* appellatur: quia in ea parte vulnerata est, quæ proprie *femoris* nomine venit, & quæ in *tibia* collocatæ sunt, sive per *tibiam* distribuuntur, *tibiales arteriae* vulgo dici solent. Interea tamen verba sicut numimi, nosque quia quamplurimi arteriam *femoralem* adpellati solent *cruralem*, pro synonymis hic habebimus arterie *femo-*



*femoralis & cruralis* vocabula, ne quis forte eas pro diversis aut distinctis habeat, vel à nobis ita haberi credat.

## XVIII.

Harum arteriarum *cruralium* sive *femoralium* *duæ sunt*, una scilicet in unoquoque crure sive femore, quæ oriuntur, ex ita dictis *iliacis* & hæ ex ima parte trunci arteriæ aortæ, descendenter dictæ, qui truncus circa infimas lumborum vertebrae in abdomen in duos magnos ramos distribuitur, qui *iliaceæ* appellantur arteriæ & versus crura progrediuntur, alter ad dextrum, alter ad sinistrum, & quamdiu in abdomen manent, nimur à fine seu infima aortæ parte usque ad egressum ex hoc, *iliacarum arteriarum nomen* retinent, mox vero, quando extra abdomen, femur ingrediuntur, licet eadem sint arteriæ, tamen à situ, in quo nunc sunt, sive à parte, quam transeunt, *cruralis* sive *femoralis* nomen assument. Conf. si placet, figuræ autorum supra §. XVI. nominatorum.

## XIX.

His arteriis sapientissimus machinæ nostræ conditor aptissimum, qui ex cogitari potest, dedit situm, ne, quia lœsio earum valde periculoſa est, facile lœdantur, sed à quamplurimis injuriis, lœsionibus & ictibus quibus femora exposita sunt, defensa lateant. Nimur non descendunt ad genu vel per anteriorem vel per exteriorem femoris partem, quippe quæ omnis generis lœsionibus quam maxime expositæ sunt; verum oblique per interiorem partem, juxta *musculum sartorium* & *vastum internum* dictum, ita ut quamplurimæ lœsiones & ictus eas attingere nequeant; sed e contrario paucissimis tantum, quantum fieri potuit, feriri queant, progrediuntur. Quoniam vero in interiori latere collocatae sunt, factum est, ut singulari prorsus ratione in vulnerato nostro altera earum, sicut §. I. dictum est, lœsa fuerit.

## XX.

Descendit etiam arteria *cruralis* *unico* tantum plerumque *trunko*, per femur totum usque infra genu & ut plurimum tantum minores ramulos ad musculos vicinos prægrandes nutriendos spargit, quo fit, ut, quia magna est hæc arteria, dum integro cruri sive pedi sufficiens nutrimentum afferre debet, ejus lœsio, ob celerem & copiosam sanguinis, quando vulnere paulo ampliore, vel altiori loco lœsa est, profusionem, substantiam fæpe mortem afferat: sicuti non solum autores quam plurimi,



mi [d], sed tristissimus etiam casus, qui ante aliquot annos hic contigit, comprobant, ubi quis, ex lœsa hac per gladium arteria, vulneratus intra paucissima horæ momenta, & fere in ipso lœsionis loco animam cum fanguine, antequam ei succurri potuerit, amisi.

## XXI.

Interea tamen etiam subinde in *suprema femoris parte* in duos magnos quasi truncos se dividit: quorum alter interiorem, ordinariam & consuetam femoris partem, sicut modo diximus, occupat; alter vero, attamen priori minor, per exteriorem, profunde tamen sub musculis & inter eos, satis hic crassos, divisus in ramulos ad genu usque descendit, quemadmodum eum non solum *Verheyenus* [e] præ omnibus aliis Anatomicis optimè delineavit, verum & Celeb. Dom. *Præses* ipsum etiam aliquoties in cadaveribus, præsertim quorum arterias ceracea materia repleverat, eadem fere ratione offendit: cuius rei scientia ad res quasdam, circa vulnera harum arteriarum gravis momenti, infra exponendas, rectius intelligendas quam plurimum facit. Hinc tanto magis miror, quod multi magni Anatomici hujus rami nullam prorsus mentionem fecerint; cum tamen non sit adeo rarus.

## XXII.

Quando autem trunca major vel interior fere ad genu pervenit, adhuc magis introrsum se inflectit, ita ut tandem ad posteriorem ossis femoris partem perveniat, ubi arterie popliteæ nomen assumit & mox intra interstitium duorum condylorum ejus se abscondit, ita ut & hic facile laedi nequeat. Hinc per articulum sive flexuram genu, quam *poplitem* vulgo appellant, pergit ad tibiam, furam ingreditur, locum intra duo cruris ossa, tibiam scilicet & fibulam, occupat, ibidem in duos trevis magnos se dividit ramos, qui postea per totam tibiam & pedem pulcherrime distribuuntur, omnibusque partibus hic collocatis fanguinem affrunt; de quibus vero, quia ad scopum nostrum non pertinent, hic plura haud dicemus.

## XXIII.

Ita & de arteriarum fabrica multa hic dicere & proferre possemus, nisi prolixitatem vitare mallemus, adeoque tantum maxime necessaria, quæ ad

[d] Ex quibus nunc solum nominabo *Bönnium* de vulner. renunc. p. 135. Zittmann p. 710. p. 724. *Waldschmid.* in dissip. de vulneribus arteriarum in artibus sepe funestis raro lethalibus p. 16.

[e] In Anat. corp. hum. Tab. XXXVIII, fig. 2, litt. B,



ad scopum nostrum illustrandum faciunt, hic sum prolaturus. Constant unanimi consensu ex tunicis, & quidem secundum Cel. Dom. *Præsidens* [f] ex quinque: *vasculoſa* scilicet, *celluloſa*, *tendinea*, *musculoſa* & *nervosa*, in canalis robusti conici figuram combinatis; alii, alio modo numerant. Interea vero prætermisſis hic aliis arteriarum tunicis, de quorum numero inter Anatomicos adhuc disceptatur, non nisi de *muscularibus* ac *tendineis*, licet nonnulli eas negare voluerint [g], pauca proferre necessarium esse judicamus. Eas vero musculoſis & tendineis instruclias esse, docet primo resolutio earum anatomica: dum in anatomicis suis demonstrationibus Excell. Dom. *Præses* eas nonſolum in arteriæ aortæ trunco copiosas & crassas ſatis demonstravit, easque etiam ita præparatas in ſpiritu adhuc conservat; verum etiam phænomena, quæ quando agunt, ſive quæ in actione earum observantur, quam manifestissime hoc comprobant: dum ab impetu & preſſione ſanguinis à corde, & ſpeciatim ejus ſystole, magna vi in illas propulſi, arteriæ expanduntur, dilatantur, & attolluntur, id quod in pulsu earum digitis appofitioſis clare percipitur; verum etiam quando ſic dilatatae per vim ſuam elatiſcam, (quam à musculoſa ac tendinea ſuā fabrica habent) ſe rursus conſtringunt, & ſanguinem e corde receptum ulterius versus extrema magna vi propellunt.

## XXIV.

Constat vero hæc fabrica tendinea ac musculoſa (i) ex fibris copioſis annularibus, tunicas ſive lamellas componentibus variis, ſibi invicem tanquam ſtrata ſuperimpoſitas, plures in majoribus, cavum arteriæ in circuli ſive annuli modum ambientibus, & elatiſca ſive musculoſa vi prædictis, prolixius in Celeb. Dom. *Præſidis* Compend. Anatomi. Tom. II. Nota 63. p. 120. deſcriptis, ob quas a *Douglassio* arteriæ haud male, (ſicuti cor, uterus & vesica) *musculi cari* appellantur (h), & à quibus potiſſimum vi arteriarum elatiſca ſive contrahens, quando in ampliorē diameſtrum, vi ſanguinis irruentis fuerunt diſtentæ, in anguſtiorē ſe rursus conſtringunt, dependet.

## XXV.

Observatur vero nonſolum hæc viſ conſtrigens in arteriis, qua diſtentæ vi quacumque in anguſtius ſe ſpatium rursus conſtringerè, ſive amplitudinem earum minuere poſſunt; verum etiam in iis viſ deprehenditur, qua

[f] In Compend. ſuo anatomico p. 156.

[g] Qua de re videri poſteſt idem libell. Tom. II. p. 120. Nota 63.

[h] Vid. Diſſert. ejus de *Peritoneo*, a Clariff. Dn. *Heijero* Filio, pie ſuperiori anno defuncto, ex Anglico latine quondam reddita p. 55.



qua secundum longitudinem se contrahunt, quæ vis potissimum observatur, quando arteria quædam paulo major, transversim vel ex parte, vel tota dissecatur. Quando enim hoc ultimum fit, vel etiam in mortuo animali experimentum instituitur, pars cor respiciens, versus cor; pars vero extrema, cum extremis connexa, versus extrema, atque sic utraque pars sectæ arteriæ versus sua extrema retrahitur, eadem prorsus ratione, ad si, quando chorda quædam tensa discinditur, partes dissectæ versus extrema sua se retrahunt. Quando autem pars tantum arteriæ & quidem dimidia circiter, aut adhuc plus quam dimidia, transversim dissecatur, partes dissectæ eadem fere, ut modo diximus, ratione versus cor & extrema se retrahunt, quod vi tunicae & tendineæ & nerveæ, musculofas annulares fibras extus & intus ambientis, atque in quibus forte fibra per longitudinem exporrede, licet perspicue satis videri nequeant, fere ut in aspera arteria & bronchiis pulmonum, quæ vi tunicae sua interioris longitudinem suam breviorem reddunt, ac pulmonem vel centies flatu distentum, etiam adhuc in mortuis, centies rursus constringunt, atque sic & haec & arteriæ ob hanc fabricam ex analogia cum aspera arteria similem, in perpetuo sunt nisi se abbreviandi, sive secundum longitudinem se contrahendi [i], unde fit, ut in vulnere arteriæ paulo majori, transversim inficto, difficilis non solum sanguinis profusio cohibeatur, verum etiam glutinatio quam difficillime obtineatur: quia ob dictam rationem illud vulnus ab ipsa natura & fabrica arteriæ semper distrahit, ut claudi vel glutinari aut vix aut saltem quam difficillime queat. Contra ex hoc phænomeno illustratur, quare vulnus secundum longitudinem infictum, sicut hoc nostrum erat, facilis coeat. Ex eodem etiam adhuc fundamento provenire existimo, quod & homines & animalia vulnerata, quæ ex haemorrhagia moriuntur, in ultimo vitæ termino, sive in agone, ut vulgo dici solet, extreborum convulsivis motibus afficiantur: quia vasa sanguine exinanita, adeoque vi distendente jam defituta, se ad omnem mensuram & sic etiam secundum longitudinem se constringunt, atque sic extrema sua versus cor, tanquam principium & punctum quasi fixum arteriarum, retrahere & cum impetu quasi rapere nitantur.

## XXV I.

Exposita arteriæ natura, & simul quid *cruralis* sit, explicandum mihi nunc est, quid vulneris nomine intelligatur. Hoc vero nihil aliud hic intelligo, quod solutam unitatem sive unionem partium molium à vi externa, &

[i] Haæ fibrae quidem longitudinakes difficulter demonstrari possunt, sicut Cel. *Morgagnius* jam in Adver. suis Anatom. II. p. 78. docuit: attamen ex vi hac contractili, tales vel forte etiam spirales annularibus mixtas adesse, suspicendum est, licet demonstrari nequeant.



& quidem ut plurimum ab instrumento acuto (sicut in nostro ægro factum est) excitatum. Hic vero in nostro ægro non solum cutis & pinguedo, verum etiam *ipsa arteria cruralis*, cum incubente hic musculo fætorio vulnerata atque incisa est, sicuti ex loco, quo vulnus hoc erat, conspici & ex largissima sanguinis profusione dijudicari poterat.

## XXVII.

Quod vero vulnera hujus arteriæ periculosissima, atque plerumque *fæsta ac mortifera*, sive, ut vulgo dicunt, *lethalia* sint, ob subitaneam eamque ingentem sanguinis profusionem, jam supra §. XX. indicavimus, atque vix ullus est prudens, qui hac de re vel unquam dubitavit; cum tot exempla prostent eorum, qui brevi inde mortui sint. Interea tamen hæc vulnera *non pro absolute lethalibus semper habenda esse*, non solum præter alios *Exc. Dom. Præses* ostendit [k]; verum vivo etiam, ut dici solet, exemplo, noster vulneratus demonstrat, quia in tempore auxilium petit, atque convenientissima curandi ratione ipsi prospectum est: primo sistendo sanguinis profluvium, novumque fluxum prohibendo, ac deinde etiam vulnus rite obligando ac glutinando. Quomodo autem *Exc. Dom. Præses* sanguinis fluxum cohibuerit, jam in casu §. VIII. & seq. expositum est, ideoque restat, ut de glutinatione tantum hic adhuc dicamus.

## XXVIII.

Antequam vero hanc exponamus, monendum prius est, altero die, forte ex relaxatis fasciis, profluvium sanguinis ex vulnera rediisse; quod vero constricto paululum torculari, novisque spleniis vulneri superimpositis, aliaque adhuc fascia super injecta rursus cohibitum est, quæque ita ad quartum usque diem relictæ sunt, ægro satis bene se habente. Interea tamen *Ill. Dom. Præses* semper instrumenta, quæ ad arteriam læsam, ac aliisve ferramentis ligandam necessaria sunt, parata servavit, ut in casu necessitatis iis mox uti posset.

## XXIX.

Cum vero quarto die vulnus male olere inciperet, præsertim cum dies calidi incidenter, vulnus primo resolvendum esse judicavit. Ut vero hoc securius fieret, omnibus prius ad novam delegationem rebus necessariis præparatis, trochlearum torcularis paulo constringxit, ac postea fascias lente ac prudenter, me aliisque Studiosis medicinæ præsentibus, resolvi curavit. Fasciis resolutis, splenia, quæ sponte quasi aut facile faltem recedebant, sanguine ebria ipse blande removit: sub quibus larga satis sanguinis fœ-

Tom. V.

T

tidi

[k] In Instit. Chirurg. suis. p. 52.



tidi copia latebat, quæ tunc effluebat, sanguine novo aut recenti non prodeunte. Cum vero inferius splenium una cum lycoperdo & linamentis vulneri impressis fortius adhuc inhærerent, ea & hic, sicuti in aliis gravioribus vulneribus, evellere perniciosissimum judicavit, sed nova splenia gradatim majora, mixturaque ex aqua calcis & spiritu vini camphorato imbuta, loco priorum applicavit, & postea, ut prima vice §. IX. vulnus deligavit, resoluta postea denuo aliquomodo torcularis trochlea, quantum æger id commode ferre potuit: quo in statu etiam per triduum rursus relictus est, ea exhibita cautela, ut si forte sanguis e vulnere prodiret, ipse paulo trochleam adstringeret: id quod tamen opus non erat.

## XX X.

Post triduum, quo parum vel nihil sanguinis penetravit, fasciam, constricta prius denuo torcularis trochlea, altera vice resolvi curavit, remotis postea rursus spleniis antiquis, purgatoque vulnere ope linamenti à cruce putrescente. Linamenta vero carpta una cum lycoperdo vulneri adhuc firmiter inhæabant, adeoque nihil adhuc hic vi evellendum esse præcepit, sed vulnus tantum unguento digestivo simplici, ex terebinthina & vitello ovi parato, illinendum esse jussit expectandumque esse dixit, donec suppuratione facta, ea quæ vulneri ad sanguinem cohibendum immersa erant, sponte solverentur atque exciderent, vulnusque, ut nuper factum erat, rursus obligabatur, relaxata postea iterum paululum trochlea. Ceterum æger bene se habebat, atque ab Cel. Dom. Præside denuo admonitus erat, ut quando forte sanguinis fluxum aliquem in vulnere sentiret, quia periculum nondum superatum esset, torcular paulo rursus constringeret; ubi vero doloribus inde urgeretur, illud paululum relaxaret, ne pes gangrena aut sphacelos corriperetur: id quod etiam ex hac informatione probe didicerat, atque scire observaturum esse promiserat.

## XX XI.

Ex quibus forte etiam *præstantia hujus hic exhibiti torcularis pœ vulgari dijudicari* poterit, dum vulgare, postquam injectum est, semper adjutorem sive ministrum requirit, qui illud perpetuo contineat & firmet, hoc vero ob fabricam suam, vel sponte sua, parti ita inhæret, sicut medicus sive director ejus id velit; vel facile etiam ab ipso ægro, si ministri vel adjutores forte nulli adessent, pro necessitate vel fortius adstringi vel relaxari potest, si hac de re modo prius, ut par est, edocetus fuerit, sicut etiam hic noster æger saepe fecit. Præterea quia cingulum sive lorum hujus torcularis non ubiqui membrum sive partem, quam ambit, arcte stringit, sicuti vulgare torcular facit, eoque ipso sanguini venarum fere omnem refluxum præcludit, verum ab extremis hujus torcularis novi laminæ transverse inferioris

BB,



BB, FF, (vid. Cel. Dn. *Præsidis* Instit. Chirurg. Tab. V. fig. 6.) quasi fulcris sustentatur, ne partes vicinas omnes nimium comprimere possit, utrinque motui sanguinis aliquod spatum relinquitur, ut redditum suum ad cor, per venas utrinque hic collocatas, utcumque continuare queat; cum alias in vulgaris usu, si in ejusmodi lœsionibus diu in parte lœsa relinquentur est, ob venas omnes valde compressas, pars infra vulnus vehementer intumescat, indeque acerbissimi dolores & sphacelus inde concitentur; aut si relaxetur, aut removeatur, sanguinis profluvium reddit, adeoque vel hoc vel prius malum, sphacelus scilicet, ægrum conficit, sicuti Exc. D. *Præses* alias fæpius vidit: quæ vero mala omnia, prudenti hujus machinæ usu, in hoc nostro ægro non incidentur.

## XXXII.

*In tertia deligatione*, quæ rursus non citius, quam triduo interjecto, instituebatur, torcular hoc rursus paululum, quantum æger sine insigni dolore ferre poterat, ab Ill. Dn. *Præside* adstringebatur. Postea, fascia resoluta, spleniisque remotis, lycoperdum una cum linamentis, in prima deligatione vulneri immisis, excidebat, atque simul larga fatis ichoris subcruenti copia, quæ subtus collecta erat, effluebat, nullus vero recens sanguis ex arteria lœsa profluebat: id quod bonum de speranda vulneris arteriæ glutinatione augurium præbebat. Itaque sine vulneris scrupulosa perscrutatione mox, abstergo tantum hoc ichore, novis linamentis contortis, (quæ Galli *bourdonets* vulgo adpellant) digestivo unguento obductis, tepide vulnus probe replebatur, superimposito emplastro glutinante, atque spleniis gradatim majoribus, ut in prima & altera deligatione factum erat, fasciaque eadem ratione, ut §. IX. dictum est, rite superinjecta: quod postquam factum erat, trochlea torcularis paulo rursus resolvebatur; ita ut æger illud sine vehementi dolore perferrere potuerit, eumque sic, commendato vitæ apto regimine, valere jussit.

## XXXIII.

In sequentibus deligationibus, quas tertio vel quarto tantum quovis die Ill. Dn. *Præses* reiterabat, & quibus semper interfui, eadem diligandi ratione actuum est, ut XXXI. descripsi; nisi, quod in quinta vel sexta deligatione, primo vulneri imponendo splenio laminam subovatam metallicam immitti semper curaverit, pro arteriæ vulnera tanto melius comprimendo, firmioreque cicatrice in eadem producenda, atque simul pro nova sanguinis profusione & aneurysmate certius avertendis. Quibus factum est, ut sic vulnus sensibiliter immunitus, atque tandem tempore duorum mensium feliciter omnino glutinatum: ubi solum hoc adhuc momere volui, quod torcular in femore ad quartam usque hebdomadem, cum regimine dicto, circa femur in consueto loco relictum sit, ultima tamen hebdomade paulo minus, quam



antea constrictum: reliqua vero splenia tam vulneri, quam trunco arteriae imposta, una cum lamina metallica ac convenienti regimine, quod æger sanitatis cupidus quam accuratissime servavit, ad finem usque curationis, predicta ratione continuata sunt, nisi quod ultimis hebdomadibus loco unguenti digestivi linamenta carpta inferiora balsamo copaivaæ fuerint imbuta.

## XXXIV.

Denique cum ad finem fere curatio pervenisset Ill. Dn. *Praeses*, uberior ad huc sollicitus fuit de aneurysmate avertendo, id quod alias facile, licet ejusmodi vulnera etiam sanata sint, postea adhuc supervenit [1]. Ad hoc vero præstandum, non solum subovatam laminam quandam metallicam, quinta vel sexta deligatione, ut modo §. XXXIII. diximus, vulneri superimponi curavit, verum etiam machinam aptam coriaceam ægro proposuit, quam ipsi, sanato etiam vulnere, circa locum vulneris diu gestandam suasit, ut sic recens nimisque mollis tunc adhuc arteriae cicatrix, donec probe induratur, compressa seruetur: quia alias facile, nisi sic impediatur, aneurysma periculosum sequeretur. Hoc cum vulneratus intelligeret, ipse sibi hujusmodi machinam confecit, quam fig. 2. & 3. exhibemus, & quæ ita se habet.

## XXXV.

Confici jussit lorum coriaceum satis amplum, (vid. fig. nostra 2. litt. A. A.) quo femoris partem inferiorem in loco, ubi vulnus fuit, ope fibularum B. B. & minorum lororum C. C., apte cingi atque constringi queat. Huic inferi curavit laminam illam ferream, corio molli obductam, litt. D, cicatrici, submissò prius spleniolo, adaptandam; alterum postea lorum angustum, at multo longius E E, dum prius A A, pedi erat circumductum, circa infimam ventris partem firmandum & fibula F, quoque per extremum G G ibidem adstringendum, id quod per duo lora sive frusta coriacea H H, H H, ad perpendicularm descendantia, cum inferiori A A, suturis jungebatur, ne hoc deorsum cedere & locum læsum relinquere potuerit, id quod in fig. 3. quomodo femori injectum fuerit, ostenditur, ubi litteræ huic figuræ adjectæ idem notant, quod in figura præcedenti: hinc brevitatis studiosus hic ea, quæ modo dicta sunt, repetere nolo. Hoc vero solum adhuc indicare volui, quod vulneratus hac machina adhuc dum utatur.

## XXXVI.

Porro cum initio hujus curationis non adeo certus esse potuerit Dn. *Praeses*,

an

[1] Vid. non solum Dn. *Praesidis* Inst. chirurg. de arteriarum lesionibus, in vulneribus vel vene sectione, & capite de aneurysmate, verum etiam præstantiores scriptores alios de iisdem argumentis.



an hæc hactenus descripta curandi ratio ex voto sit successura , sicut §. VI. jam dictum est , cum sæpius *amputationem femoris* desideret , quemque modum etiam multi scriptores chirurgici adhuc , tanquam unicum & præstantissimum , tam in arteria brachiali , quam crurali vulnerata , remedium commendant ; aut ex Dn. *Præsidis* sententia [ m ] , ligatura prius arteriæ operi circumducti tentanda sit , hic etiam , cum primum ad ægrum hunc vocatur , ferramenta ad hanc ligaturam necessaria secum attulerat , ut in casu necessitatis , ubi descripta methodus forte non sufficeret , *ligaturam* arteriæ hujus læsa , quam apud alios scriptores adhibitat hic fuisse , hactenus nondum reperi , instituere posset , quam alias aliquoties cum successu optato *in arteria brachiali & radiali* perfecerat : atque propterea jam , tam in compend. anat. quam institut. chirurg. locis modo citatis , suavit , *nunquam mox brachium in lesa arteria brachiali* , multo minus in radiali aut cubitali læsa , esse amputandum ; sed semper prius *ligaturam arteriæ lesa esse tentandam* : hac vero frustra adhibita , aut sphacelo superveniente , tandem ad amputationem quoque , tanquam extreum remedium , esse progrediendum.

## XXVII.

Ratio autem , quare in ejusmodi vulneribus multi *mox amputationem suaferint* , neglecta arteriæ ligatura , hæc erat , quod forte figuris autorum anatomorum , quas de arteria aorta , arteriaque brachiali & femorali dederunt , nimis crediderint , qui fere omnes , *Verheyeno* excepto , *unicum tantum truncum arterie & brachialis & cruralis* delinearunt , ut videre est in *Vesalii & Eustachii* imo & in recentioribus præstantissimis Anatomicis , *Cowpero* scilicet in Anat. corp. humani App. Tab. III. & *Drackio* in *Anthiopolog.* Tab. XX. aliisque ; vel etiam ex *Verheyeni* quoque figura exteriore ramum cum cubito vel tibia non communicare judicarunt. Verum cum Exp. Dn. *Præses* duos aliquoties *truncos prorsus distinctos* , vel ramos saltem duos arterie *brachialis* ad cubitum & manum procedentes in cadaveribus in brachio deprehenderit , sicuti tam in peculiari illa , modo XXXVI. laudata dissertatione , jam anno 1730 , quam in Compend. ejus Anatomico Tom. II. p. 126. descripsit , in femore fere quoque alterum majorem ramum , sicut *Verheyenus* , ut supra jam indicavi , XXI. vidit , atque verisimile sit ramos hos exteiiores cum ramulis interioris & majoris circa genu communicare , *ligaturam semper prius tentandam esse* , *antequam ad crudele & miserum illud remedium* , extirpationem scilicet tanti membra , accedamus , præcipit.

## XXVIII.

Cum vero figuram , quam jam dudum hanc ob cauſam delineari curavit ,

T 3 non-

[ m ] Vid. *Moebii* dissert. sub Dn. *Præs.* prædio A. 1730. hic defensa , titulo obser-  
vat. medic. p. 18. & compend. ejus Anat. Tom. II. p. 126. itemque in Inst. chirurg. p.  
91. & de anuerysm. p. 445.



nondum publicæ luci exposuerit, operæ premium esse judicavi, si & hanc utilitatis publicæ cauſa in re tam ardua hic exhiberem, ut chirurgi non temere imposterum ejusmodi in casibus ad amputationem, quæ nunquam sine periculo eſt, accedant, atque vulneratis multis membra adeo necessaria converventur. Hæc vero ita ſe habet. In fig. 4. oſtenditur brachium dextrum. A A A, tegumentis communib⁹ denudatum; B. muſculus deltoides; C. truncus arteriæ brachialis juxta deltoideum, ab axillari arteria proveniens; D. locus ubi hoc in cadavere in duos ramos E E & F F dividebatur, quorum exterior E E, in latere muſculi bicipitis extero ſitus erat, & inde ad cubiti flexuram, indeque ſupra radium ad pollicem & manum, adeoque in extero brachii latere progrediebatur; alter ſive internus, ad interius latus bicipitis, ubi alias truncus primarius collocari folet, ſitus erat, & juxta os cubiti ſive ulnae ad manum pergebat G, ibique pet anastomofes cum priori jungebatur. Quando autem ejusmodi rami arteriæ in parte aliqua ſibi invicem adeo propinqui ſunt, haud facile contingit, quod non etiam in itinere hinc inde per ramulos & lateribus prodeuentes, & ſpeciatim circa cubiti articulum per anastomofes, ut vulgo dicunt, jungantur, atque ſic inter ſe invicem ita communicent, ut uno ligato, per alterum adhuc integrum & aperatum, vel etiam per plures minores ſanguis in partes eas, quas hic nutrire alias ſolitus erat, penetrare, eos ramulos tandem, quantum ſatis eſt, ſenſim dilatare, ejusque vicem ſic ſupplere queat.

## XXXIX.

Ne vero hoc ita in cerebro tantum excoſitatum ſive confictum eſſe videatur, pefuadere me poſſunt exempla eorū, qui hac ratione ab Dn. Præſide hic olim curati ſunt, atque adhuc vivunt; ubi in vulnere interioris rami F F in brachio, arteriam, ſicuti alias in aneurysmate curando moſ eſt, filo operatus curvæ Tab. I. fig. 10. aut peculiariſ ferramenti, quale Tab. VIII. fig. 4. in Inst. ſuis chirurg. exhibet, aliove ſimiſ ligavit, & vulnus poſtea secundum artem & deligavit & curavit: quo factum eſt, ut filum tandem putridum ſponte ceciderit, & vulnus ita coiverit, ut ægrī poſtea nullum damnum in brachio ſenſerint, ſed ſucceffu temporis eo ita, ut ante vulnerationem, uti potuerint.

## §. XL.

Poſſe vero ramulos minores ſe ita ſenſim dilatare, ut §. XXXVIII. diximus, Clar. Dn. Præſes inde ſuſpicatur, quia cum aliquando truncum arteriæ brachialis internum, graviter vulneratum, prædicta ratione ſupra vulnus operi circumducti ligasset, intra triduum nullum in arteria juxta carpum poſitę, quæ à medicis explorari folet, pulſum ſentire aut percipere poſtulat: poſthac vero hauc arteriam primo levifime micare, ſenſim vero ſenſimque plenius pulſare ſenſit, indicio manifesto, quod initio poſt ligaturam minores illi ramuli



muli, per quos communicatio majoris cum minori fit, sanguinem non nisi exigua copia transmisisse, quæ parva copia pulsuum excitare adhuc nondum potuit; sed pedetentim ita eos amplios fuisse, ut sanguis tandem post aliquot dies libere & facile & tandem, pleno quasi rivo, ad arteriam carpi transire, sicque brachium integrum, & manum nutrire rite valuerit.

## XL I.

Ex his igitur, nisi me omnia fallunt, sponte sequi existimo, quod in ejusmodi vulneribus arteriarum brachialium & cruralium primo methodus hæc in nostro hoc agro usurpata, sit tentanda; sed si hac forte sanguis cohiberi & res expediri nequeat, ligatura deinceps arteria per filum adhibenda; sin vero post hanc sphacelum forte partes inferiores occupare deprehendimus, amputatio denique tunc demum, tanquam extremum & unicum adhuc, quod supereft remedium, sit instituenda.

## FINIS.

## EXPLICATIO TABULÆ AENEÆ.

**F**ig. 1. ostenditur femur dextrum; A. notat vulnus arterie læsæ; B. C. locum, ubi torcular, imposta prius ad B fascia convoluta & crassa, applicabatur, & ad C, supposito splenio crasso, trochlea stringebatur.

Fig. 2. Denotat machinam usurpatam ad precavendum aneurysma. A. A. lorum coriaceum, quatuor digitos circiter latum, quod fibulis B. B. & loris minoribus C. C. cicatrici, subiecto prius spleniolo, lamina ferrea, corio molli obducta, lit. D. applicata, constringebatur. E E demonstrant aliud lorum, longius & pollicem circiter latum, circa superiorem femoris partem fibula F. & extremo, foraminibus praedito G G, firmandum. H. H., H. H. significant duo frusta coriacea annexa, lora A A. & E E. necentia, ne illud locum læsum relinquere potuerit.

Fig. 3. Exhibit machinam fig. 2. femori sanato applicatam: cuius litteræ idem indicant, quod in fig. 2.

Fig. 4. Repræsentat brachium A. A. A. in quo B exhibet musculum deltoidem, C truncum arterie brachialis, juxta deltoidem ex arteria axillari provenientem, D. locum ubi hic in duos ramos, nimirum E E ad latus musculi bicipitis externum abeuntem, & F F ad interius bicipitis latus progressiorem dividebatur. G. locum, qui ramos E E & F F per anostomosin in manu conjungebat.

OTIUS





## QUÆSTIO

C X X X I I L

Q U Ä S T I O  
M E D I C O - C H I R U R G I C A ,

*Præside*

M. ANTON. NICOL. GUENAU LT,

*Reſp.*

U R B A N O V A N D E N E S S E B A C C .

*An vulnerata crurali arteria ab amputatione auspi-  
candum ?*

Parisiis i Martii 1742

*Tom. V.*

V



Landesbibliothek Oldenburg