

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLVI.

VD18 90538986

CXL. De Nova Brachium Amputandi Ratione Disputatio.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16618

C X L.

D E

N O V A B R A C H I U M
A M P U T A N D I R A T I O N E

D I S P U T A T I O.

Praefide

E L. F R I D. H E I S T E R,

Respondit

R U D O L P H. H E N R. Z E I D L E R

V E R D E N S I S.

Helmstad. 21 Mart. 1739.

E e 3





P R A E F A T I O.

AItem salutarem maxima capere incremente, solerti & accurata observationum, commemoratione dignarum, annotatione atque descriptione, unanimi profecto praestantissimorum medicorum consensu asseverare licet. Ipse hujus ævi rationalis medicinae stator & corypheus, illustr. Frider. Hoffmannus, Halensis, affirmare non dubitavit, quod ad progressum artis nostræ augendum potiores partes observations, quam ratiocinia sibi vindicent. [a] Et rerum gestarum annales docent, quod, spretis morborum historiis & experientiis luxuriantia ingenua hypotheses, opiniones, imo monstra opinionum sibi finxerint, que non solum plerunque vanâ, absâna & a vero quam alienissima erant, verum etiam ita sape comparata, ut non nisi in exitium generis humani ad ipsum artis exercitium applicari potuerint [b]. Quam observationem vita & sanitatis antistites nihil melius, nihil prestatibilis agere queunt, quam si summa cura, atque industria notant, quandonam ipsis in medicina facienda morbi antea non visi, aut prætervisi obveniunt; aut si novas, nec ante auditas, curandi rationes vel ipsimet excogitarunt, vel ab aliis inventas ac nondum cum publico communicatas sciunt: nam experientia medicina crevit, atque experientia semper ad majorem perfectionem progredi debet. Quæ cum ita sint, me oleum operamque perditum haud esse credidi, si in præsentiarum singularem & notatu dignissimam brachii, per ignem destruci, historiam, novamque, nec ante ab alio, quantum scio, exhibitam illud resecandi rationem in muliere quadam, anno superiori optato cum successu administratam, litteris mandarem. In animo quidem mibi erat hanc historiam atque dissertationem, jam ante aliquot menses, litteris confixatam, mox etiam typis tradere atque evulgare; verum & iter aliquod inopinatum & hoc mox insequens gravis ac diuturnus morbus in causâ fuerunt, quod id citius efficere non potuerim. Interea autem Deo T. O. M. humillimas persolvo gratias, quod nonsolum in hoc argumento pertexendo, suo favore & gratia mibi adesse, verum etiam ab atroci illo morbo me rursus liberare quam clementissime voluerit.

I.

[a] Vid. Medicinæ ejus rationalis systematicæ Tom. II. prolegom. cap. I. §. 5.

[b] Hoc copiose & solide demonstratum est à Parente, sempiterna pietate venerando, in oratione de hypothetum medicarum fallacia & pernicie, dicta anno 1710, quum anatomes & chirurgiæ professionem in Academia Altorfina susciperet.



I.

Quum de nova quadam brachium amputandi methodo differere animum induxitimus, definiendum nobis est, quid per amputationem generatim intelligatur. Intelligitur autem hoc vocabulo illa actio, qua membrum quoddam, extremitas seu artus aliquis corruptus, sive destructus ad vitam ægri servandam à corpore dextra chirurgi aufertur.

I I.

Extremitates autem sive artus corporis in medicorum scholis dicuntur ille partes, quæ ex truncо exorrecte, ossibus, musculis, arteriis, venis, nervis &c. constant, ligamentis necuntur, adipe involvuntur, cute teguntur: suntque vel superiores vel inferiores. Superiores humerus sive brachium, cubitus, manus ac digiti conflant, & uno vocabulo *brachia* appellantur; inferiores autem, qui *pedes* dicuntur, femur, crus, pes extremitus, cum suis digitis, constituant.

I I I.

Inter omnes, quæ à chirurgo administrari solent curationes, hæc dubio procul *maxime terribilis* existit, qua integra membra extirpantur. Interim saepe sepius casus incident, ubi suscipienda est, nisi ægrum tandem certæ atque miserrimæ morti tradere velimus. Præcipua noxarum genera, quæ sœvam hanc curandi rationem depositunt, sunt (1) *sphaerulæ* gravior, cutem, adipem, musculos cum vasis sanguinem spiritusque vehentibus ad os usque destruens; (2) *caries* nulli cedens medelæ; (3) *spina ventosa* infanabilis, qualis potissimum esse solet ea, quæ ipsos ossium articulos occupat; (4) *collisio vehemens*, partes molles contundens, ossaque simul confringens; (5) *arteria brachialis*, quando unicus tantum ramus præsens est, aut cruralis percussa, si sanguinis fluxus alter prohiberi nequeat; (6) *combustio*, quæ membrum aliquod ad os usque concremat, destruit & enecat.

I V.

Artuum majorum, ut cruris, femoris aut brachii amputatio, de qua nobis hic loci potissimum sermo est, longe majori olim cum vita periculo, quam hodie perficiebatur; dum veteres præstantissima sanguinis profluvium cohibendi artifia ignorabant. Etenim, dissectis scalpello partibus molibus, os serra, vel, quod in manu & pede extremo fieri solebat, scalpro

sive



five cuneo quandoque amputabant [c], & dein enormem, nunquam nota contingentem, profusionem sanguinis unice medicamento adstringente, aut igne seu ferro candente, linamentis, spleniis, fungo, bovista dito, & fasciis sedare tentabant.

V.

Hæc autem remedia saepius ad sanguinem ex majoribus arteriis, præfertim in brachio vel femore profilientem, cohibendum, haud raro tam parum valebant, ut ægri operationi subjecti cum cruento ipsam animam saepe effunderent. Quapropter *Paracelsus*, chirurgus manu & ingenio præstantissimus, per eximum & nunquam satis laudandum excogitavit artificium, post perfectam operationem arterias majores volfella comprehendi filoque constringendi, utpote quo omnium tutissime latici vitali, effluxum molienti, via præcluditur, ægro vires conservantur, isque potesta plerumque feliciter sanatur.

V L.

Quum vero per illud temporis spatium, quo consueta olim methodo per ferram membrum auferri solebat, enormis semper, præfertim in femore & brachio, ubi prægrandes sunt arteriae, imo interdum lethalis sanguinis profusio contingere; *Botallus*, Henrici III, Regis Galliarum Medicus, machinam aliquam excogitavit atque adhiberi docuit, cuius ope simultaneo ictu, momento temporis, & ictu quasi oculi, membra corrupti carnes una cum ossibus amputarentur. Fabricam ejus Cl. *Hornius* ita describit [d]. „Fiant duæ columnæ ligneæ ponderoso cippo in fixæ, & utrinque per longitudinem interius fulcate. In inferna parte cippi infixus sit firmiter latus culter, acie sua sursum spectans & alterius cultri per fulcum mobilis, aciem sibi oppositam habens. Ubi de truncandum est membrum, superior ille culter, plumbo oneratus, e superiori parte descendit, (*vel potius cum impetu prolabitur*) aut malleo gravi adactus carnem simul cum osse dissecat. Atque hunc modum ad modum indolenter atque expeditum esse, testari *Jo. Regium*. Haec enim *Hornius*“. Sed quamlibet hæc machina fatis ingeniose excogitata fuerit; attamen ejus usus parum in consuetudinem venit, atque minime commendandus mihi videtur. Fieri enim aliter vix potest, quam ut instrumento istoc, vi in membrum adacto, ossa subjecta, præfertim dum ea cava

[c] Sicut in figuris apud *Scultetum* in Armament. chirurgico videre licet, Tab. mihi LIII.

[d] In Microtechnie §. 17. & ab ipso *Botallo* in oper. ab *Hornio* 1660 Lugd. Batav. editis pag. 790.

Tom. V.

F f



cava sunt, non ad perpendiculum semper & æqualiter discindantur sive perfringantur, sed inæquali modo in frusta fortuita atque irregularia, quemadmodum apud laniones & in culina, dum ossa securi disfringere volunt, videmus, dissiliant, & hoc ipso novæ fracturæ aut fissuræ, fistulæque insanabiles facile suboriantur. Quam ob caussam tantum absuit, ut prudentes medici aut chirurgi hanc artus amputandi rationem suo approbaverint calculo, ut illam potius omni dissuadere conatu operam dede-rint. Vid. *Hildani lib. de sphacelo, Schelhammeri Oncologia p. 171.* *Hilfcheri disp. de artuum amputatione rite administranda, Jenæ 1718. 4.* edita; aliique.

V I I.

Longe felicior hac in re fuit *Morellus*, chirurgus quoque Gallus, qui secundum variorum sententiam celebratum illud instrumentum, torcular, Gallis *tourniquet* dictum, divinum sane remedium & sacram fauciatorum anchoram, fausto sidere adinvenit [e]; cuius adjumento truncus arterie brachialis vel cruralis peculiari ratione tamdiu comprimitur, donec mem- brum resectum & arteriæ majores, methodo *Parxi*, ope ligaturæ, vel alia ratione constrictæ, membrumque truncatum rite deligatum est [f]. Atque hac demum ratione artuum amputatio ad hunc perfectionis gradum evecta fuit, ut illa hodie multo minori cum discrimine, quam pristinis temporibus possit administrari: dum haud raro ne uncia quidem sanguinis unica in operatione deperditur, adeoque vires ægrorum egregie conservantur, atque hoc ipso curatio multum promovetur.

V I I I.

Dum vero de brachii amputatione potissimum nobis sermo erit, nolumus jam prolixius hic recensere, quas diversas amputandi rationes chirurgi in pedibus adhibuerunt: cumprimis hic agere possem de ea, quam omnium plenissime Petrus Adrianus *Verdunius*, chirurgus quondam expertissimus Amstelodamensis, peculiari libello, anno 1697. diversis linguis descripsit & cuius inventionem nonnulli *Joungio*, aut *Lowdhamo*, Anglis, aliū chirурго Genevensi, *Saburino* vindicare volunt [g]. Sed prolixitatis ni- miæ hic vitandæ cauſa, nunc solum breviter proponam, qua ratione bra- chii corrupti amputatio hodie à prudentioribus chirurgis perfici soleat. Ut vero in omni operatione, ita etiam in hao, tria cumprimis sunt observan- da. Nimirum (1) quid ante, (2) in, & (3) post operationem fieri opor-

[e] Vid. Lib. gallic. Anonymi titulo *L'art de saigner* cap. 20. p. 322.

[f] Variae torcularis ejusmodi species, & quidem variae multum præ antiquis emendatae videri possunt in chirurgia Parentis, præsertim latina, Tab. III. V. VI. & XIV.

[g] Vid. Parentis Chir. Latina Part. II. cap. 35. ubi de pedum amputatione.



oporteat. *Priusquam ergo ipsa operatio insituitur*, observandum est, an vires ægri adhuc sufficient ad operationem hanc perferendam, eisque adhuc præsentibus, curandum est, ut apparatus huic negotio perficiendo necessarius probe adornetur; ministri feligantur idonei, pro ægro potissimum & brachio probe sustentando, iidemque ad sua munia rite exequenda admoneantur; ægrotans haustu vini vel aquæ cinamomi, vel alio medicamento confortante excitetur, & in sella quadam humiliori medius in conclavi collocetur. Tunc torcular ægro brachio, quodcumque optime placuerit, injiciendum, eoque arteria brachialis usque adeo blande comprimenda, donec nulla amplius ejus infra torcular, & imprimis circa carpus pulsatio sentiri potest. Dein extenso & à ministris firmato rite brachio, retractaque probe cute, funiculus planus lineus, digitum transversum latu, dimidiā fere ulnam parisiinam longus, statim supra illam partem, in quam ferrum immitti debet, circumducendus atque acicula affigendus, eoque caro firmando, ne cedere scalpello possit.

I X.

Quo facto, chirurgus medium inter ægroti pedes locum occupans [b], in loco brachii designato scalpello minori, per sectionem annularem, summan cutem dividit; dein retracta magis cute, vel eodem scalpello, vel alio majori, incurvo, carnem omnem ad os usque dissecat; tunc periostio supra osse gnaviter inciso & derafo, linteum dimidiā ulnam sive tres spathas longum & sex digitos latum, juxta longitudinem ad dimidium fissum in plagam convenienti ratione injicit, eoque carnem partis superioris per administrum, qui a tergo ægri stat, retrahere jubet, ut os altius rescindi, hocque postea facilius carne contegi, atque glutinatio eo ipso promoveri queat: tandem ferram ossi admovet, eaque prudenter hinc inde mota membrum corruptum aufert.

X.

His peractis præcipua chirurgi cura in eo versatur, ut sanguinis ex arteriis profundum cohibeat, & reliquo brachii trunco apta deligatione prospiciat. Prius olim medicamentis adstringentibus, vel ferro candente potissimum tentabatur. Hodie vero ab istiusmodi remedii prudentiores, in humeri præfertim & femoris amputatione, abstinere jubent; dum illa ægro permit nimis horrenda & crudelia existunt, partim minus secura & certa ob-

F f 2 servata

[i] *Garentgeot contra sententiam plororumque scriptorum chirurgicorum præcipit, in operat. chirurg. T. III. cap. de cubiti & humeri amputatione, chirurgum in hac operatione in latere brachii externo stare debere. Sed quum nullam hujus mutationis rationem afferat, præstare puto, antiquum & receptum modum retinere; quia sapissime sic feliciter peracta est, mihiique illo longe commodior & aptior videtur.*



servata sunt. Haud raro enim contigit, ut crusta, his medelis arteriis inducta, post aliquot dies ex improviso resoluta, nova iterum eademque feralis *hemorrhagia* suborta fuerit. Præstat itaque hoc neglecto excogitatum ab ingenioso *Pareo* artificium præcisus vinciendi arterias adhibere; quod variis quidem modis, plerumque tamen hodie ita solet peragi. Relaxatur paululum torcular, & confessim sanguis cum impetu profluiens majorum oscula arteriarum manifestat. Quandoque unicum tantum, interdum duo aut tria se offerunt, in quibus vinctura fili ope necessaria est. His conspectis & notatis imperandum mox est, ut torcular iterum, quantum satis est, constringatur. Tunc maxima illarum, quæ nunquam non in interiori brachii latere sita est, volsella blande comprehendatur, & filo robusto circumjecto deligetur. Post modum, si majores adhuc rami præsentes sunt, illos pari ratione prehendere & vincire oportet. Firmius adhuc vinciri arteriam nonnulli autumant, si per eandem, forcipe protractam, filum acus minoris auxilio transmittitur, & ea tunc demum hoc filo deligatur. Sunt quidam, qui acu curva paulo majori filum ceratum & robustum per juxta positam carnem dupli punctura utrinque sic trahunt, ut arteria in medio collocata una cum insigni carnis juxta positæ portione constringatur: quam ultimam methodum plerique recentiorum non sine ratione præ ceteris commendant, dum hoc ipso præcavetur, ne arteria constringenda filo proxime circumjecto facile disrumpatur.

X I.

Reliquum deligationis negotium ita perficitur: os cum carne vel linamentis carptis siccis eisque multis, vel alcohole vini, aut oleo terebinthinæ calido imbutis contegitur. Super linamentis his injicitur amplum aliquod fungi illius, crepitus lupi aut bovisæ dicti, frustum, huic supradatur emplastrum figura crucis melitensis, accurate membro mutilato circumducendum ac deinde splenium magnum, crucis quoque melitensis similitudinem habens, tandem splenium quadratum, crassum; denique tria splenia longa, angusta, in forma stellæ supra truncum disposita, *splenia stellata* inde dicta, quæ omnia tandem fascia idonea rite firmantur. conf. Parentis institutiones chirurgicæ T. II. c. 34.

X I I.

Novam nec ante auditam *brachii in ipsa humeri cum scapula* junctura amputationem *Dranus*, chirurgus Parisiensis Celeb. primus instituisse videtur [k], quæ operatio unice tunc adhibenda est, quando suprema humeri pars seu caput ejus, uti in scholis vocatur, vel externa violentia vel

[k] Conf. ejus observ. 43, p. 315, & Parentis chirurgia P. II. c. 37.



vel interno morbo destructum atque corruptum est. Peragi autem sequentem in modum solet. Acus quædam magna, eademque curva, quam fere fig. III. tabulae nostræ æneæ exhibet, funiculum sive filum lineum, robustum, e sex vel octo filis compositum & ceratum ducens, in interiori humeri latere, binos circiter digitos infra axillæ sinum, inter os humeri & arteriam brachialem, per cutem & carnem pertundit, & arteria cum carne circumposita ope funiculi transmissi constringitur, tam arcte, ut sub ligatura omnis pulsus evanescat. Tunc binos vel trinos digitos transversos si ad acromio, cutis, pinguedo & musculus deltoides incidatur & ad scapulam usque ab osse solvatur, ubi capita bicipitis musculi abscondenda & ligamenta ipsa articuli incidenda. Hac ratione ossis humeri caput ex scapulæ acetabulo resolutum erit; reliqua postmodum, quæ humeri caput circumdant, ad pollicem usque infra ligaturam sollicite dissecanda sunt & ab osse resolvenda, ubi demum caro & cutis ita in transversum discindi debent, ut totum membrum e sinu scapulæ commodius eximi queat. Itaque cutis cum subjecta carne hic ab osse humeri utrinque resolvitur, ut frustum aliquod ferme triangulare in utroque latere pone alam restet.

X I I L

Humero itaque in ipsa junctura exciso, arteria deligata quærenda est; & paulo supra priorem deligationem nova ligatura, ope acus curvæ minoris, filum robustum vel funiculum trahentis, instituatur, trajecto inter cutem & arteriam filo vel funiculo, eoque postea circa arteriam constricto, prima ligatura, cutem ipsam comprehensens, inflammationis præpedienda causa, iterum resolvitur. Postea frustum carnis inferius pendens, in quo arteria axillaris deligata hæret, sursum, superius vero deorsum adducitur, ut se invicem contingant, eisque scapulæ acetabulum obtegitur, linamenta carpta sicca multa super injiciuntur, quæ emplastro, crucis melitensis formam gerente, firmantur. Huic primo splenium quadratum crassum & amplum, ac postea aliquot ejusmodi sensim majora atque majora supradantur, axillæ splenium rotundum pro comprimenda arteria axillari subjicitur, ad infringendum sanguinis arteriam pulsantis impetum. Hæc omnia splenio duplicato, crucis melitensis figuram præ se ferente, muniuntur, cui tandem adhuc tria splenia longa & crassa in formam stellæ disposita supradantur, quæ singula denique fascia spica descendens dicta, firmantur: plura hac de re vid. in Parentis chirurgia, vel *Dranii* observationibus supra laudatis.

X I V.

Præmittenda hæc fuerunt, ut luculentius appareret, qua in re amputandi ratio, in hac nostra dissertatione describenda, à methodis hactenus

F f 3

cogni-



cognitis differat, & quid ea peculiaris novique habeat. Igitur nunc ad illam ipsam exponendam accedimus, quod optime fieri posse arbitramur, si totam historiam, cuius occasione illa administrata fuit, prius proponamus.

X V.

Walbecca, oppido, quod milliare germanicum Helmstadio distat, mulier quædam 40 quasi annos nata, animi defectione sœpius vexata, eadem subito corripitur d. 6 Octobr. 1737, quum illa sola prope focum ad cibos parandos & coquendos versaretur. Tam infarto sidere tunc concidit, ut brachium dextrum totum in ignem illaberetur. Aliquandiu post ad triste & horrendum visu spectaculum, forte fortuna adventantes, miseram omni sensu ac motu privatam & quasi mortuam, confessim quidem ex flamma eripiebant; sed priusquam aliquis accedisset, brachium jam à digitis ad axillam fere ad os usque ignis violentia destructum, imo magna portio cutis thoracis, latus dextrum obvelantis, consumta erat, quemadmodum ex addita figura I. & II. aliquomodo cognosci potest.

X V I.

Posteaquam ægra vellicationibus ac clamoribus adstantium, spiritibus aliisque remediis, hunc in finem adhibitis, excitata esset, & ad se rediifet, chirurgus sive balneator illius loci protinus advocatus, unguentis & emplastris, quæ alias ad adusta commendantur, læso brachio prospiciebat. Chirurgus alias deinde Helmstadio accersitus, idem omni cura & solertia agebat, ut brachium servaret; sed dum hæc omnia parum essent, chirurgus Helmstadiensis parenti & mihi tristis illius casus historiam retulit, nostrumque petiit consilium. Quo facto ad ægram cesumque rarissimum & notatu dignissimum videendum cum chirurgo hoc *Walbeccam* ipse me contuli, die, qui decimus erat ab hujus calamitatis initio.

X V I I.

Deprehendi conditionem mali ita comparatam: manus cum digitis, totus cubitus & humerus, ad duos digitos transversos sub ejus capitulo, ad os usque destruncta erant; vid. Fig. I. ab A ad B & C C. Hinc & inde ossa prorsus nuda conspiciebantur, hinc & inde quidem musculi, vel potius tantum reliquiæ muscularum adhuc hærebant, sed exusti, nigricantes, aridi, instar carnis fumo induratæ, & exsangues animadvertebantur; scalpello enim incisi nullum sondabant cruentem, omnique motu & sensu privati erant, ligamenta quoque circa articulos maximam partem ignis vehementia corrupta, vix amplius ossa colligabant. (vid. fig. I. brachium à parte anteriori & fig. II. à parte posteriori repræsentans.)

Nul-



Nullus sensus, nullus motus, nulla arteriæ pulsatio ab A ad B & D supererant. Vis ignis ulterius progressa erat, & ut fig. I. exhibet, a B & D ad CC, magnam portionem cutis musculos, pectoralem, deltoidem, cucullarem aliosque hæc loca occupantes, tegentis consumserat, ita ut partes musculosæ prorsus denudatae in conspectum prodirent; quæ tamen jam à crux adusta purgatae, recentes, rubicundæ, acutissime sentientes atque ad minimum contactum atrociter dolentes animadvertebantur, eoque ipso vitam adhuc iis inesse manifestabant. Itaque re curiosius examinata, partem ab A ad viciniam B & D, prorsus destruetam & mortuam cognovi, adeoque hic non nisi miserum, sed unicum ab amputatione auxilium exspectandum esse judicavi.

X V I I I.

Sed non leves circa ipsam amputationem difficultates se se offerebant. Torculari enim hic locus non erat; quia proxime fere sub axilla amputatio institui debebat, & quia propter denudatam carnem, B C C D, acutissime sentientem & ad levissimos contactus vehementissime dolentem, applicari non poterat. Deinde si torcular non adhiberetur, metuendum erat, ne durante operatione ex arteria brachiali funesta sanguinis profusio accideret, præsertim quum ægra ob diuturnitatem mali & vilem parcissimum que victum, quia pauperima erat, defectumque remediorum roborantium jam omnibus propemodum viribus orbata erat.

X I X.

Quam ob rem, quum propter caussas modo adductas *amputatio consueta hucusque methodo perfici non poterat*, & tamen ægra sine illa non restituī, aut a combusto hoc miserandi aspectus brachio liberari, in consilium chirurgus Helmstadiensis *Vossius* & ego adhibuimus parentem, eique casum, ut modo ipsum descripsi, retulimus. Hic igitur re ponderata, auctor fuit, ut sine torculari adhibito, acu magna, filum duplex robustum trahente, quam hunc in finem ex armamentario suo chirurgico nobiscum communicavit, (vid. fig. III.) caro brachii adhuc reliqua juxta caput ossis humeri, inter os humeri & arteriam brachiale, perforetur, filoque trajecto in interiori brachii parte, quæ litt. D. Fig. I. indicatur, arteria una cum carne cruda & cute per ignem orbata, fortiter nodo constringatur, sicuti fere fieri solet, quando brachium ex articulo humeri excinditur. Postea idoneo scalpello infra hanc ligaturam carnem in circuli figuram, ut alias in amputationibus horum artuum fieri solet, esse discedendam, os serra, consueta ratione resescendum, ac denique, deligationem fere ut in casu, ubi brachii os ex articulo excisum est, esse instituendam. Hoc itaque consilio instructi, instrumentisque & reliquis ad-

de-



deligationem necessariis præparatis, ad ædes ægræ una cum multis medicinæ & chirurgiæ studiis, inter quos etiam Nob. Respondens noster erat, abivimus, ubi operatio hæc nova, sequentem in modum administrabatur.

XX.

Neglectis & omissis torcularibus omnibus, *acus prædicta magna, incurva, filum duplex robustum, illudque ceratum trahens, in loco brachii D, proxime ad os à chirurgo, supra jam laudato, Vojso, dum quidam minister brachium extensem, alii ægram continebant, per carnem ita, ut Fig. I. lit. D. demonstrat, pertinidebatur & circa arteriam brachialem circumducebatur, filoque deinceps arteria, una cum reliqua vicina carne, firmiter constringebatur. Deinceps scalpello paululum infra hanc ligaturam caro circumcirca ad os usque dissecabatur, & remoto per scalpellum peristio, tandem admota serra os ipsum resecabatur; adeoque tota amputatio hac ratione quasi per compendium, sine ulla notabili sanguinis profusione administrata est. Torcular enim nullum adhibitum, nec necessarium fuit; nec post resectionem volvella, qua arteria comprehendi alias & protracti solet, opus erat, nec ulterior vasorum hac volvella protractorum deligatio; nec stypatica medicamenta, nec ferra cudentia in auxilium vocabantur; sed truncostatim, ut alias moris est, linamentis carptis, emplastris & spleniis crassis prospiciebatur, quæ omnia deinceps fascia prælonga eo modo, ut in amputatione in articulo, firmabantur.*

XXI.

Sanationis negotium, nullo gravi vel insinuato symptomate superveniente impeditum, per medicamenta balsamica & raram deligationem ex voto succedebat. Octiduo enim nondum præterlapso, quum tertium deligaretur, filum, quo arteria ligata fuit, sponte successit, sine ulla sanguinis profusione, & medicamenta interna vix alia in usum vocabantur, præter semen ita vulgo dicti feniculi aquatici seu equini, nostratisbus Pferde Saat dicti, cuius in dissertatione de hernia incarcerateda, suppurata, sepe non lethali D. Gladbachii medici nunc Zerbstensis, amici mei suavissimi, sub parentis mei præsidio mense martio hujus anni habita, mentio facta est, & quod à vulgo in vulneribus, ulceribus & omnibus noxis gravioribus externis his in regionibus maximopere usurpatur, atque propter admirabilem in istiusmodi malis persanandis efficaciam miris celebratur laudibus. Plantam hanc Phellandrium J. Baib. esse, superiori æstate observare licuit. Ipsa paupertas ægrotantem strictam & tenuem observare diætam imperabat. Hac ratione post decursum aliquot hebdomadum vulnus hoc amplissimum, B C D, glutinatum & curatio ad optatum perducta fuit finem. Sed parvus ille humeri truncus, qui remansit, ita cum thorace coaluit, ut nunc vix ullum ejus



ejus vestigium possit animadverti. Interim mulier ad hunc usque diem vivit, & ceterum bene valet.

X X I I .

Posteaquam tristem brachii, per ignem destruci historiam, & singularem, hac occasione excoigitatam, illud refecandi rationem descripsimus, operæ pretium nobis esse videtur, ut *iii usus* & *commoda novæ huius amputandi methodi paulo uberioris* inquiramus. Dispiciamus itaque, quibus aliis in casibus illa cum successu applicari & in quibus reliquis methodis vel præferri, vel æquiparari saltem queat; ne nobis forte objiciatur, eam solum unico hoc in casu adhiberi potuisse, tales casus raro occurrere, in aliis vero eam inutilem, adeoque non magni momenti esse.

X X I I I .

Quilibet autem facili negocio perfpiciet, eam reliquis anteferendam esse methodis, *si brachii ambustiones similes* huic, qualem §. XV. seqq. descripsimus, incidunt: rationes §. XVIII. seqq. indicate hoc extra dubitatis aleam collocabunt. Ejusmodi vero combustiones non adeo infrequentes esse, haud ignorabunt illi, qui vel castra sequuti sunt, vel graviora incendia & noxas inde illatas viderunt. Igitur, si etiam his solum in casibus utilis esset nostra amputandi ratio, mihi tamen propterea non videtur rejiienda; sunt enim plures curandi viæ tam in medicina, quam in chirurgia, quæ in certis tantum noxis, rarius etiam obviis adhiberi possunt, & nihilominus dignæ censentur, quæ in posterorum usum annotentur: ut, si similes denuо occurrant, inde, quid agere debeant, noverint. Insignem utilitatem rariores conscribendi observationes in medicina egregie nuper evicit Joseph. Anton. Puiatus, medicus Italus, in præfatione præmissa observationibus suis rarioribus, Venetiis 1737. 8. editis.

X X I V .

Ne quis ergo existimet, eam in solis ambustionibus adhiberi posse, iam sum commonistratus, quod etiam aliis adhuc in malis egregio cum successu in usum vocari queat. *Quandonam enim ab externa violentia, rota verbi gratia, præsertim molari, aut aliarum quarumcunque grandiorum machinarum, brachium circa partes superiores laceratum, collisum aut comminutum atque à cute sua denudatum* effet, ita, ut propter cutis absentiam aliasve caussas torculari locus non sit, brachium tamen servari nulla arte posset; amputatio secundum leges §. XIX. & XX. descriptas, omnium optime instituetur.

Tom. V.

G g

XXV.



XXV.

Imo crediderim, me nil absconi suadere, si hanc methodum *in plerisque brachii sive humeri amputationibus*, præsertim quando paulo altius membrum resecandum esset, omisis etiam torcularibus, commendarem. Ægro scilicet in convenienti situ collocato, acus funiculum trahens haud procul à loco, resectioni destinato, eadem prorsus, ut in ægra nostra factum est, ratione, inter os & carnes, in interiori brachii latere prudenter trajiciatur, filum autem funiculus, remota acu, in interiori brachii latere probe postea constringatur, carnes deinde idoneo scalpello, circa os humeri, in loco, pro amputatione electo, dissecentur, & tandem reliquum amputationis negotium more consueto absolvatur. Multa inde & profecto haud exigui momenti commoda evenient. Carere enim sic torculari possumus, cuius applicatio operationis actum diurniorem, ægro molestiorem, magisque terribilem facit: & tamen sanguinis profusio, per ligaturam arteriæ, ante carnes dissectas factam, cohicitur. Imo totum amputationis negotium hac ratione longe citius & multo minoribus difficultatibus, quam alias absolvitur. Etenim in consueta methodo post amputationem vitiati membra arteria, laxato prius ac rursus constricto torculari, moleste investigari, forcipe arripi & ligari, vel acubus circumjectis tandem vinciri debet, quæ omnia profecto difficilius sœpe succidunt, quam multi putant, & interdum sat longum tempus requirunt. Nonnumquam etiam arteriæ acubus & filis hic se rursus subducunt, ita ut arteria, quæ putatur esse ligata, non sit ligata; aut saltem tam leviter, ut brevi post deligationem, aut jam in ipsa deligatione, præsertim, ubi fortior sanguinis motus adest, ligatura à vase rursus recedat, unde novus, isque periculosisimus, sanguinis fluxus subsequitur, qui fascias omnes, splenia ac linamenta removere, & totum fere opus reiterare cogit. Interdum filum arteriam proxime ambiens illam disruptum, quod pariter sine insigni cruxis profusione fieri nequit. Hoc etiam nostro artificio præpeditur: dum arteria cum multa carne circumposita simul ligatur, adeoque quasi involvitur & defenditur, ne à filo facile diffingatur. Atque sic etiam obtinemus illud, quod nonnulli recentiorum, sed longe operosiori via moluntur, quando post peractam amputationem acu curva, paulo majori, filum ceratum per juxta positam carnem, dupli punctura, sic trajiciunt, ut arteria, in medio collocata, simul cum carne ligetur, vid. supra §. IX.

XXVI.

Si hanc operationem accuratius consideramus, apparet, *eius usum latius adhuc, quam ad solam amputationem se extendere*. Etenim in variis arteriæ brachialis vulnerationibus, ubi os graviter simul lœsum, sive collisum, ruptum, aut ablatum est, hæc brachii, ope majoris acus perforatio & arteriæ



teriæ per filum constrictio tanquam tutum, certum, minusque prolixum sanguinis profluvium cohibendi remedium adhiberi poterit. Sic ex gr. quando à globo tormenti bellici majoris brachium maximam partem esset ablatum, atque os humeri simul cum arteria brachiali perruptum, ubi ob enormem hæmorrhagiam summum vitæ periculum est, chirurgi præsentis prima cura in eo verisetur, ut ab adltante arteria ope digitii versus os humeri truncatum confestim & fortiter quidem prematur; deinceps absque adhibito torculari acum paulo majorem, filum seu funiculum planum trahentem, ad spatium pollicis vel duorum fere digitorum supra vulnus in interiori brachii latere ita transmittat, quemadmodum in ægra nostra factum est, & sicut in Fig. I. nostra conspicitur; funiculum posita circa truncum arteriæ nodo firmo constringat, tunc ossium spinas forte prominentes serra vel forcipe auferat, carnes vero inæquales & laceras æqualiter scalpello aut forcice resecet, denique brachium, ut supra descripsiimus, solerter deliget.

X X V I I .

Si glande plumbea minoris tormenti bellici, sclopeti, Gallis pistolet, fucil vel mosquet dicti, arteria brachialis vel sine osse humeri, vel cum osse transfossa, & spes brachium servandi non esset, simili prorsus ratione, quammodo indicavi, vas super vulnus ligari poterit. Eandem curandi rationem in vulneribus hujus arteriæ, gladio vel telo vel qualicunque alio instrumento secante aut pungente, infictis, præsertim ubi periculum in mora, vel brachium ~~verpox~~ jam fuerit passum, locum quoque invenire, quis non videt? Sique hanc methodum chirurgi in castris observarent, ubi his casus saepè occurunt, multos servari posse existimo, qui ea neglecta ob sanguinis profluvium brevi periire coguntur. Propter hæc commoda auctor ego sum chirurgis omnibus, præsertim castris, ut acum semper magnam, curvam, inter instrumenta portatilia gerant; quia saepè numero accedit, ut vulneratis ejusmodi e vestigio succurrentum, ubi vel torcular ad manus non est, vel non sufficiens torcularium numeros præsto est, quando nimis plures ita vulnerati sunt, sicut in bello haud raro contingit.

X X V I I I .

Tandem etiam asseverare non dubito, hunc sanandi modum *in ipsis anærysmatibus* tam spuriis, quam veris, circa partem superiorem arteriæ brachialis existentibus, tollendis, egregia præstare commoda, præcipue si judicatur, brachium alia ratione servari non posse. Si enim secundum hujus methodi regulas curatio suscipitur, & arteria in *spatio* pollicis seu duorum digitorum supra locum læsum ligatur, opus non erit, sicut alias in horum malorum curatione fieri debet, torcular prius ægro brachio injicere, cutem dein cum carne secundum longitudinem incidere, arteriam molesta-



ac dubia perquisitione investigare, quod sine multis difficultatibus, magnisque doloribus peragi saepe non potest. Nam facile hic in loco sanguinolento & impuro pro arteria nervus aut vena praesertim à minus exercitatis ligatur, dum arteria est liganda, & reliquæ partes frustra ligantur.

XXIX.

Interdum arteria prope plagam tam in vulneribus, quam aneurysmatibus variis ob causas putrefit, uti plures notarunt auctores, atque etiam à parente observatum est; quo in casu, licet ligata fuerit, facile tamen iterum, propter inductam à putredine mollitatem, vel per filum diffringitur, vel per sanguinis impetum perrumpitur, unde periculosa, quandoque lethifera crux profusio subsequitur, quod in hoc nostro procedendi modo vix pertimescendum erit. Notandum quidem hic est, me cum parente [1] his in casibus amputationi semper preferre ligaturam arteriæ, brachio adhuc relicto, quia saepe per hanc brachium servatur. Interea quia multi, læsa hac arteria, brachii amputationem suadent, atque etiam instituunt; hi & quicunque eorum curandi modum sequi malint, longe promptius & commodius brachium secundum methodum nostram, quam aliis methodis hucusque usitatis auferre poterunt.

XXX.

Nostrum igitur artificium arteriam ligandi & sanguinis profluvium cohibendi, quod hactenus exposuimus, laudatissimo Morelli invento, torculari scilicet, saepe nil cedere, sed anteferendum adhuc esse, nulli dubitamus. Patet enim eo adhibito frequenter nos torculari omnino carere posse. Si vero torcular omittitur, operatio longe celerius perficitur, quia ejus applicatio satis longum temporis spatium requirit. Igitur noster modus, quum ob simplicitatem, quia minor instrumentorum apparatus est necessarius, tum ob celeritatem egregie se commendat. Imo historia à nobis supra descripta edocet, interdum fieri, quod ad illum, ubi ne torculari quidem locus est, tanquam ad sacram anchoram confugere queamus, sine qua ægri servari haud possent.

XXXI.

Prævideo mihi objici posse, quod non semper una tantum magna arteria in brachio adsit, sed sepenus uno due; propterea si etiam una nostro consilio ligata fuisset, alteram tamen deinceps in & post resectionem periculofam crux profusionem concitaturam fore, id quod in ceteris hucusque confutatis methodis metuendum non esset. Sed respondeo, primo duas arterias magnas non semper præsentes esse, cumprimis circa brachii partem superiorem; adeo-

[1] V. ejus compend. anat. Tom. II. Nota 66. de arteria brachiali, & chirurgia.



adeoque si unica tantum adest, modus noster salvus manet. Quia vero interdum præsertim circa medianam aut inferiorem partem truncus in duos ramos dividitur, chirurgus hac in operatione semper simul volsella & acu filum robustum trahente instructus sit, ut, si altera arteria fundendo sanguinem se proderet, illam mox arripere & ligare queat. Ne autem sanguis interim nimis effluat, juxta alam arterie truncus pollice vel digitis ministri cujusdam probe comprimatur, quo fit, ut sanguis eodem fere modo, qua à torculari vas compressum esset, cohibeatur.

XXXI.

Antequam finem huic dissertationi imponimus, restat, ut aliquam adhuc quæstionem diluamus. Quæri enim potest, *si brachium, in quo arteria brachialis deligatio juxta methodum à nobis commendatam instituenda, cute adhuc tectum est*, utrum cutis simul cum arteria & carne liganda, vel an prius incidenda sit. Sunt enim nonnulli, qui ex constrictione graves inflammations, dolores, aliaque mala pertimescunt. Me quidem judice symptomata adeo gravia inde fecutura non erant. Hoc ex eo conjicio, quia tubercula magna tumoresque varii per ligaturam plerumque sine gravibus supervenientibus malis tolluntur, licet cutis undique à filo constricta sit. Qua in re tanto magis confirmor, dum vel ipsorum magnorum brachii nervorum, qui juxta arteriam brachialem siti sunt, & in ægra nostra sine dubio simul cum reliqua vicina carne constricti fuerunt, nullum prorsus symptoma, nullisque novos dolores vel alia, quæ ante non aderant, concitarunt. Intervim hanc rem ulterius adhuc observationibus & experimentis explorandam esse arbitror. Si autem fortassis præter spem & opinionem à cute simul per ligaturam constricta graviora mala oborirentur, mederi iis novo artificio possemus. Nimis antequam filum constringitur, ab uno acus vulnusculo ad alterum oppositum, (quæ fig. I. inter litt. B & D ostendit) dum acus adhuc in vulnere hæret, cutis scalpello transversim caute incidatur, postea acus trajiciatur, funiculus constringatur & nodo probe firmetur: vulnus tandem linamentis impleatur, ac spleniis fasciisque convenienti ratione diligetur.

XXXII.

Denique eadem hæc observatio, cuius occasione dissertationem nostram potissimum conscripsimus, adhuc magni in chirurgica momenti edocet: scilicet ne nervorum quidem, eorumque maximorum, quales circa locum illum, ubi acus D fig. I. transfixa fuit, siti sunt, ligaturam ullum grave produxisse symptoma. Adeoque supervacaneum videtur illorum monitum, qui in amputationibus præcipiunt, in arteriis ligandis nervos prius ab iis separandos esse [m], ob metum, ne rigores sive spasmi aut convulsiones nervorum ligaturæ superveniant.

G g 3

XXXIV.

[m] Ut Dionis in operat. chirurg. pag. mihi 618.



Ultimo adhuc monendum esse existimavi, eadem artificia, quorum usum in brachii amputatione vel brachialis arteriae noxis haec tenus exposuimus, in variis quoque femoris & arteria femoralis lesionibus, praesertim, quae amputationem requirunt, felici cum successu applicari posse. Fortassis adhuc melius & tutius arteria cruralis, quam brachialis ligari poterit? nam maximi pedis nervi arteriam hic non comitantur, sed a parte posteriori descendunt. Res autem haec ulterius experimentis est confirmanda, ad quae instituenda chirurgos castrenses, vel qui in magnis urbium nosocomiis artem exercent, ubi facile nova tentare licet, serio hortamur. Interim quicunque hanc operationem vel in brachio, vel femore suscipere cupiunt, hi ante omnia curae cordique habeant, ut situm arteriarum majorum, his in locis praesentium, accuratissime cognoscant.

XXXV.

Novam igitur amputandi rationem, quam hac in dissertatione tradidimus, multiplicis & haud exigui momenti utilitatis esse, nos satis nunc demonstrasse arbitramur. Et quamvis methodi amputandi hac ipsa multiplicatae fuerint, longe tamen abest, quod istiusmodi multiplicatio inutilis sit, vel noxia, quin potius in difficilioribus praesertim operationibus chirurgicis commendari mereatur: sicut hoc cum celebri Morando Paren in chirurgia latina, ubi diversas calculum extrahendi methodos exponit, uberius confirmavit.

COROLLARIA.

- I. Chirurgia plus ratione, quam empirica nititur.
- II. Tota chirurgia est mechanica.
- III. Chirurgia est antiquissima medicina pars.
- IV. Ergo medicina mechanica, qua vulgo hodie recentissima habetur, est antiquissima.

J O H.



C X L I

J O H . F R I D . T S C H E P I I

S O L D A V . P O R U S S.

C A S U S D E

A M P U T A T I O N E F E M O R I S

N O N C R U E N T A.

Hale 1742 Octobr,



Landesbibliothek Oldenburg