

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLVI.

VD18 90538986

CXLIV. Petri Castell Experimenta Quibus Varias Humani Corporis Partes
Sentiendi Facultate Carere Constitit.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16618

CXLIV

P E T R I C A S T E L L
E X P E R I M E N T A
Q U I B U S
V A R I A S H U M A N I C O R P O R I S
P A R T E S S E N T I E N D I F A C U L T A T E
C A R E R E C O N S T I T I T.

Gottingæ 20 Jan. 1753.



Landesbibliothek Oldenburg



P R O O E M I U M.

Quum constituissem, pro impetranda legitime medicinam, quam adhuc discere studui, profitendi exercendique facultate conscribere dissertationem ac specimen publicum edere; primum elegeram argumentum de venarum valvulis, quas novo studio perquirere satis opera dignum videbatur. Hoc animo complures venas in ipsis corporibus humanis perveſtigavi, copiam cadaverum faciente instructissimo Gottingensi theatro, valvulasque indagavi, quarum etiam sedes & loca annotavi, descriptaque servo: adeoque brachii venas magnamque saphenam cum valvulis suis appositis delineandas curavi. Sed, quenquam Perillustris theatri anatomici Praefectus, Generosissimus Dominus De Haller, mihi corpora & partes, quantum per numeris & reliquorum theatri laborum rationes fieri potuit, liberalissime indulserit, eique ego pro hoc pariter ac ceteris plurimiis sui favoris documentis & benefacti magnas debeat gratias publiceque agam; tamen hanc sufficere visu sunt ex, quas interim colligere licuit, observationes ad plenam perfectanve, quallem meditabar, valvularum venosarum historiam condendam, praesertim quum, ut in anatomicis operibus fieri solet, non inquinam corpora membravae, propter adversam aeris temperiem, corrumpentur, ut iis ad propositum meum uti non possem, aliaque saepius incidenter inquisitionum meorum impedimenta. Quin igitur viderem, alteram adhuc biemem, qua tempestate anatome celebrari corporaque afferri solent, exspectandam fore, quo ceptum opus ex sententia perficerem: mihi vero tamdiu in dulci Georgia Augusta commorari non licet; aliam tractationis materiem circumspicere coactus sum.

Quod consilium quum agitarem, deque ea re Perillustrem Preceptorem, magnum Hallerum convenirem, ut ex ejus potissimum arbitrio novum exercitationis argumentum iterum constitueretur; Generosissimus Vir mihi experientia proposuit instituenda, que certas corporis partes, quibus vulgo eximia sentiendi facultas adscribitur, sensu plane carere confirmarent: eamque rem hoc magis disputatione dignam judicavit, quod adhuc sint, qui Cl. D. Zimmermanni de sensibilitate tenditum assertis in Diff. sua inaugurali de Irritabilitate, Gottingae MDCCCLI, propositis, fidem adhibere nolint.

Evidenter hanc dubitavi consilium sequi optimi mei Preceptoris: itaque ejus ductu, praesidio, suppetuisse non modo in iis partibus, in quas Cl. D. Zimmermannus inquisivit, nova pluraque cepi experimenta, sed in aliis similiter explorandis, quas necdum menuini ab illo hac fini experimentis esse solicitatas, operam & studium collocavi. Neque tantum in experimentorum effectibus observandis occupatus fui, aut in iis acquievi, sed quoad temporis praestitutus terminus & virum imbecillitas permisserunt, propositam doctrinam conexa ratione explicare atque afferre conatus sum. Etsi vero potissimum animantia

Tom. V.

P p bruta



bruta ad observationes faciendas adhibuerim; tamen, ubicunque vel à viris fide dignis accepi, vel ipfemēt animadverti, ea, quae in animalibus acciderunt, pariter in hominibus evenisse, hęc, sicut deprehensa sunt, subjici.

Facile credo fore plurimos, quibus sententia nostra difficillime ad assentendum videatur, & qui fortassis meam elevent operam, quod juvenis vetustam doctrinam convellere allaboraverim. Et sane fateor, quum primum ad hanc materiam aggrederer, animoque obversaretur, quot & quanti viri contrariam opinionem secuti sint ac propugnaverint, quorum auctoritas relinquenda confutandaque foret, me pene à scribendo deterritum fuisse, ac nimis audax incepsum putasse, si ego tanquam puer viris adversari, velut Troilus Achilli, vellem. At quum simul mecum reputarem, opus suscipi & ab aliorum sententia discedi hortatore & approbatore summo viro, qui ipse antea receptam vulgo doctrinam fecutus, nunc experimentorum vi ac veritate victus, mentem mutaverit; additus iterum est animus, ut aliena à vulgaribus placitis proponere non amplius vererer. Quapropter etiam spero atque confido, equos rerum iudices, si perpendent, me experimentis rite accurateque captis, praesertim quum suavissimus atque humanissimus Praeceptor plurima eorum ipse instituerit, demum in novam concessisse sententiam, mihi veniam datus, quod oculorum potius & sensuum testimonio credam, quam iis, que vel ab auctoritate aliorum vel ab antiquitate fidem invenerunt, vel à solo mentis ratione robor acceperunt. Quis enim est, qui nesciat, insignes & penitentem viros gravissimis erroribus implicitos fuisse, erroremque semel suscepit longa deinde seculorum serie propagatum, & semper magis confirmatum, tandem difficillime iterum eradicari potuisse? Deinde optabile modo foret, ut quilibet, imprimitusque ii, qui rem in dubium vocant, vel ipsi experimenta instituere, vel aliorum experimentis interesse, haud gravarentur: tum nullus dubito, modo recte omnia acta sint, quin plane, sicut nos, rem se habere deprehensi, & suum nobis assensum haud abnegaturi sint.

Ut vero proprius ad tractationem ipsam accedam, materiam in sex capita dividam, quo ordinatus singula tradi & sub conspectum collocari possint: & in Ia quidem Sectione exponam, quae circa Tendines observavi & commentatus sum: in IIa similiter agam de Ligamentis: in IIIa de Periosteō Pericranioque: in IVa de Pia Matre: in Va de Pleura: in VIa & ultima de Peritonæo. In singulis capitibus eum tractationis ordinem servabo, ut thesi primum proposita, statim subiungam facta experimenta observationesque, & tum dentum ubiorem inde doctrinam eliciam atque deducam. Faxit Deus feliciter!

S E C T I O



SECTIO I. DE TENDINIBUS.

PROPOSITO.

§. I.

Tendines omni plane sensu carent : & vulnera ipsorum nec periculosa , nec lethalia sunt.

EXPERIMENTUM I.

§. II. Canis stantis , quem aliquis amicorum capite prehensum tenebat palpabatque , per cutem , ab exteriore latere dextri pedis , tendinem Achillis lanceola pupugimus . Nihil fere animadvertisit canis ; nullam enim vocem emisit : sed potius ad allicientem procepsit , eique cauda alludens hilarem prodidit animum . Idem &que commodo incessu gavisus est ac antea : neque prius lambit vulnus , quam illud spiritu vini , quo sanguis susteretur , ex dissecta Saphena minore profluens , tinixeramus . Postea vero vulnus omnino contempsit , & alacer obambulavit , & quum panis porrigeretur , & avide devoravit , & vegetus circumcurrit . Exacto horæ spatio ejusdem canis in sinistro pede tendinem magnum , sive Achillis , ab exteriore latere bis eadem lanceola iterum pupugimus , eodem ut antea servato modo , nisi quod nulla vena pertusa fuit . Nihilo plus animadvertisit : & quum allelo frustum panis paulo altius offerretur , in posteriores pedes se erexit , & constitit panem captaturus . Deinde per tres adhuc integras horas eum comedem observavimus , neque deprehendere potuimus ullum vulnerum factorum sensum perceperisse : nam nunquam ea lambendo contigit ; quum tamen aures ipsis vulneratis pedibus sepius scaberet . Denique ipsum per plures dies continuos nobiscum in conclavi retinuimus , quo toto intervallo bene se habuit , nec convulsionibus , nec aliis symptomatibus conflictatus est .

EXPERIMENTUM II.

§. III. Canem præcedente haud multo minorem , mensæ impositum , cuę tantum in cervice leniter apprehensum teneri curavimus , tumque per cutem , à latere interno , chordam magnam dextri pedis scalpello anatomico pupugimus . Qui , quum caput libere movere posset , hoc eo ipso momento , quo punc̄tio fiebat , circumvertit ad locum inflicti vulneris , non alio gestu , quam si muscam pungentem abigere vellet : quum vero

Pp 2 deinde



deinde libere dimissus esset, læsam partem plane negligenter habuit, & alacriter hilariterque ad eos progressus est, qui ipsum allicerent. Dehinc in ventrem procumbere coëgimus, & dum ab uno amicorum in hoc situ tenebatur, ab altero autem pes posterior sinistri extendebat, nos ab interiore pedis latere minutum cuti foramen infiximus, tendinemque magnum in parvo spatio denudavimus. Quæ dum agebantur, leviter quirritabat canis, atque e manibus comprehendentium se eripere nitebatur. Igitur præstolati sumus, donec ad quietem rediisset, quo factò scalpellum per nudum tendinem usque ad medium circiter adegimus. Nihil ejus percepit: permansit enim quietus, neque pedem retrahere tantillum conatus est, quemadmodum in incisione cutis fecerat. Sic illum in terra positum dimisimus: ille vero statim discurrit lætus & alacer, vulneraque accepta nec quicquam curavit. Quando frustum panis eminus ostendebatur, sustulit se arrectum, pedibusque extremis ingrediens eum secutus est, qui cum porrecto pane paululum retrocesserat. Quotiescumque postea ipse hunc canem vidi, semper eum alacrem vegetumque reperi, cursitantem, ac nullius unquam incommodi participem.

E X P E R I M E N T U M III.

§. IV. Hædum acceperimus, & in eodem situ, quo canem in priori experimento secundo, composuimus, tum in alterius pedis interiore parte, disjecta cute, exiguum magnæ chordæ spatium denudavimus. Dum hoc fiebat, balavit animal. Deinde scalpellum in tendinem intrusimus: tum vero ne mutavit quidem, neque ullum sensus aut doloris signum edidit: & quum mox in solo collocatus esset, æque commode incessit parilesque saltus peregit ac antea. Neque ullis posthac convulsionibus aliisve malis conflictatus est.

E X P E R I M E N T U M IV.

§. V. Canem, quem ad primum experimentum adhibueramus, & in quo nullum adverſæ valetudinis vestigium deprehendebatur, post intervallum duorum dierum in asſere resupinatum, ore constricto, ne mordere posset, collocavimus, pedesque ejus extensos eidem, cui impositus erat, asseri firmiter alligavimus. Tum extensem alterius tibiæ parum denudavimus; quod canem perturbavit, gemitusque exprefſit. Postquam vero caput ei permulsum est, iterum tranquillus fuit, neque amplius gemuit. Deinde extensem tendinem scalpello primum irritavimus, seu vellicavimus: nihil animadvertis. Mox eodem scalpello tendinem compunximus: nihilo magis commotus est. Simulac vero volfella cutem apprehensam leviter modo vellicaveramus, cœpit lamentari seque jactare. Similiter fefit,



gescit, quem extensem alterius tibiæ repetito statim experimento sollicitaremus. Tandem vinculis solitus, perinde commode gressus fecit, ac si nihil ipsi accidisset, hilaris fuit, vulnerumque plane oblitus, ea lambere omisit: contra subinde iisdem pedibus sine sensu molestiæ corpus scalpsit. At si loca vulnerata contrectarentur, eo caput convertit, vulneraque lingua tergit.

E X P E R I M E N T U M V.

§. VI. Canem, quem pridie ad experimentum secundum instituendum adhibueramus, quique admodum latus ac vegetus erat, eodem, ac in proxime prægresso experimento dictum est, modo ligavimus. Quo facto, parvum foramen cuti pedis alterius infliximus, quo extensor tibiæ aliquantum denudaretur. Hoc se percipere, jactatione ululatuque significavit. Denudata parva tendinis portione, & animali tranquillitati redditio, scalpellum profunde in extensem demisimus: ne minimum quidem doloris percepit; nam plane quietus restitit. Quam primum vero cutis alterius pedis incidebatur, ad denudandum similiter extensem, ejulare cœpit. Quod quum facere desisset, hunc tendinem scalpelio lacestivimus, adeoque compunximus: jacuit immotus, nihil actorum percipiens. At quum volsella cutem apprehenderemus comprimeremusque, cœpit iterum quietem amittere & ejulare. Deinde eum vinculis solitis dimisimus: circumcursavit, quasi escam querens, quia, quum in theatro anatomico versaremur, sine dubio carnium odorem percipiebat. Simulac vero vocabatur, venit, &, ostendo cibo sursumque sublato, arrectus extremisque pedibus innexus processit.

E X P E R I M E N T U M VI.

§. VII. Hædum, similiter ac canes præcedentes, apte alligavimus, excepto quod os liberum reliquimus, quandoquidem hoc pecus non mordet, atque sensum doloris optime balatu manifestat. Huic quoque cutem dissecuimus, & extensem unius tibiæ ex aliqua parte denudavimus: quod sentiens, balavit. Tum scalpellum intrusimus in dictum tendinem, ibi per aliquot momenta reliquimus, iterumque extraximus: nihil horum omnium animadvertisit, siquidem nullam vocem emisit. At quum cutis pauxillum modo volsella vellicaretur, exemplo vociferatus est. Similiter se gescit, quum statim post in extensem alterius tibiæ idem experimentum repeteremus. Vinculis liberatum animal incessu ut antea valuit, subinde solitos saltus peregit, lac potavit, perpetuaque alacritate gavum est.



E X P E R I M E N T U M VII.

§. VIII. Catellum dorso incumbentem manibusque comprehensum ita collocavimus, ut os & caput libere movere posset. Tum incisa cute extensem tibiae una cum ligamento denudavimus: exclamavit ille; magnamque inquietudinem testatus est. Exspectavimus, donec palpo permulsus tranquillitatem receperisset: quod ubi factum erat, ligamento tantisper quidem intentato relicto, tendinem aliquoties scalpello compunximus: ille vero omnis sensus expers fuit. Ait incisione cutis tantum leviter producta, confessim ejulavit.

E X P E R I M E N T U M VIII.

§. IX. In Canem, quem ad explorandum pleuræ sensum destinaveramus, antequam hoc fieret, postquam in apto situ collocatus constrictusque erat, extensem tibiae more consueto denudavimus. Quum cutis incidetur, haud parum anxius fuit canis, adnitens se in libertatem vindicare, gemitusque ciens, quia propter obstrictum os altum ejulatum edere non poterat. Post aliquod temporis intervallum tandem sedatus fuit tumultus, iterumque conquievit: tum longam acum sarcinariam (*eine Paknadel*) in extensem tendinem ab inferiore parte sursum versus intrusimus, ferme ultra pollicis spatium, eamque aliquandiu in vulnere relictam, iterum aliquoties paululum retraximus, totiesque denuo intrusimus, postremo totam extraximus. Tamen ista omnia ne minimum quidem affecerunt canem: tenuit enim tranquillitatem. Tum vero secta paululum iterum cute, continuo dolorem jactatione gemituque declaravit.

E X P E R I M E N T U M IX.

§. X. Canem, quem ad primum & quartum experimentum adhiberamus, binis post ultimum exactis diebus, in ventrem procumbentem, ore constricto, quatuor pedibus distensis alligavimus. Tunc à posteriore parte cutem dextri pedis incidimus, ad retegendum aliquatenus tendinem Achillis: quod se sentire, inquietudine demonstravit. Composito ad quietem cani, hunc tendinem ad medium fere dissecuimus: inter hæc quum nihil plane se commoveret, fatis apparuit, nullum inde dolorem ad eum pervenire: & quum vinculis solutis liber dimitteretur, pristinam alacritatem præ se tulit, projectum panem e vestigio devoravit, & una omnibus quatuor institutis pedibus: quodsi progrederetur, læso pariter innitebatur pedi, quam alteri ex posterioribus, eodem aures scalpebat, ac per scalas sursum deorsumque sine dolore aut molestia gradiebatur. Neque aliter vulnera lambit, quam quum ea contrectarentur ostenderenturque. Si cubararet



baret atque alliceretur , sine mora surrexit & ad illum , qui vocabat , progressus est. In universum à spasmis convulsionibusque immunis fuit.

S C H O L I O N I .

§. XI. Quum in hoc exemplo chordam magnam ad medium usque diffecarentur , animadvertisimus aliquam tendini portionem se retrahere , alia adhuc restante , que pariter jam quadanteus incisa erat. Mirabamur , quid esset ; opinati , in hoc animalium genere , haud secus ac in homine , chordam magnam unico tantum constare tendine. Quapropter consilium cepimus in presenti cane primo quoque tempore explorandi , unde hoc phenomenon accideret. Praterlapsis ergo tribus diebus jugulavimus canem , qui toto hoc intervallo perpetuo sanus vegetusque degerat , ne minimum quidem incommodum expertus.

O B S E R V A T I O I .

§. XII. Invenimus in cane tendines Gemelli & Solei non , sicut in homine , conjungi unumque constitueri tendinem , sed unumquemque separatum ossi calcaneo affigi. Nimirum tendo Gemelli recta descendit inseriturque ossi calcis. Tendo solei statim ab ortu suo se flexit ad interiorem pedis partem , ibique sub Gemelli tendine emergit , cum eodem ultra dimidium linea fere recta decurrit , postea sursum ascendit , supergreditur tendinem Gemelli , latescit , amplectitur Gemelli tendinem , & extremo suo latiore affigitur superiori & posteriori , siue exteriori , parti ossis calcanei. His tendinibus sese adjungunt alii bini , à musculis femoris originem ducentes : unus ab exteriore pedis latere procedit , alter ab interiore. Uterque paulo gracilior est. Ut primum tendines predictos attingunt , concurrunt , conjunguntur , firmiter plerumque invicem coherent , & fere non nisi unicum efficiunt tendinem. Tali modo sub tendine solei , quo loco se conjunxerunt , paulo tamen magis ipso tendine versus interius pedis latutus , descendunt , inferius à solei tendinis latiore extremo , similiter ac tendo Gemelli , circundantur , & ossi calcis in pedis interiore latere inseruntur. Omnes hi tendines tenui quidem , sed firma tunica , que ipsorum vaginam est , simul includuntur : praterea quoque inter se invicem ope fortis cellulose membranae connexi sunt ; ut adeo , si ab exteriore facie considerantur , omnino speciem unius tantummodo tendinis praebant , omniumque actio fere non alia quam simultanea esse possit.

S C H O L I O N I I .

§. XIII. A quibus nominatim musculis femoris isti tendines originem ducent , opera pretium haud credidi inquirere , siquidem hoc ad propositum meum plane nihil contulisset. In universum enim plus afferre nolui , quam quod expli-



plicationi nonnullarum observationum inservire possit. Alias quoque annotare debuissim , tendinem solei , postquam ad os calcaneum adhaesit , iterum crassificere , findi , atque ad digitos pedis abire.

O B S E R V A T I O II.

§. X I V . Quandoquidem inciso facta erat à postica parte pauloque magis versus internum latus , Solei tendo erat , quem dissecueramus , quique se retraxerat : tendines vero musculorum femoris & Gemelli leviter lafierant . Superior pars tendinis Solei ab inferiore circiter transversum digitum distabat , & sub tunica , que omnes tendines involvit , sè abdiderat : illa enim ab inferiore hujus extremo haud multo plus distabat , quam dissecta cutis exterior habebat , cui etiam per intermediate multam cellulari substantiam adhærebat . Inferior pars hujus tendinis , ut mihi quidem vixum fuit , longe minus se retraxerat quam superior : etenim ejus extreum nibil fere quidquam à tunica convegebatur , pariterque paululum modo sub exteriore cute absconditum latebat . Adhac bina anteriora extrema dissecti tendinis aliquanto crassiora erant magisque prominebant , quam reliqua tendinis partes : inferioris tamen partis extreum anterius non omnino crassitatem ac prominentiam extreni finis anterioris partis superioris æquabat .

E X P E R I M E N T U M X .

§. X V . Canem , quem ad secundum & quintum experimentum adhibueramus , quinque integerrima valetudine fruebatur , die post experimentum quintum sequente , tali modo ligavimus , ac in cane experimenti noni feceramus . Huic similiter cutem à postica parte versus internum latus incidimus , tendinemque Solei parumper denudavimus . Commovit se canis & irquietus factus est . Exspectavimus , donec requievisset : quo facto tendinem Solei totum transversim præcidimus ; cujus superior pars rethabatur : canis autem quietem inconcussus servabat . Vinculis eum liberavimus , & ipse latus & alacer discurrit , quum alliceretur , in altum se erexit , pedibusque posterioribus ingressus est .

E X P E R I M E N T U M XI .

§. X VI . Alii cani , quem ut præcedentes alligaveramus , Gemelli tendinem , à postica parte versus exteriores parum denudatum , ultra dimidium recidimus . Nihil sensit : & solitus æque bene pedi innexus est ac antea , neque convolutionibus aut spasmis agitatus . Quo appareret , an posterioribus pedibus arrectus ingredetur , frustum carnis olfaciendum datum est , & deinde in altum sublatum : exemplo se arrexit , pedibusque posterioribus inni-



innixus, porrigentem & parumper recedentem secutus est. Scalarum gradus sursum deorsumque peranibulavit, ab editoribus locis saltu se dejecit, & valde lactum atque alacrem egit. Postridie similiter in altero pede tendinem Solei ab interiore latere ultra dimidium abscedimus. Inde non magis laesus est, quam prius, cursitavit, scalas æque commode ac antea scandit, & similiter allectus, posterioribus pedibus incessit, nullis spasmis aut convulsionibus vexatus.

S C H O L I O N III.

§. XVII. Hos duos canes reservavimus ad experiendum, in \textcircled{E} qua ratione discissi tendines iterum coalescerent. Cutis intra quatuor hebdomadas integræ coiverat, iis vero locis, ubi minor inciso facta erat, adhuc citius. Priorrem canem post sex hebdomadas, posteriorem post triginta \textcircled{E} quinque dies à captis experimentis necavimus, tuncque sequentia invenimus.

O B S E R V A T I O III.

§. XVIII. Antequam in priore cane tendinem Achillis investigaremus, eo loco ubi sectio facta erat, \textcircled{E} pili neicum repullulaverant, digitis tendinem comprehendimus: in quo duo minuta tubercula tetigimus, circiter transversum: digitum minorem à se invicem remota; ceterum superius tuberculum maius fuit: inferiori. Deinde totum tendinem reteximus. Tunica, quæ tendines omnes conjunctim includit, \textcircled{E} quam in observatione prima, seu §. XII, connumeravi, perfectly coaluerat: \textcircled{E} , si tubercula modo dicta absuissent, tendinem sanum quilibet putasset. Aperiuiimus tunicam inter bina tubercula, illamque separavimus: firmissime tuberculis adhærebat. In extremo superioris partis recti tendinis Solei, ubi tuberculum occurrebat, fibre magis à se invicem distabant, neque ita ante fibi accumbeant, quam in reliquo tendine: nimis hoc tendinis extrellum speciem præbebat, quasi tumefactum aut infictum esset. Compression \textcircled{E} parumper attractum, paulum liquidi profudit, adeoque aliquantum gracilescere \textcircled{E} elongari visum est. In extremo hujus tendinis inferiore, ubi tuberculum minutius erat, quam in superiore, \textcircled{E} fibre, quantum euidem visu cognoscere poteram, valde parum magis à se invicem remote erant, quam per reliquum tendinis tractum observabatur. Dum extrellum solum inferiore perinde ut superiore, comprimebam, simulque attrahebam, fere omnino non animadvertere poteram eundem elongari; aliquid tamen humidi promanare mihi videbatur. Præterea neque in extensoribus tibiarum hujus canis, neque in tendinibus Achillis, ullum amplius deprehendi vestigium puncturarum, ab acubus infistarum, sicut in secundo \textcircled{E} quiuto, experimento prescripsi.

Tom. V,

 $\textcircled{Q} q_1$

O B S E R .



OBSERVATIO IV.

§. XIX. Dignum quoque animadversione est, in illo cane, quem in scholio primo, seu §. XI, me jugulofe dixi, nihil amplius puncturarum in tendinibus factarum, quemadmodum in experimento primo & quarto, seu §. II & V, exposui, me deprehendere potuisse: excepta tamen ista punctura, quam venam simul perruperam in experimento primo. Hic scilicet multum inveni cruris extra vasa effisi, inter cellulosa substantiam ac tendinem: adeoque nonnihil ejus in rimam puncturæ penetraverat, quod parvam rubicundam in tendine lineam efformabat.

OBSERVATIO V.

§. XX. Preparatis in altero cane tendinibus Achillis utriusque pedis, in tendinum uno ad internum, in altero ad externum pedis latus, valde minutum tuberculum observabam. Hac tuberculæ tenui membrana vestita erant, eaque membrana ita foriter illis adhaerebat, ut inde omnino separari non posset. Verisimile est, hanc membranam fuisse partem vaginæ, que singularem quenque tendinem includebat. Igitur aliquoties tantum leves scalpello incisuras secundum tendinis longitudinem faciebam, quo species objecta est quasi verarum fibrarum noviter enatarum, quæ tamen flavebant, & si luci obverterentur, paulum pellucebant. Quodsi tendines luci obverterentur, videri poterat, quousque in singulis scalpellum adactum esset. Solei tendo fere totus abscessus fuerat: nam paucæ tantum alba fibra inferius conspiciebantur, deinde apparebant alia subflavæ, quæ eo longiores fiebant, quo magis incisura ad superiora procedebat, quoniam supreme fibra dissecta quam maxime se retraxerant, subsequentibus semper, pronti succedebant, minus minusque retractis. Supreme tamen non ultra crassitudinem corvini calami, quali ad delineandum utimur, à se invicem remote fuerunt. Tendo Gemelli non ita profunde incisus fuerat: ceterum eadem, quæ de Solei tendine retuli, in hoc pariter observabantur: quo magis vero minuta ista tuberculæ scalpello secundum directionem longitudinis cædebam, eo minora reddi videbantur, ita ut tandem ferme nihil ipsorum animadvertisse posset. Illud, quo tendines iterum coaluerant, naturam glutinis habebat, & si rei quam simillima comparandum est, speciem referebat calli, quo confracta ossa iterum conjungi solent; nisi quod in tendinibus mollior erat, quam in ossibus.

EXPERIMENTUM XII.

§. XXI. In hædo, similiter ac proxime prægressi bini canes, alligato, ore tamen libero, quo sensum doloris balatu testari posset, in uno pede tendinem Solei, in altero illum Gemelli, ad dimidium usque discidi-



dimus. Nihil sensit : attamen , quum tendines denudarentur , itemque quum , sectis tendinibus , cutis volfella velleretur , balavit. Inde dimissum animal in alterum diem abire jussimus , quo die pleuram in eo explorare suscepimus : interea temporis nullis spasmis aut convulsionibus tentatus fuit , sed admodum vegetus , posterioribusque pedibus sicut antea innixus , subinde pro more coniusto hujus generis animantium saltus fecit.

S C H O L I O N . IV.

§. XXII. Quum postea tendines sectos recognoscerem , nihil reperti , quod hic annotari adhuc dignum foret.

E X P E R I M E N T U M . XIII.

§. XXIII. Canem eodem ac praecedentes postremos canes modo aligavimus , chordaque magna digitis comprehensa , & scalpello proxime sub ea chorda trajecto , eandem integrum præcidimus. Vinculis remotis quum in solo statuisse mus canem , ingressus est , & læso pedi pariter innitus conatus : sed pes haud satis firmitate valuit ; in hoc enim brutorum genere , dum stant aut pedes promovent , chorda magna longiori ipsorum tarso in erecto situ tenendo inservire debet. Humi stratus si vocaretur , statim accurrit , semper etiam læso insistere pedi conatus : adeo parum sensit , pedem vulnere debilitatum esse ; quum tamen alioquin canes solis tribus pedibus haud dubitanter uti soleant , si tantillum ægritudinis in uno pede percepint . Retinuimus nobiscum hunc canem per integrum di- midium diem , quo toto tempore perpetuo vegetus & alacris fuit , cibos avide voravit , nec quicquam malorum symptomatum in eo deprehendi potuit.

S C H O L I O N . V.

§. XXIV. In hoc experimento tendinem Achillis non tibiam versus , sed cultro ex industria ab ea averso discidimus , quia alias nervum sub tensione decurrentem facile ferire possumus.

E X P E R I M E N T U M . XIV.

§. XXV. Postridie hujus experimenti eundem canem , salvum vegetumque , eodem modo ligavimus , & in altero pede tendinem magnum ferre totum nudavimus : quod quum fieret , satis inquiete se gessit. Exspectavimus donec pacatus esset , tunc tendinem acie à tibia aversa medium discidimus : quo facto superior tendinis pars circiter transversi digiti spatium ,

Q q 2 tium ,



tium, nulla tamen vi, sed lente, se sursum retraxit; ast partem inferiorem retractam fuisse, equidem nullatenus animadvertere potui. Deinde tam superiorem quam inferiorem tendinis dissecti partem incisionibus vexavi, aliquas etiam particulas supra infraque abscedi: quorum omnium nihil plus doloris percepit, quam senserat quum medium tendinem praeciderem. Sed quum scalpello per cutem adacto musculosas carnes compungarem, tum vero confestim perturbatus, coepit ejulare. Postremo canem interfeci.

S C H O L I O N VI.

§. XXVI. Præter hæc, dum in ligamentis experimenta caperemus, aliquoties, occasione ferente, oleo vitrioli, lapide infernali, acu, scalpello, extensores tibiae non tantum titillavimus, sed etiam compunximus, cecidimus, dimidios integrosque discidimus: sed nec catelli, nec maiores canes, neque hædi ullum inde dolorem perceperunt. Ut primum vero cutem horum animalium cædebamus, comprimente vellicabamus, aut musculosam partem, vel incisam tantummodo cutem ab interiore facie, lapide infernali vel oleo vitrioli titillabamus: statim certis declarabant signis earum rerum sensum ad se pertinere.

S C H O L I O N VII.

§. XXVII. Tot igitur institutis experimentis quum satis abundeque confirmatum esset, tendines in brutis sensu defitui, eosque sine periculo pungi exercire posse; in hominibus quoque visum est, quoad licet, explorare, an patriter se res haberet, ac de brutis animalibus confiterat. Quapropter haud veriti sumus, in vulneribus humanis sponte oblatis rem experiri: Et quaecunque reperta sunt, fideliter enarrabo, haud dubitans fore, ut ius nostra sententia adhuc magis corroboretur.

E X P E R I M E N T U M XV.

§. XXVIII. Accidit, ut studiosus litterarum cutem unius ex dighis unco laceraret, ita ut flexores tendines nudi apparerent. Usus est hac occasione Celeberrimus Præceptor, Perillustris Dn. *De Haller*, cui merito summos honores, & quum satis persuasum haberet, contrictionem tendinum nihil periculi afferre, unum istorum tendinum volrella arripuit atque compressit, insciente quidem nec advertente ægroto. Interea vultum ejusdem diligenter observabat Ill. *Hallerus*, num forte signum aliquod ingrati sensus ostenderet, sicut procul dubio factum esset, si ille dolorem aliquem percepisset: sed nihil plane mutatus est vultus. Testis adfuit expertus chirurgus, *Bornemannus*, conscius eorum quæ agebantur.



bantur, idemque propterea diligenter etiam vultum ægroti intuitus est, num aliquod indicium doloris proderet: sed nec ille quicquam mutationis comprehendere potuit. Hic quoque postea sæpius in renovanda vindicta idem experimentum repetiit, eundemque semper effectum expertus est.

E X P E R I M E N T U M XVI.

§. XXIX. Ancilla, quæ grave onus una cum aliis portabat, his remittentibus ab illapso pondere vehementem in pollice contusionem accep-
rat. Vocatus *Bornemannus*, cuius in superiore experimento mentionem feci, inter curandum aliquoties occasione usus est absentiam sensus in ten-
dinibus magis magisque comprobandi. Igitur primo flexorem longum ins-
trumento parum acuto vellicavit: neque interrogavit ancillam, an dole-
ret; sed tantum indicia vultus attendit, in quibus nihil animadvertisit,
quod dolorem significaret. Quum vero iterum experimentum tentare vel-
let, dixit ei: se in osse aliquid operaturum esse, hoc tamen plerumque
non dolere; sed ejus loco tendinem adhuc vagina sua tectum ferramento
acuto vellicavit. Tum quæsivit, num doleret? negavit illa. Deinde va-
ginam tendinis discidit, quum, utique propter suppurationem, incidere
necessè esset. Jam nudum tendinem acuta spathula, qua ad unguenta &
emplastra inducenda ptebatur, titillavit, adeoque pupugit aliquantum, &
fissuras inter ejus fibras excitavit. Interrogavit denuo ægrotam, num do-
leret? iterum illa negavit. Pariter volvella tendines aliquoties compressit:
ancilla vero nihil ejus percepit.

E X P E R I M E N T U M XVII.

§. XXX. In lapicidina hujus urbis operarius quidam à lapidibus ruen-
tibus tantam accepit in pede lœsionem & contusionem, ut astragulus adeo,
seu talus, plane extra locum suum proturbatus, malleolo tantum adhæ-
reret interno. Chirurgus *Bornemannus*, postridie cum aliis accessitus, ex-
plorato vulnera, serram, qua pedem amputaret, intervallo duorum trans-
versorum digitorum supra malleolum admovit. In quo opere dum, quoad
fieri poterat, caveret, ne carnosis partibus nimis appropinquaret; factum
est, ut tendinem achillis fere ad dimidium transversum digitum serra dis-
cinderet, priusquam hoc animadverteret: at æger nihil ejus percepit;
& neque hoc, neque reliquis diebus, spasmis aut convulsionibus con-
flictatus est. Erant in ægro nudati quoque tendines peronæi longi pariter
ac brevis: quare hos etiam acumine spathulæ, ad emplastra inducenda
adhiberi solitæ, compunxit chirurgus, præsente Illustri atque Generosissimo Dn. *De Haller* & binis adhuc aliis viris in dignitate constitutis, qui-
bus ego me adjunxeram. Dum haec fiebant, in vultu ægri nulla signa

Q q 3 appa-



apparuerunt, quibus dolorem proderet: quum tamen an doleret ex eo quæreremus, placido vultu affirmabat. At quum nunc linteum ad contingendum pedem leniter tantum injiceretur, idque partes carnosas a cute nudatas contingeret, statim exclamavit, quod nequaquam fecerat, quum tendines pungerentur. Adeoque credibile est, aut metu amputationis, que tunc parabatur; perturbatum hominem ad quæstionem, num dolorem ex punctione tendonum sentiret? affirmando respondisse: observavi enim, eodem, quo hæc fiebant tempore, eum ad duas contrarias quæstiones propositas pariter affirmando respondisse: namque unus ipsum interrogabat, an pulvinar altius attolli juberet? alter autem quærebat, an potius illud, sicut positum erat, retinere vellet? utrumque affirmabat. Aut fieri potuit, ut, quia tendines ab adhæsione liberi solutique erant ac commovebantur, ambientes vulneratæque partes, ipsaque cutis ad quas illa commotio pervenit, aliquem percepient dolorem.

S C H O L I O N V I I I .

§. XXXI. In aponeurosis haud opus esse putavi capere experimenta, quia partim nihil aliud, nisi tendonum ipsorum productiones sunt, partim ejusmodi nonnulla experimenta & asserta jam à Cl. D. Zimmermanno in allegata Dissert. §. XV & XVI. proposita sunt. Quum tamen inter experimenta in peritoneo & ligamentis facta subinde nactus sim occasionem aponeuroses quoque scalpello & butyro antimonii stimulandi; modo tantum hic admonendum duxi, eas me in his experimentis sensu vacuas deprehendisse.

C O N S E C T A R I A .

§. X X X I I .

Itaque vidimus tendines in omnibus experimentis sensu & dolore suis destitutos, sive puncti, sive velicati, sive compresi, sive secti, sive ad partem aliquam discissi, sive integre præcisi, sive parte aliqua truncati aliove modo quoconque vexati fuerint: non minus autem in vagina tendonum, quam in ipsis tendonibus eandem insensibilitatem deprehensam fuisse, siquidem & in tendonibus vagina sua adhuc tectis, & in vagina separatis experimenta facta sunt, ut præcipue ex §. X. collato cum §. XII. itemque ex §. XXIX. manifestum est. Neque solum in animantibus brutis varii generis & ætatis ea phænomena comparuerunt, sed plane similiter etiam in hominibus evenerunt. Nam quod fortassis objici posset, ægrotum §. XXX. propositum affirmasse, se dolorem ex compunctione tendonis percepisse; hoc illum falso pronunciasse, partim jam in eodem §. maxime probabile factum est, partim constanti omnium reliquorum experi-



perimentorum testimonio consensuque confirmatur, partim denique ex eo conficitur, quod idem æger paulo ante multo majorem læsionem, nimirum achillei tendinis iætu ferræ reciprocantis factam lacerationem, non senserat. In aponeurosisibus pariter se rem habere ac in ipsis tendinibus, §. XXXI. demonstratum est. Ceterum hic præmonendum duco, me loqui proprie de iis tendinibus, qui in extremis muscularum exoriuntur; non de fibris tendineis, quæ muscularum carni intertextæ sunt: quamquam ad has quoque ea, quæ dico, suo modo applicari possint.

§. X X X I I I .

Deinde cognovimus, licet tendines quoquo modo vexati essent, modo non integre præcisi fuerint, tamen id non impedivisse, quo minus artus motum & actionem suam, quatenus à tendinibus administrantur, perinde ut in perfecta sanitate retinuerint: sicut in primis §. II. III. IV. V. VI. VII. X. XV. XVI. XXI. docent. Porro retractæ sunt tendinum fibræ, necdum præcisis integre tendinibus: vid. §. XX. collato §. XI. & XIV; quod etiam comprobari videtur enatis istis tuberculis, quæ §. XX. descripta sunt, & procul dubio iis in locis, ubi fibræ præcise fuerant, succreverant, sicut §. XVIII. accidit. Etsi vero sic retractis pluribus fibris reliquæ à pondere appenso magis tensæ sunt; tamen nunquam observatum est, spasmos aut convulsiones inde ortas fuisse: velut nominatum dictum est §. X. XVI. XXI. XXX.

§. X X X I V .

Sed neque aliis ullis ægritudinibus propter tendinum læsionem quamcumque animalia aut homines affectos fuisse, tota series experimentorum ostendit. Nam licet integre abscissi fuerint tendines, tamen nulla alia mala consecuta sunt, quam functionis, quæ tendinum propria fuerat, intermissio, quemadmodum in §. XXIII. & XXV. expositum est: & dum coalescerent dissecata quiete omnia peracta sunt: & post sanationem vel nulla prægressarum læsionum vestigia remanserunt, vel tantum leviora in propriis vulneratorum tendinum locis; vid. §. XVIII. XIX. XX.

§. X X X V .

Tandem manifestis exemplis edocti sumus, discissas tendinum fibras, eisdemque integre præcisos, iterum proprio succo, seu glutine interposito, coire conjungive: nec levis adfuit suspicio, ipsas tendineas fibras fuisse renatas; ut legenti §. XVIII, XIX, XX. perspicuum erit. Quid enim aliud indicarunt innata tubercula, nisi succum tendinis ibi collectum restagnasse? & quid aliud fuit humor ille, quem ex præcisis tendinum capi-



capitibus exprimere licuit? Denique ipsum molle gluten in locis coalitis, oculis conspectum manibusque tractatum, hanc rem satis comprobat.

§. XXXVI.

Hæc igitur, quæ hactenus dedueta sunt, liquido demonstrant, verisimum esse, quod initio posui; scilicet tendines omni sensu, multoque magis dolore vacuos esse, vulnera vero ipsorum vel quaseunque lœsiones nihil plane periculi, nulla vel leviora symptomata, nedum gravia, spasmos, convulsiones, similiaque inferre, & omnium minime mortem inducere. Neque rationum fulcimentis destituta est hæc sententia. Nam ut à verisimili ordiar, quum tendines plerique omnino in exteriore corpore & circa membrorum juncturas locati sint, proptereaque plurimis externarum rerum afflictionibus, ictibus, pressionibus, similibusque pateant; eos oportuit ita fabricatos esse, ut injuriis istis sine molestia ferendis apti essent, neque doloris sensus inde creatus valetudinem perturbaret, &, si forte gravius afflicti, vexati, vulnerati forent, facilem curationem recipierent. Quod eo magis necessarium fuit, quia trahendis movendis partibus dicati, huic muneri minus idonei futuri erant, si tractionis sensum perciperent: & quia plerumque ossibus affixi, ab eorum duritie variis in motibus frictionibusque necessario lacererentur, si sentirent.

§. XXXVII.

Præterea textura tendinum compacta firmaque perceptioni exercenda repugnare videtur, quandoquidem ad sensum producendum molles quamdam requiritur. Quo vero clarius textura tendinis intelligatur, ejus compositionem breviter explicemus. Fit tendo, ut ex perfectissimo gravissimoque Anatomico, Viro Illustri, Bernh. Siegfr. Albino, Præceptore meo observantissime colendo, coram in prelectionibus physiologicis audivi, ex fibris muscularum carneis, per harum continuationem: quod ut ostenderet Vir candidissimus, nitidum exhibuit præparatum, in quo continuatio istarum fibrarum tendinearum ex musculo tam clare demonstratur, ut dubitationi nullus relinqueretur locus. Quanquam autem ex carne musculara producantur tendinis fibrae, has tamen, docuit, propter contractiorem densitatem fieri multo duriores, tenaciores, robustiores, læves, albescentes, splendentes, adeoque in peculiarem fere abire substantiam [a]. Consentunt cum hac doctrina Vir Illustris atque Generosissimus De Haller [b], Præceptor æque metus summe venerandus, Magnus Boer-

[a] Conferatur Celeberrimi Viri Hist. Muscular. Hom. Leid. Batav. 1734. pag. 7.
18. & 57.

[b] In Prim. Lineis Physiol. Gotting. 1747. §. 404.



Boerhaavius [c], Petrus Laurembergius [d], Johannes Bohnius [e], & alii apud Audr. Ottomar. Goelickium [f] excitati auctores.

§. X X X V I I I .

Canaliculis etiam, seu vasculis, instructum esse tendinem, partim humor ex dissectis fibris promanans, partim regeneratio amissorum, quae sine vasis advehentibus concipi nequit, argumento sunt, (vid. supra §. XVIII. XIX. XX.) partim injectionibus præparationibusque suis felicissimis ob oculos posuerunt ac descriperunt Celeberrimus *Ruyſchius* & in æternum Venerandus *Albinus*, ceu videri potest apud ipsos præstantissimos viros [g], tum apud *Johan. Georg. Kijnerum* [h], *Herm. Boerhaavium* [h], *Perillustrem De Haller* [k]; adde, quod Vir generosissimus ipse quasdam pulchre præparatas tendines adeuntes arterias nobis in prælectionibus suis demonstraverit. At nervum in tendines ingredi, nemo unquam vidit, ut testatur *Melchior Sebizijs* [l], pluresque alii apud *Goelickium* [m]: & quanquam e musculis nascantur tendines, ad musculos autem plures accedant nervi; hi tamen omnes in musculi carnem distribuuntur, & ibidem evanescunt, neque ad tendines pertingunt. Hæc est meorum ad cineres usque colendorum Præceptorum doctrina, quam accuratis saepe iteratis observationibus suis comprobatam fovent, uti & doctissima eorum scripta legenti patebit [n].

§. XXXIX.

[c] In *instit. med.* §. 399. Confer. *Eiusdem Prælect.* eod. §. cum *Commentariis Ilustris De Haller*.

[d] In *Proceſſriis anatomiciis* Hamb. 1619. 4.

[e] In *Circulo anatomico-physiologico* Lips. 1710. 4. *Progymnasmate* XXIX. pag. 393. seqq.

[f] In *Diss. de tendinis struclura &c usu*, Francof. cis Viadrum 1734. pag. 12. seqq.

[g] *Ruyſch.* in *Theſaur. & Averſ. anat.* Magn. *Albin.* in *bijl. muscul. hom.* pag. 11.

[h] In *Diss. de Lesione tendinum*, Lugd. Batav. 1699. §. X. & adjecta tabula, figura 2.

[i] In *Prælect.* ad *inst. med.* §. 399. Vol. III. p. m. 375.

[k] Ad *Boerhaav* loco proxime allegato.

[l] In *Exercitationibus medicis* pag. 142. Edit. Argent. 1672. *Ant. Leervwenhoekius* quidem videre sibi visus est nervulos in tendonum involueris, sed non in ipsis tendonibus: vid. Cl. *Zimmermanni* diss. alleg. §. XII; ubi invenies, quam parum inde concludi possit.

[m] In cit. diss. §. XXV.

[n] Celeb. *Albin.* *bijl. musc. hom.* pag. 12. Generosiss. v. *Haller prim. lin. physiol.* §. 405. & *Comment. in Boerhaav. Prælect.* Vol. III. p. 352. not. a.



§. X X X I X.

Jam quum, quantum adhuc cognitum est, nusquam sentiendi facultas existat, nisi à nervorum extremis [o]: in tendinum autem contextu nulli nervi dispergantur; sequitur, ut neque sentiendi virtute tendines prædicti sint. Sunt quidem magni viri, interque hos præcipui *Claud. Galenus* [p], *Hermannusque Boerhaavius* [q], qui tendines ex ipsis nervis oriri proponunt: verum hi solo mentis ratiocinio merisque conjecturis ducti, nullis certis experimentis aut observationibus instructi, eam opinionem conceperunt: vel quum sibi persuaderent, tendines sensus & doloris esse capaces, necessario quoque concluserunt, eos ex nervis esse constructos. Sed quum utrumque argumentandi genus lubrico & fallaci innitatur fundamento, & assertum illud ab experientia refutetur; nemo nos, puto, reprehendet, quod ab auctoritate tantorum virorum discedimus. An forte ex nervorum involucris orti sunt tendines? Non repugnat experimentis; involucra enim, sive ea sint dura aut pia meninx, sive tela cellulosa, facultate sentiendi carent [r]. An autem hæc opinio nullis contradicat observationibus anatomicis? hic neque affirmare neque negare volo; nimis enim longus forem, si accurate fabricam musculi carnearumque fibrarum investigare, & exinde veritatem aut falsitatem hujus conjecturæ determinare vellem.

§. X L.

Veritati auctoritas semper est postponenda. Igitur illis veterum potius adstipulamur; contra quos *Galenus* disputat, & qui jam ictis temporibus, nescio utrum experimentis aut observationibus, an rationum momentis permoti, tendines sentire negarunt [s]. Sed quanquam verum docuerint, sic ut nunc nobis per ipsam naturæ explorationem constitit, & veritas in suam sedem postliminio revocata est; tamen hæc doctrina propter admirabilem *Galeni* auctoritatem brevi neglecta, quum posteriores medici

cum

[o] Vid. *Boerhaavii inst. med.* §. 566. cum *Commentariis*: vel *Perilli. De Haller prim. lin. physiol.* §. 381. coll. §. 377.

[p] *De motu musculari.* Lib. I. cap. 2. *de usu partium lib.* I. cap. 17. & lib. XII. cap. 3. & alibi. Hunc deinde plurimi fecuti sunt, ut moris erat. Vid. *Goelickie* in *diss. cit.* §. VII. itemque *Kisner.* c. 1. §. IX.

[q] In *prælect. ad inst. med.* §. 399. p. m. 374. & 376. vol. 3.

[r] *De cellulosa membrana* vid. *Cl. Zimmermanni* in *Diss. De Irritabilitate.* §. 1. & 35. pag. 36. *De dura matre idem eod. loc.* §. 5. itemque *Celeb. Zinnius* in *Diss. quæ sicut experimenta quedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem in vivis animalibus instituta Gottingæ 1749.* pag. 30. seq. & pag. 43. seqq. *De pia matre* *Sect.* 4. *hujus dissertationis,*

[s] Apud *Goelickium de tendinis structura & usu*, §. 6.



cum Galeno errare mallent, quam redintegrato studio rem ipsam inquirere, nunquam in conspectum redire potuit: adeo ut pro indubitate axiomate habitum sit, tendines maxime post nervos exquisito sensu praeditos esse; & Goelickius [t] in primis, illos admodum sensibiles, sese in eorum gratiam afferere, testetur, qui nescio quam insensibilitatem tendini vindicare hanc erubescunt.

§. X L I .

Hujus autem opinionis affectae & defensores hoc potissimum utuntur argumento, quia persuasum habent, tendines punctos, sectos, nec integræ præcisos, ruptos, laceratos, vexatos, & quoconque modo vulneratos aut laesos eadem sequi symptomata, quæ nervos ita affectos sequi solent: nimis exquisitissimos dolores, astus, inquietudines, spasmos convulsiones, deliria, febres, inflammations, gangrenam, pluraque alia saeva & horrenda, & ipsam adeo sape mortem. Talia enarrant Kistnerus [u], Guil. Conperus [x], Magn. Boerhaavius [y], Ill. Heisterus [z], Jac. Crescentius Garengeot [a], Goelickius [b], Joachim. Zachar. Platnerus [c], & complures alii ab his excitati, verbo, fere omnes ad unum, qui vel in universum de chirurgia, vel de hac sigillatim laesiorum parte, vel de venæctionis administratione commentati sunt.

§. X L I I .

Contra tamen aliqui nonnunquam extiterunt testes veritatis, qui rediligentius per vestigata, vulnera tendinum haud tantis tamque multis manibus ingenerandis patere monuerunt, sed fere periculo gravibusve noxis vacare. In his sunt Leonhardus Botallus [d], Joban. Daniel Schlichtingius [e], Job.

[t] Cit. loc. §. 14. add. altera ejusdem Diff. de tendinum affectibus; Francof. ad Viadr. 1734. §. 12. pag. 18.

[u] Loc. cit. §. 22. seqq.

[x] in Transact. philosop. Num. 252. & in Actis Erud. Lips. latinis Anno 1700. mens. Jan. p. 23. seqq.

[y] in aporijinis practicis §. 162. seqq. & §. 183. seqq. in quos conf. Comment. Perill. Ger. van Swieten.

[z] in institutionib. chirurg. Capp. de vulnerib. de laesione nervi aut tendinis in venæctione, de sutura tendinum.

[a] in chirurgia practica s. de operationibus chirurgicis, Part. 3. cap. 7.

[b] in diff. de tendinum affectibus, per totam.

[c] in institutionib. chirurg. §. 377. edit. germ.

[d] Commemorat Goelickius, in differt. de tendinum affectibus §. 12. p. 18. Botallum à Jobanne van Horne recte, ut ille sibi persuaderet, rotari, quod tendinem quoquo modo violatum minus noxae minusque periculi sibi conjunctum habere contendit.

[e] in Ephemerid. Naturæ Curiosorum Vol. 6. pag. 109. seqq. In observ. 24. cui

R. x 2 Titu-



Job. Georg. Zimmermannus [f]. Adeoque ipsi aliquando ii, qui gravitatem horum vulnerum mirifice augent, testimonium veriori sententiae inviti imprudentesque perhibuerunt. Sic Perillustris Swietenius, qui pro recepta stat doctrina, tamen exemplum afferit hominis, cui per saltationem chorda magna utriusque pedis disrupta fuit, quique nec rupture momento, nec toto cursu decursu illum dolorem sensit [g]. Et illum, cuius casum abruptæ magnæ chordæ refert Joh. Adamus Kulmus [h], dum vixit, Praeceptor meus suavissimus, læso adhuc pedi inniti potuisse, idque etiam poltea inter curandum sine molestia repetiisse, subindeque curru vectum esse, observat. Similiter Petrus Paulus Molinellius [i] exposuit casum juvenis, cui chorda magna gravissime ex vulnere læsa fuerat, qui tamen adeo parum mali sensit, ut illud diebus aliquot plane contemserit. Quin crediderim, omnes eos, qui futuram tendinum calculo suo approbarunt, quorum magnus numerus apud Illustr. Heijerum [k], Goelickium [l], aliosque recenset, tacite confessos esse, tendines tuto punigi fecarive posse: nam nisi hoc sine noxa fieri liceret, neque acubus trahitis

Titulus: tendo ex parte discissus, nullus mali symptomatis causa, Cl. Vir verba sequentia facit, quæ hac fini hic appono, ut unusquisque videat, quantum valeant experientia & animus attentus in observando casus nos erroribus exfolvendo. Posteaquam, inquit, diu nimis vulgi errore immersus fueram, tendinem, aut nervum, quoad dimidiadim sui partem discissum, disruptumve, ingentium symptomatum, phlegmones praesertim, abscessus, gangrenæ &c. causam & originem esse. Ecce! casu obvenit quidam, cui tendines carpi, una cum arteria radicea, pulsus ubi exploramus, quoad magnam partem, erant hostili cultro resicci, ut insigniter hiarent. Chiurgus linteo carpo terebinthinae spiritu madido vulnus opplet, arctaque circumdat fascias, neque nisi post quintum diem eisdem solvit, quando carne recenti vulnus jam erat omnino repletum, inducta demum intra tres hebdomadas arida cicatrice, nullo interea animadverso ejusmodi pravo symptomate. Plures consimiles ejusmodi historias à chirurgis sibi communicas esse, etiam memorat. Ut autem exactius adhuc veritatem istam experirer, pargit, canes iterum in subfidium sumsi, quorum tendines plus minusve incisione læsi, ut interdum vix amplius cohærerent, vulnere terebinthina pura, aut vini spiritu, aut nullo pharmaco deligato, observato interim nullo symptomate, quod ullo modo consectorium ejusmodi mali ominis præbere valeret. Add. ejusdem Traumatologia novantiqua, Amstelod. 1748. in 4.

[f] Hic vir præstantissimus praesente Perillustri nostro Praeceptore, Magno Hallero, ejusque consilio, ut ego, tendinem Achillis variis in animalibus irritavit butyro antimoni, oleo vitrioli, scalpello, punxit, per medianam longitudinem secavit, nulla autem convulsio, nullus clamor, ne minimum quidem doloris signum apparuit. Vid. ejus Diff. inaug. de irritabilitate, §. 12. seqq.

[g] in Comment. ad Boerhaavii aporijm. de cognoscend. & curand. morbis pag. 241.

[h] in disp. de tendine Achillie disrupto, & arteriis in osseam substantiam degeneratis, Gedani 1730. cap. 1. §. 1. & 2.

[i] in Commentariis de Bononiensi scientiarum & artium instituto atque Academia, Tom. 2. Part. 1. pag. 193. add. ib. pag. 196.

[k] in instit. chirurg. cap. de futura tendinis Achillis.

[l] in Diff. de tendinibus adscitibus §. 16. seqq.



jectis eos consuere licitum foret. Quod etiam metuentes quidam ex illis, qui vulgarem sententiam tuiti sunt, à tendinis futura abstinere jusserunt [m].

§. X L I I I .

Quare, quum alii lœsis tendinibus gravia mala imputent, alii tendines insontes judicent; horum nos potius accedere sententiae, persuadent experimenta & observationes, quæ ipsi diligentissime fecimus, & hactenus accurate enarravimus. Quæret autem aliquis, idque non immerito, quid causæ fuisse suspicari possimus, cur in eam de funestis tendonum affectibus opinionem descenderint præstantes viri? Qua de re ut meas conjecturas proferam, equidem arbitror, primum à perperam intellectis antiquissimorum medicorum verbis in errorem fuisse inductos. Nam constat nervorum appellatione comprehensos à veteribus fuisse tum veros nervos, tum etiam tendines & ligamenta: quemadmodum ostendit *Anutius Fæsus* [n], & vel illud indicat, quod spasmus, qui musculorum & tendonum affectus est, latinis dicitur *nervorum distensio* [o]. Quum igitur in probatis auctoribus legeretur, nervis lœsis symptomata superius enarrata consequi; hæc ab iis, qui naturam ipsam consulere intermisserunt, promiscue de tendonibus ligamentisque pariter ac nervis intellecta, & invicem permutata, omnibusque in universum attributa esse reor, quæ singulis separatim conveniebant.

§. X L I V .

Deinde notum est, iisdem locis, ubi tendines & ligamenta exstant, plurimos quoque nervos partesque nervis contextas occurrere, & plerumque simul cum ipsis lœdi, atque, si tendo trahatur, etiam connexos nervos trahi convellique. Hinc quum nervi minus, quam tendines, conspicui sint, & vel attentos fallant oculos, nec quondam tanto studio indagati cognitique fuerint, ac quidem nunc solent, factum arbitror, ut tendonibus ac ligamentis, quæ nimurum magis in oculos incurrebant, ea adscriberentur, quæ nervis potius attribui debebant. Quo accedit, quod sæpius fortassis & à plurimis, quoties in vulneribus atrocia symptomata acciderent, non ea, ac ad certum cognoscendum & statuendum sufficeret, accuratio studioque exploratum fuerit, unde proprie mala ista originem sumerent? sed perfunctorie illis eam caussam assignaverint, quæ manibus oculisque magis exposita esset, aut de qua certe opinionem ante conceperint, & auctoritatem aliorum secuti essent.

§. X L V .

[m] Vid. Celeb. *Heister*. & *Goelické* II. cc.

[n] In *Oeconomia Hippocratis*, voce *Nervos*.

[o] Vid. *Corn. Celsius* passim.



§. X L V .

Ita , verbi cauſa , tumores & inflammationes , quæ tendinibus lœſis accidunt , videntur rectius vicinis nervis eorumque irritabili naturæ originem debere : hanc enim irritabilem indolem , unam ex primariis inflammationum cauſis ingenioſe propositus conjunctissimus , veriſſimus , rariſſimique exempli amicus , Georg. Erneſt. Remus in ſpecimine inaugurali nuperrime edito *de experimentis quibusdam circa circulationem sanguinis institutis* [p]. Si poſt venæflectionem naſcitur gangræna , hanc à ſanguine inter fascias aponeuroticas effuſo , non à punclo tendine , pulchre vereque , niſi me omnia fallunt , repetit Cl. D. Zimmermannus [q]. Quo autem vehementius ſæpiusque ille , cui vena pertuſa , poſt peractam ve- næflectionem statim membrum movent , eo major quantitas ſanguinis effluit , altiusque adigitur ; & quo plus pinguedinis offendit effuſus , eo ci- tius putreficit. Si poſt ſimilem ſanguinis miſionem ſequitur perpetuus te- nuiſ liquoris effluxus , cuius exemplum memini poſt ſectam in brachio baſilicam eveniſſe ; vasi lymphatico vulnus illatum eſt [r]. Denique nervi , lymphæ ductus , & ejusmodi ſubtileſ partes in habitu corporis adeo multi- plicibus varietatibus ludunt , ut ſæpen numero aliiquid in uno humano cor- pore lœdatur , quod in altero vel deſt , vel alio loco poſitum eſt. His adde , ad vulnerum gravitatem etiam corruptam humorum indolem plus minusve pro gradu acrimoniæ confeſſe.

§. X L V I .

Quamvis igitur tendonum per ſe vulnera haud ita metuenda ſint , & nullum poſt ſe periculum trahant , tamen propterea non erunt nimis ne- ligenter habenda. Licet enim tendines ipſi infontes ſint , facilemque fa- nationem admittant , nihilominus aliæ partes , inprimis nervosæ , con- nexæ vel vicinæ , atque una lœfæ eſſe poterunt , quæ majorem curam re- quirunt. Unde ejusmodi quoque lœſiones tractantur ac foeventur reme- diis , quæ nervis amica ſunt , quo omnis noxa caveatur , quæ à ner- vorum vicinitate timeri poſſet.

§. X L V I I .

Vidimus antea , (§. XXXV.) tendines in animantibus brutis , ſive ex parte aliqua diſecti , ſive in totum præcifi fuerint , propria virtute iterum coalescere & consolidari. Idem in hominibus compluribus feliciffimo even- tu

[p] §. 25. pag. 52. ſeqq.

[q] in Diff. inaug. §. 14.

[r] Conf. Henrici Baffii Erläuterer Nuck , Hall. 1728. 8.



tu tentavit paulo ante laudatus *Molinellius* [s], ostenditque in vulnerato Achillis tendine non adeo necessariam esse futuram, ut plerique sibi persuadent. Atque hinc sane magnum ad ægros, qui ex hoc tendine diviso laborant, commodum redundat. Nam, quum ita natura magnæ chordæ consuluit, ut partes ejus, si casu sectæ fuerint, glutinari sine ulla artificiosa junctione per se possint; neque eas fuere oportebit, & ipsa erit extensio pedis, quo fines secti tendinis coeant & se mutuo contingent, quod à nonnullis appprime necessarium habetur, minus curanda. Eadem de reliquis quoque tendinibus valere, facile perspicitur.

§. XLVIII.

Observatum etiam est §. XI. XIV. XV. XX. XXV. dissectas tendinum fibras fuisse retræctas, sive omnino præciderentur tendines, sive tantum aliqua de parte. Quod videtur ansam dare dubitandi de veritate receptæ doctrinæ, qua statuitur, tendines neutiquam contractionis esse participes, sed tantummodo carnem muscularum: ut inter alios tradunt *Joh. Gottschedius* [t] & *Celeberrimus J. Fr. Winterus* [u]. Neque objici poterit, à carne muscularum fibras illas tendinum sursum tractas fuisse: nam neque carnem sede sua aliquantulum excessisse animadversum fuit; & magna licet fibrarum parte integra, etiam solæ paucæ dissectæ retrahebantur: & inferius dissecti magnam partem tendinis extreum quoque parum sub cute se condiderat, ut in §. XIV. annotatum est, quamvis cum carne haud cohæreat.

SECTIO II. DE LIGAMENTIS.

PROPOSITO.

§. XLIX.

Ligamenta sensu destituta sunt: neque ex eorum lœsionibus alia mala proveniunt, quam quæ ad propriam ipsorum texturam & usum pertinent.

EXPE-

[s] L. c. pag. 189. usque ad 196.

[t] *De motu muscularum*, cap. 2. §. 1. in Illust. v. *Haller Collectione Diff. anatom.* Vol. III. p. 371.[u] *De motu muscularum* §. 16. in *Generofiss. Viri Coll.* Vol. III. p. 445.

E X P E R I M E N T U M I.

§. L. Canem obligato ore, resupinatum, pedibus comprehensum tenimus, & cute ab interno latere cruris, juxta genu, incisa, ligamentum ejus loci capsulare aliqua ex parte nudavimus. Dum haec agebantur, canis vehementer perturbatus quiritabat, ac pedem fortiter retrahendo, magna vi se in libertatem vindicare nitebatur. Neque ad perfectam quietem posthac reduci se passus est. Influximus parvum foramen in capsula articulationis: quod non videbatur sentire, non enim inquietior factus est, quam fuerat. Tum frustulo ligni, quod oleo vitrioli tintatum erat, per factum foramen trajecto ligamenta tetigimus: sed, quum foramen minutum esset, bacillus haud satis acutus & gracilis, at gutta olei vitrioli grandior, denique canis non ita, ac decebat, quietus; haud potuimus canere, ne paulum olei dissectam cutem contingeret. Quo canis denuo in vehementes agitations concitatus, crus validius concussum, eoque etiam oleum ex capsula iterum excussum, ut illud finitimas partes adureret. Ita accidit, ut irrito conatu haud ex sententia perspicere possemus, utrum ligamenta sensum habuerint necne. Interim ea quae sequuntur observare nobis licuit.

O B S E R V A T I O.

§. LI. Quum canem liberum dimitteremus, tribus pedibus ingressus est, & admodum tristis ante januam occlusam procubuit, quasi fugam meditans. Projecta esca, noluit surgere ad illam capiendam: quum autem postea ipsi aquam bibendum ante os offerrem, & panem proprius apponerm, edit bibitque. Deinde, quia Illustri Viro, Venerando nostro Moderatori, haud verisimile videbatur factum vulnus, propter effluentem synoviam, sanationi fore accommodatum, ideoque canem paucis post diebus ad aliud experimentum adhibere cogitabamus; eum in conclave, ubi plures canes custodiebantur, intuli. Posthac, dum in aliis canibus ligamenta exploraremus, quæ experimenta mox enarraturus sum, vulnus prioris canis omnino negleximus, haud credentes illud bene consolidatum iri, presentim quum neque sanari vehementer vellemus. Veruntamen sexto post die, quum ad aliud in eo cane experimentum instituendum nos accingeremus, animadvertisimus escharam vulneri superinductam, & animal salvum vegetumque discursare, nulla in pede restante infirmitate. Quamobrem, quo vulnus ad perfectam perveniret sanationem, & ut tunc sanationis modum cognoscendi daretur facultas, ipsum dimisimus. Dehinc perpetuo eum observavimus, qui semper alacris vegetusque erat, discurrebat, lesoque crure tam commode utebatur, ac si nullum in eo vulnus accepisset, adeoque, si invitaretur, posterioribus pedibus incedebat.

S C H O -



S C H O L I O N .

§. LII. Quum in eo res esset , venit verus canis dominus sua repetiturus : nam , ut postea audivimus , puer , à quo canem pretio solito comparaveramus , eum clam suffiratus erat . Quare quum dominus mancipium suum ita carum haberet , ut pro pecunia nobis illud reliquere nollet ; ei canem reddidimus . Itaque non potius examinare , quomodo ligamentum persanatum fuerit . Reliqua animantia , in quibus ligamenta tali modo explorata fuerunt , statim postea à me nec ipso aut aliis , ejus generis experimentis subjecta sunt , in quibus vitam amiserunt , ut alicuius ligamenti curationem cognoscendi nulla copia fuerit . Quod nec in alio cane exspectare , per tempus aliasve res circumstantes mihi licuit .

E X P E R I M E N T U M . II.

§. LIII. Catellum eodem modo , ac priorem canem , apprehensum tenuimus : non tamen ei os obstrinximus , siquidem per ætatem nondum acriter mordere valebat . Huic pariter ab interno cruris latere juxta genu , incisa cute , ligamentum capsulare reteximus , sed latius quam in priore experimento , foramen quoque in capsula majus infliximus . Dum cutis secabatur ac divellebatur , vehementer clamitabat , seque jactabat : contra dum capsulam perforabamus , conquisiebat . Tunc accepto bacillo peracuto ac pertehui , oleo vitrioli ligamenta interius aduffimus . Nihil sensit : restabat enim quietus . Posthac dissectam cutem attigimus : confessim iterum lamentari seque jactitare coepit .

E X P E R I M E N T U M . III.

§. LIV. Similiter se gerebat aliis catellus , quum ei haec ligamenta eodem modo titillaremus . Quo vero majorem hiatum inancisceremur , ante tendinem extensem tibiæ præcidimus : cuius pariter nihil senserat , quum tamen ejularet , quamprimum volsella cutem apprehensam vellicaremus .

E X P E R I M E N T U M . IV.

§. LV. Hædum resupinatum , pedibus protensis alligavimus ad angulos tabulæ , in qua resupinaveramus . Tum divisa cute , reteximus ligamenta ab interiore parte cruris . Perpetim balavit , seque eripere luctatus est . Deinde ligamenta exterius lapide infernali lacestivimus : extensem tibiæ præcidimus , unaque capsulam aperuimus : tum etiam interius ligamenta lapide infernali stimulavimus . Nullam vocem emisit , & in

Tom. V.

S. s.

trans-



tranquillitate sua perficit. Ast, cum cutem resciſſam eodem lapide arroderemus, continuo iterum balavit.

E X P E R I M E N T U M V.

§. LVI. Idem experimentum, quod in hædo lapide infernali fecerimus, in catulo redintegravimus. Qui nihil magis percepit quam hædus, quum exterius pariter atque interius ligamenta corroderentur. Ast æque acuto, quin ferme adhuc acutiore sensu quam hædus valebat, quum cunctis incideretur, quo ad ligamenta pervenire possemus, & quum incisa cunctis lapide infernali tangeretur.

E X P E R I M E N T U M VI.

§. LVII. Canem ore conſtricto alligavimus, ſicut hædum. Tum pariter ei juxta genu, in cruris interno latere, diſiecta cute, ligamentum capsulare reteſimus. Quiritabat canis, & vehementer angebatur. Exspectavimus, dum fedaretur tumultus, tunc capsulam perforavimus, extenſore tibiæ reſciffo, quo major hiatus fieri poffet: deinde acu longa farcinaria ligamenta compunximus. Nullus inde ſensus ad eum pervenit: fervavit enim quietem. Postea ligamentum laterale externum aliquoties compunximus: adhuc tranquillitatem fervavit. Tandem per illud ligamentum acu trajecta, cutem pupugimus: continuo ſenſit, attraxit pedem, & irrequietus factus eſt.

E X P E R I M E N T U M VII.

§. LVIII. In hædo ſimiliter ut in cane, ligamenta acu longa farcinaria compunximus: cuius pariter nihil ſenſit. Ut primum vero, trajecto ligamento, cutem tetigimus, continuo balavit, & dolorem ſuum teſtatus eſt,

E X P E R I M E N T U M VIII.

§. LIX. Hoc experimentum cum longa acu denū repetivimus in alio cane vetulo, nec non in alio hædo, iterumque in catulo: sed nihil unquam doloris cuncta hæc animalia percepérunt, quando ligamenta acu ſtimulabamus. Simul ac vero per trajectum ligamentum cutem feremus, continuo ſolitis signis dolorem declararunt.

C O N.



C O N S E C T A R I A.

§. L X.

Ex præmissis igitur experimentis & observationibus evidenter apparet, omnem sentiendi facultatem à ligamentis abesse. Nec tantum de ipsis ligamentis hoc judicium ferri debet, sed idem quoque valet de velamentis eadem ambientibus, seu de membrana ipsorum propria, quæ peculiari nomine peridesmum [a] appellatur. Hac enim in nostris experimentis certe investita fuere ligamenta, quum ita, ut in naturali statu sunt, conservata fuerint, nec quicquam ab iis ablatum sit. Quam tamen hæc nihilo magis sensum aliquem prodiderint, etsi peridesmum una lœsum fuit; satis liquet, neque hoc sentiendi virtute prædictum esse. Id quod eo manifestius est, quo certius peridesmum præ ipsa ligamentorum substantia vellicatum fuisse oportet. Quum enim peridesmum exterius situm sit, totumque sub se ligamentum involvat, necessum est, ut hoc pri-
mum & potissimum tactum atque irritatum sit. Denique hæc membrana, quum de celluloso genere sit, non magis quam reliquæ telæ cellulosæ sentit.

§. L X I.

Ligamentis nullum inesse sensum, olim *Galenus* pluribus locis tradidit [b], ab his in primis dicens argumentum, quo tendines haud ita exquisite sentire ac nervos, adstrueret. Namque, ex ejus sententia, quum tendines partim ex ligamentis partim ex nervis compositi sint, quatenus de nervosa natura participant, ad sentiendum natūrā sunt; quatenus autem ligamentorum indolem adsciverunt, sensu vacui sunt, quandoquidem ipsa quoque ligamenta sensu careant. Quam argumentationem etsi nostram non facimus, & de tendinibus antea satis superque probavimus, eos omni sentiendi facultate cassos esse; hoc nihilo tamen minus inde collitur, *Galeum* à nostris partibus stare. Neque post eum memini quemquam anatomicorum, antiquiorum aut recentiorum, ligamentis per se sensum attribuisse.

§. L X I I.

Contra de superinducta iis membrana, seu peridesmio, communis esse videtur opinio, illam sensum habere. Quod primo propterea concedendum esse volunt, quia peridesmum ad membranas refertur, & ex earum

S. s. 2 ordi-

[a] Vid. *Winslowius in exposition anatomique*, *Traité des os frais*, §. 59.

[b] Ut, *de motu musculari*. Lib. I. cap. 2. *de usu partium* Libr. I. cap. 17. *de methodo medendi* Libr. VI. cap. 4. *de compos. medicam*, *secundum genera* Libr. III, cap. 2.



ordine est: membranas enim sentire credunt [c]. Deinde proprius adhuc argumentum inde dicitur, quoniam sub periostei classe comprehenditur quoque peridesmum: quum igitur perosteum ex hypothesi exquisitissimo sensu gaudet, necessario sequi videtur, ut etiam peridesmio eadem adsit potestas [d]. Verum enim vero, ut taceam, à perosteo alijsve membranis haud certo ad peridesmum concludi posse; quum statim post demonstratur simus, perosteum aliasve similes membranas, ipsas pariter sensu destitutas esse, tota hæc argumentatio per se corruit.

§. L X I I I.

Ceterum, sicut de tendinibus ostendi §. XXXVI, sensus dotem iis propterea minus convenire, quia variis tractionibus, compressionibus, ictibus, frictionibus, similisve molestiis perpetuo obnoxii sunt, qui, si sentiendi virtute instructi essent, perpetuos dolores crearent: ita de ligamentis adhuc magis affirmare licet, iis sentiendi facultatem maxime incommodam fore. Quum enim pleraque omnia sita sint in articulis, vel inter ossa, vel in muscularum tendinumve itineribus; his partibus commotis, ut perpetuo fit, non possent non ligamenta dolorem percipere, si sensu prædicta essent. Quod ut caveret natura, sapienter illis hanc virtutem negavit.

§. L X I V.

Nihilo tamen minus ex ea doctrina, qua peridesmum sentiendi facultatis particeps habitum fuit, nata videtur opinio, quæ ad omnes fere præxeos medicinalis magistros persuasit, scilicet dolores arthriticos podagrivosve fidem suam, præter alias partes, etiam in ligamentis habere. Nolo longus esse in recensendis auctorum nominibus: unum instar omnium excitabo, Magnum Boerhaavium, qui in aureis suis aphorismis de cognoscendis & curandis morbis [e], huic quoque sententiæ suffragatur. Nemo mihi vitio vertat, quod promeritam hujus summi viri auctoritatem deseram, quasi laudibus ejus aliquid detractum velim. Boerhaavius satis apud omnes eruditos & bonos laudatus est, longeque magis veris superat meritis, quam ut levis error, à quo humana natura parum cavit, commissus, ejus gloriæ detrimentum aliquod afferre possit: ego vero propter eximiam viri sapientiam, solidum ingenii judiciique robur, singularem in tradendis rebus medicis candorem, nobilem in omni vita magnitudinem animi, sinceram in Deum pietatem, ceterasque præclarissimas virtutes,

[c] Vid. Thom. Bartholini Anat. renovata, Libello IV. cap. 3. add. ib. Libr. I. cap. 4. & Libr. III. cap. 2.

[d] Vid. Winslow. alleg. loc. §. 59. 60.

[e] §. 1259.



tutes, tantam ejus concepi venerationem, ut ab eo vituperando quam alienissimus remotissimusque sim. Quod autem hunc potissimum auctorem nominavi, eo factum est, quo appareat, si tantus vir illum errorem haud effugerit, multo magis de aliis idem suspicandum esse.

§. LXV.

Potius in eo virum perspicacissimum sequor, quod caussam proximam articularis morbi scribit [f] esse viciatam indolem minimorum adeoque nervorum vasculorum: quam sententiam eo, quo pollet, cultissimæ eruditionis apparatu mirifice ornavit, & rationibus aliorumque suffragiis confirmavit vir magnificus & Illustris, Georg. Gottlob. Richterus, Praeceptor meus summo honoris cultu prosequendus, in prolusione *de materia & sede Podagra* [g]. Eo autem redit haec doctrina, veram in minimis nervosorum involucrorum vasculis inflammationem existere, quæ totam diri morbi tragoediam ludat: id quod etiam primarium symptoma, dolor, significare videtur, siquidem omnis talis sensus à nervis pendet, ut superius docui. Quodsi irritabilem nervosarum partium indolem ad inflammationis generationem declarandam applicemus, novam inde lucem accipit haec contemplatio, quemadmodum latius explicavit Illustris Segenus [h], Praeceptor æque meus maximopere colendus: itemque suavissimus commilito, Doctissimus D. Remus [i], cuius memoria & ob mentis virtutisque præstantiam semper mihi erit jucundissima.

§. LXVI.

Porro, quum ligamenta, propter defectum sensus, affectionem arthriticam concipere nequeant, & alibi fides mali querenda sit: nullus occurrit locus, nisi cutis nervosus contextus. Namque proxime sub cute ligamenta cingunt articulos, altiusque penetrare prohibent morbum, quum ipsa sensu vacua sint. Ast cutem in hoc morborum genere inflammatam & affectam esse, oculis manibusque patet, docent tumores, collecta in superficie materies calcaria, nodi, topi, cet. Præterea vidimus in omnibus experimentis cutem tenerrimo sensu donatam esse. Et docet antome, per eam innumerabiles nervorum propagines dispergi, suis extremis ibi definere, & sic verum tactus organon efformare. Quamobrem cutis proprius locus est, in quo saevitiam suam exercet arthritis: & articulares omnes morbi in cuticularium morborum numero habendi sunt.

Ss 3

§. LXVII.

[f] Alleg. loc. §. 1262.

[g] Qua ad Disp. inaug. Joach. Fürsenii *de Podagra retrupusa* invitavit d. 12. Sept. 1741.[h] In Diss. inaug. *de Paraprenitide*, sub ejus praesidio habita à Josepbo Antonio Linpruner, 1747. §. X. seqq.

[i] In diss. inaug. supra laudata, pag. 52-54.



§. LXVII.

Ex iis, quæ circa vulnera ligamentorum in experimento primo facta, contigisse observatum est §. L. LI, haud dubie licet colligere, eadem quantum ad ipsa per se ligamenta pertinet, nulla symptomata post se trahere, quæ alicujus sint momenti, perfaciliisque esse sanationis, & hanc nequaquam eo perturbari vel impediri, quod humor articularis, seu synovia, effluit.

§. LXVIII.

Quæ quum ita sint, nullum metum incutere debent lœsiones ligamentorum, nisi quatenus functionem articuli vel partium, quibus destinatis sunt, suspendunt ac pervertunt: ut, si ligamentis capsularibus articularibusve discisis nexus firmitasque membrorum tollitur: si disruptis annularibus musculi aut tendines ex situ suo excidunt &c. Hæc autem & similia, quum ad proprium fibrarum in ligamentis contextum & ad usum, quem reliquis partibus præstant, pertineant; sequitur, ut eatenus tantum à ligamentorum lœsionibus mala timeada sint, sicut in propositione (§. XLIX.) affirmavi.

SECTIO III. DE PERICRANIO ET PERIOSTEO.

PROPOSITIO.

§. LXIX.

Pericranium pariter ac periosteum omnis sentiendi facultatis exper-tia sunt.

SCHOLION I.

§. LXX. *Has duas membranas una opera tractare constitui, quoniam unius ejusdemque sunt indolis & usus, nec nisi loco differunt: nam pericranium idem est in ossibus capitis, quod periosteum est in reliquis.* Vid. Winslow. Exposit. anatom. traité des os frais, §. 361.

EXPERIMENTUM I.

§. LXXI. In hædo, qui in mensa apte collocatus erat, manibusque comprehensus tenebatur, bonam partem pericranii reteximus atque nuda-



nudavimus. Crebro balavit, quam diu hæc apparabantur: idemque fecit, quoties cruentum spongia detergebamus. Nudata omnino parte pericranii, hoc lacestivimus scalpello, & decussatim per longitudinem & transverse secuimus. Hic non mutavit hædus, nec se commovit: sine dubio, quia nihilo doluit. Inquinabat autem adhuc pericranium sanguis perpetuo promanans: qui dum abstergebat spongia, continuo iterum balabat; neque enim hoc fieri poterat, quin cutis incisa simul tangeretur. Non minus confestim indoluit animal, quamprimum hanc cutem arreptam volfella compressa paululum modo vellicaremus.

EXPERIMENTUM II.

§. LXXII. Idem experimentum eodem modo in catulo renovavimus: qui plane similiter ac hædus se gescit.

EXPERIMENTUM III.

§. LXXIII. Eandem rem in uno adhuc catulo binisque hædis denuo tendandi occasionem arripiimus, quum experimenta in pia matre caperemus. Semper idem consecutum est, & minime doluerunt animalia, sive pungeretur pericranium, sive se caretur, sive adeo de cranio abraderetur.

EXPERIMENTUM IV.

§. LXXIV. In hædo, post denudatam integre partem pericranii, hoc butyro antimonii tetigimus. Haud sensit. At, dum præparatio facta erat, balaverat: idemque continuo occœpit, quando cutis incisa butyro prædicto contingebatur, aut volfella vellicabatur.

EXPERIMENTUM V.

§. LXXV. Fuit nuper miles, cui ab altero per imprudentiam quedam minuta grana fusi plumbi (*Schrot*) in frontem, supra supercilia, ab intervallo paulo longiore, sclopeto incusfa fuerant. In hoc, quum aliquot grana ex frontali musculo excidenda essent, ansam cepit magnus noster Præceptor, Perillustris *De Haller*, specillo irritandi pericranium. Sed nullus inde sensus ad ægrum pervenit.

EXPERIMENTUM VI.

§. LXXVI. In cane, ab interiore tibiæ latere, bonam partem petroitei



riosteis nudavimus, tum illud scalpello compunximus cecidimusque secundum longitudinem & transversim, ita ut ictus ad os usque pertingerent. In quo non mutavit canis, neque pedem attraxit: quod tamen fecerat, unaque ejulaverat, quum cute dissecta periosteum nudaretur: idemque repetit, quum postea cutis incisio longius produceretur.

EXPERIMENTUM VII.

§. LXXVII. Iisdem tentaminibus quoque subjeci alterum canem, duos catulos, totidemque hædos: ab omnibus & singulis ne minimum quidem signum doloris aut sensus editum fuit, quum periosteum pungatur vel cæderetur. Sed si tantillum cutis incideretur, continuo hædi balaverunt, canes autem ulularunt.

EXPERIMENTUM VIII.

§. LXXVIII. In cane & hædo periosteum tibiae stimulavimus spiritu nitri fumante: nullus inde sensus in his animalibus excitatus est. Contra, spiritu ad internam superficiem separatae cutis admoto, statim dolorem inde natum solitis signis declararunt.

EXPERIMENTUM IX.

§. LXXIX. Lapide etiam infernali periosteum arrosimus in catulo & hædo: nihil ejus senserunt.

SCHOLION II.

§. LXXX. Hoc loco præterire nefas duco experimentum à Nobilissimo Walstorffio, amico meo in paucis charo, qui brevi nobis perdoctam dissertationem de experimentis quibusdam circa cerebrum, cerebellum & duram matrem institutis publice proponet, narratum. Nam et si non à memet ipso captum sit, tamen dignissimum relatu est, quia partim in homine tentatum, partim quam diligentissime peractum est. Est autem sequens.

EXPERIMENTUM X.

§. LXXXI. Erat mulier, cui pedem amputare oportebat, quia pes infimus inferiusque tibiae extremum carie pœresa erant. Opus exsecutus est vir artis sue peritiissimus, *Schlotgius*, pedestris legionis Blockianæ chirurgus primarius, *Walstorffii* nostri affinis. Norat Clarissimus *Walstorffius* animi fortitudinem mulieris, quæ & ipsa ultro amputationem poposcerat: cupi



cupidus ergo in periosteо periclitandi, num revera sensu careat, dixit mulieri, fеse admonitorum esse ipsam, ubi in operatione ad os pervenit fuerit, ut tum attenderet, an dolorem sentiret necne. Respondit mulier: se probe scire, tum ingentem sibi dolorem futurum esse; nam, ut ab aliis acceperit, maximum in amputatione membra dolorem tum persentisci, quando tenuis quædam membrana ab osse deraderetur. Quum ille contrarium ipsi persuadere contuleret, pollicita est, se fore attento ad eam rem animo. Igitur dum cutis cum subjecta carne refecaretur sursumque retraheretur, oculis irretortis operationem adspexit, licet adstantes hoc ei dissuaderent: interim tamen præ dolore vehementer clamitavit. Ubi vero jam tempus instabat, quo periosteum abradendum erat; admonuit ipsam Cl. *Wafforffius*, nunc attenderet. Obscuta est: at nequam clamavit. Interrogata ab illo, num dolorem sentisceret? negavit. Postquam curatio maximam partem absolute erat, Amicus noster suavissimus iterum ei quod factum erat, in memoriam revocavit, interrogavitque, an tum, quum ipsam admonuisset, & periosteum abrasum fuisset, nullum percepit dolorem? Respondit, se ne minimum quidem doloris expertam fuisse.

CONSECTARIÆ.

§. LXXXII.

Ita contra nostram & omnium scriptorum exspectationem hisce oculis vidimus, membranam ossa proxime investientem sensu minime donatam esse: neque hoc tantummodo in brutis animalibus cognitum fuit, sed in humanis corporibus pariter verum esse constitutus genio experimento V. & X. Quid autem magis adversatur recepta per universum orbem medicum doctrinæ, quam has membranas sentiendi facultate destitutas esse? Quis fuit medicorum, aut chirurgorum, aut anatomicorum ante nostra tempora, qui periosteо pericranioque præcipuum quendam in sentiendo dolendoque gradum non tribueret, & illi uni in plurimis profundiorum dolorum generibus causam, sive sedem, cruciatus adscriberet? Neque necessarium est, & nimis longum fore, testes producere, quum omnes sint: itaque trium viros tantummodo præstantiores, auctores excitabo, *Frid. Hoffmannum* [k], *Job. Zachariam Platnerum* [l], *Jac. Benignum Winslowium* [m].

§. LXXXIII.

[k] in *medicina systematica*, Tomo 3. Sect. 1. cap. 4. §. 20. 21. & Tom. 4. Part. 2. Sect. 2. cap. 1. 8. 9. 10. 11. passim.

[l] in *Instit. Chirurg.* §. 1070. seqq. edit. germ. conf. illustr. *Heister* in *Chirurg.* cap. de Paronychia.

[m] in *Exposit. Anatom.* traité des os frais, §. 60.

Tom. V.

T



§. L X X X I I I .

Clariss. *Zimmermannus* [n] dubitat quidem, utrum periostea sensu prædicta sint necne: pronior tamen ad negandum videtur. Sed de pericranio affert experimentum, ubi illud in cane oleo vitrioli tactum fuit, unde canis vehementissime clamavit. Addit, *pericranium nervis plenissimum esse*, *hinc non mirum*, adeo acute sentire. Verum enim vero, sicut à communi nostro magno Præceptore, Perill. *De Haller*, didici, nulli existunt in pericranio nervi, que nadmodum nec in reliquo periosteo: sed super utramque membranam, præsertim sub cute crani, permulti decurrunt nervi ex cuticularium genere, aliis in locis plures, in aliis pauciores, qui si minus perfecte removentur, facile membranæ os obtengenti adscribi possunt, & sensus, aut dolor, à nervorum istorum attactu proveniens, tanquam ex subjecta membrana productus videri. Quamobrem suspicari licet, ab his nervis haud satis separatis fuisse factum, ut pericranio culpa cutis tribueretur.

§. L X X X I V .

Quodsi in hoc negotio fallacia caußæ adhuc commissa est; unde tum dolorem illum dirum & velut osteocopum ducere convenit, quem perfentiscit tibia, si ab anteriore parte, ubi parum tegumentorum os subiectum operit, contra duram rem offenderit? Respondit gravissimus perfectissimusque Anatomicus, Illustris *De Haller*, quum hanc ei quæstionem proponerem: cellulosam pariter ac cutem multis instructam esse nervis, à crurali anteriori propagatis, & à posteriori sede cruris ad anteriorem circa anteriorem acutumque marginem tibiæ conflexis; quum igitur hæc cutis & cellulosa asperum os arcte vesciat, in offensione duriore collisos contra ossa nervos dolorem sentire. Pari ratione ad alios similes casus respondendum erit.

§. L X X X V .

Erunt fortassis, qui à dura matre argumentum repetant, quo probent periosteis sentiendi facultatem utique competere & tribui oportere. Dicent enim, duram meningem per se suaque natura sensus participem esse, quia membranarum nobilissima sit & cerebrum, sensuum officinam, includat atque contineat; tunc etiam pluribus nervis instrui, qui ipsi virtutem sentiendi largiantur. Jam vero satis constare, periostea cuncta externa duræ matris esse propagines [o]: quare, quin simili quoque sentien-

[n] In diff. sivepius laudata, §. 8. pag. 9.

[o] Vid. Perill. *Halleri Comment. in Praelect. Boerhaav.* Vol. 2. §. 304. & Vol. 3. §. 306; itemque ejusdem prim. lin. physiol. §. 341.



tjendi virtute imbuta sint, dubitandum non esse. Cui objectioni ut occurram, primum animadverto, ipsam duram meningenem recentissimis experimentis & observationibus deprehensam fuisse sensus expertem; quemadmodum Lamotius [p], Jo. Gottfr. Zinnius [q] Job. Georg. Zimmermanus [r] ostenderunt: quam sententiam rationibus quoque validissimis iidem egregii viri confirmarunt, in primisque Doctiss. Zinnius [s], & nunc percipimus experimentis Parisiis apud chirurgum suis factis confirmari. Idem etiam Cl. Zinnius demonstrat, quam parum praesidii pro duræ matris sensu sit in ea opinione, quæ membranas pro veris sentiendi instrumentis habet: pariterque in eo, quod cerebrum comprehendit hæc meninx: nervos autem duræ matri tributos ita incertos esse monet, ut nihil inde concludi possit. Deinde, si vel maxime nervi duræ meningi intexti forent, tamen non sequitur, ut iidem ad periostea quoque pertingant: quum contrarium potius credibile sit. Dura meninx ergo sensu periosteorum patrocinari nequit, oculisque nostris, qui sensu vacua videbunt, potiori jure assentiendum erit.

S E C T I O I V . D E P I A M A T R E .

P R O P O S I T I O .

§. L X X X V I .

Pia mater nullo sensu gaudet, nec dolori concipiendo patet.

E X P E R I M E N T U M I .

§. LXXXVII. In hædo cranium perforavit Illust. Hallerius, & remota dura meninge, piaque reiecta, hanc bacillo, qui butyro antimonii tinctus erat, tetigit. Is locus rugosus factus est, & album contraxit color: sed nullus inde doloris sensus ad animal penetravit. Contra, quamprimum nares digitis compressis vellicarentur ab adstantibus, e vestigio clamores sustulit: idemque fecit, quum cutis capitis incisio paulo magis produceretur. Antea quoque balatus toties ediderat, quoties spongia tergebatur sanguis, qui in perforatione cranii promanaverat: nam cutis difissa semper una tangebatur. Postremo alium parvum bacillum per cere-

T t 2 brum

[p] in *Traité complet de Chirurgie*, Tom. I. p. m. 48.

[q] in Diff. inaug. quæstis experimenta quadam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningenem in vivis animalibus instituta, Gott. 1749. pag. 30. seqq.

[r] in cit. Diff. §. 5.

[s] Loc. cit. pag. 43. seqq.



brum transadegimus versus oblongatam medullam ; quo vehementissimas incidit in convulsionies.

E X P E R I M E N T U M II.

§. LXXXVIII. Idem periclitati sumus in alio hædo & in duobus catulis, semper experti piam matrem sensu destitutam esse : nam quum eam butyro antimonii corroderemus, nullam vocem ediderunt animalia. At ubi dissectam cutem butyro dicto leviter tantum attingebamus, aut volsella vellicabamus ; continuo balavit hædus, vel ejulaverunt catuli.

C O N S E C T A R I A.

§. XXXIX.

Igitur jam certius nobis de sensus in pia meninge absentia constat experimentis, quæ necdum à quodam instituta crediderim. Quamobrem in doloribus capitis & in irritationibus nervos generis quibuslibet, sive per idiopathiam accidunt, sive per sympathiam, ut in phrenitide, paraphrenitide, deliriis febrium, hungarica febre, cet. perperam accusatur insensata mater, quod aliquæ vel adeo primariae ejus in his partes sint : quemadmodum faciunt Franc. Joel [t], Laurentius Bellinus [u], Mich. Ettmillerus [x], Georg. Ernestus Stahlius [y], Herm. Boerhaavtus [z], quin tota practicorum cohors, communem opinionem secuta. Plerumque vero utraque meninx simul accusari solet : sed quum nec duram matrem sensus aut doloris participem esse §. LXXXV. demonstratum sit, nec piam in proximis experimentis ; in aliis nervosis partibus sedes istorum dolorum atque irritationum querenda erit : quas partes tamen hic exponere nihil attinet [a].

§. XC.

Consentit vero nobiscum meritissimus de omni re medicinali vir, Fridericus Hoffmannus [b], qui pariter piam matrem, ejusque externam membranam arara-

[t] in *Præctica*, Libr. 1. Sect. 1. & 2. Operum Tomo 2.

[u] *De morbis capitis*, titulo Phrenitis, præsertim pag. 489. edit. Lips. 1685. 4. cum libb. de urinis & pulvis &c.

[x] in *Prax. Libr. 1. Sect. 18. cap. r. Artic. 14. & alibi.*

[y] in *Praxi Stahliana à Job. Storckio edita*, Sect. 4. §. 20. p. m. 1411.

[z] in *Aphorism. de cognoscendis & cur. morbis*, §. 776.

[a] Videri autem potest Cel. Zinnius in saepius laudata dissertatione, pag. 50. ubi demonstrat, symptomata phreniticorum non ab inflammatione duræ matris provenire, sed potius ab inflammatione corticis, qui sensillissima medulla cerebri continuus est.

[b] in *medic. System.* Tomo 4. Part. 2. Sect. 2. cap. x. §. 4.



arachnoideam, minime molestæ sensationis sedem constitueret, his usus argumentis, quod careant fibris tensilibus nervosis elasticis, atque etiam nervorum rami, ibi non conspicendi. Quod etiam celeberrimorum Anatomicorum descriptionibus congruum est: nam & Illustr. Heisterus [c] diserte negat, nervos, hujus membranæ substantiam intrantes, ullos observatos esse: nec Winslowius [d] ullam eorum facit mentionem. Et quid hic nervis aut sensu opus est, quum ordinandis tantum vasis destinata sit pia mater [e]? Itaque etiam à priori, ut dicitur, demonstratum est, ab hac membrana sensum irritationis & doloris abesse.

SECTIO V. DE PLEURA.

PROPOSITIO.

§. XC I.

Membrana pleuræ sensu caret; vel, quo modestius loquar, non tanta sentiendi facultate pollet, ac pars musculosa & cutis exterior.

SCHOLION L

§. XCII. Thesis hanc propterea aliquanto remissus affirmavi, quia in reliquis, præter hædos, animantibus experimenta, propter magnam denudande pleuræ difficultatem, haud satis perfecte successerunt, nec spem nostram impleverunt.

EXPERIMENTUM I.

§. XCIII. In catulo, quem firmiter comprehensum teneri jussimus, delecto in dextra pectoris parte loco, qui quam minimum carnis palpandum dabat, cutem discidimus, & inter binas costas, quam cautissime fieri poterat, quod erat musculosi removimus: quæ dum fiebant, catulus vehementer ululavit, seque exsolvere coninxus est. Minuta tandem pleuræ particula ab omnibus carneis fibris repurgata atque reecta, id quod non nisi admodum operose fieri poterat, quia locus, ob respiratio-
nis motum, tunc multo, quam ubi animal quiete se gerit, intensiore, perpetuo concutiebatur, illam bacillo, quem spiritu nitri fumante tinxe-

Tt 3 ramus

[c] in compend. anatom. De Pia Matre.

[d] Exposit. anatom. tr. de la tête, §. 49. seqq.

[e] Vid. Perillustris Hallerii ad Boerhaavii prælect. Vol. 2. §. 236. pag. 371. not. b.



ramus, tetigimus. Eo ipso, quo pleura adurebatur, momento tranquillum fuit animal: sed quia locus justo angustior erat, & nos non satis caute agebamus, forte accidit, ut inter respirandum pars musculosa spiritu contingenteret; quo facto, confessim iterum vehementer vociferari coepit. Quum deinde contendemus, amplius pleuræ spatium nudare, factum est ob ingentem catuli inquietudinem, dum amicorum aliquis brutum paulo laxius cohiebat, ut nos scalpello pleuram perforaremus.

E X P E R I M E N T U M II.

§. XCIV. Canem, ore constricto, resupinatum, quatuor pedibus firmiter alligavi, & manu ventrem premens, operam dedi aliquo modo impedire, ne pectus ita valide reciprocante motu agitaretur. Designato pariter in dextra parte pectoris loco, quo costæ proprius tangebantur, parvum pleuræ spatium ab omnibus musculosis fibris, maxima cum cautione, ipse nudavit Perillustris Dn. *De Haller*. Interea canis vehementer quiritabat, & magnopere nitebatur, quo se solveret. Post moram interpositam, donec animal tranquillum factum esset, pleuram scalpello lacefivit: quod dum fiebat, nullam vocem edidit canis, & tranquillior fuit quam antea. Erat autem hoc nudatum pleuræ spatium nimis angustum, quam ut butyro antimonii posset aduri, siquidem in agitatione loci facilis fuisset butyri ad musculosas partes aberratio. Quamobrem pleuram amplius retegere coepit Summe Venerandus *Preceptor*: sed animal ingentem passum est inquietudinem, & effecit, ut apice scalpelli foramen in pleura insigeretur. Tum thoracem aperuimus, & butyro antimonii faciem internam pleuræ, nec non mediastinum stimulavimus: sed non animadvertisimus, canem ejus rei aliquem sensum habuisse. Quamprimum vero nervum aliquem volfella apprehendebamus, continuo se commovere coepit.

E X P E R I M E N T U M III.

§. XCV. Idem in pleura tentare, denuo in alio cane instituimus: sed quum pleuram nudare laboraremus, jamque parvum ejus spatium ferme nudassemus, canis adeo ferociter se jactitavit, ut, quantumvis magna adhibita diligentia, cavere non possemus, quin apice scalpelli pleuram perforaremus. Statim aperuimus thoracem, & butyro antimonii pleuram ab interiore facie, itemque mediastinum lacefivimus: id canis non visus est sentire. Apprehendimus autem similiter volfella nervum quandam: tum vehementer exagitatus est.

S C H O L I O N II.

§. XCVI. Quoniam hædi pacatoris placidiorisve naturæ sunt quam canes,
spem



spem concepimus, eos his tentaminibus aptiores fore. Quum igitur hos adhibemus, feliciore eventu sequentia cepimus experimenta.

E X P E R I M E N T U M IV.

§. XCVII. Hædo similiter, ac in canibus observatum erat, apte collocato, pedibusque ejus quatuor eodem modo alligatis, manu in ventre posita præpedientes, ne in spiritu ducendo thoracem nimis exagitaret, pariter in dextro latere pectoris, ubi minimum carnis reperiebatur, cutem incidimus, quidquid musculosi erat quam cautissime separavimus, cruemque spongia probe detersimus. Quæ dum fiebant, animal acriter balavit, non tamen adeo valide, ac canes, contendit se liberare: neque respiratione concitata tantum impedimenti objicit nostro labori. Bona pleuræ parte ab omnibus carneis fibris nudata, hædoque non amplius clamante, quod æque nos nunc non secaremus; hanc partem pleuræ, per quam pulmonum actio conspici poterat, lacestivimus scalpello, lapide infernali, guttulaque butyri antimonii, semper locum mutando, siquidem spatum satis patebat. Düm hæc fiebant, animal nihil omnino clamoris edidit. Tunc cutem parumper incidimus, tanquam spatum dilataturi: continuo iterum balavit. Ex quo vero non amplius scindebamus, denuo quietem egit. At quum aliquid musculosi butyro antimonii tangeremus, clamorem iterum sustulit. Posthæc de industria satis ample foramine pleuram pertudimus: quo facto, quia vociferari non poterat, tamen propter irrumptentem aërem angoresque creantem, vehementer se jactitavit.

E X P E R I M E N T U M V.

§. XCVIII. Eandem rem præterea in duobus aliis hædis pari modo periclitati fumus: per omnia vero similem priori effectum res habuit.

C O N S E C T A R I A.

§. X C I X.

Consentient ergo nostra experimenta, quæ fere omnia Perillustris Moderator noster pro sua humanitate suavitateque, ob difficilem præparacionem & magnam, qua opus fuit, cautionem, ipse instituere non gravatus est, cum illo Cl. D. Zimmermanni [f]. Posset quidem opponi, quum dolor, quem animalia, dum ad retegendam pleuram excarnificantur, persentiscunt, maximus acutissimusque sit, fieri potuisse, ut propterea minorem dolorem, qui ab irritatione pleuræ producebatur, non animadverterint,

[f] In diff. sèpius alleg. §. 4. pag. 4.



terint, neque aliquo signo prodiderint: siquidem alias quoque major dolor minorem obscurare solet. Verum, quum in nonnullis istorum animantium, præsertim in hædis, sat manifeste cognitum fuerit, eos & dum tentaretur pleura, si quid musculosi tactum erat, statim iterum dolorem suum significasse, (Exper. I. II.) & postquam in pleuræ irritatione prægressa nullam vocem emiserant animalia, nihilominus succedente quantumvis levem cutis incisionem, vel nervi compressionem, probe animadvertisse, (Exper. III. IV. V.) non est putandum, quamvis minorem dolorem obscuratum fuisse, sed nullum extitisse appetet, qui nullo signo animadversus fuerit.

§. C.

Hoc etiam suffragatur nostræ doctrinæ, quod officio aut scopo pleuræ minus conveniens esse videtur, ut sentiendi vi polleat. Etenim ad hunc solum usum pleura constructa est, ut partes thorace contentas obtegat involvatque, tunicam iisdem extimam largiatur, easdem a mutuo confictu prohibeat, & locis quasque suis adstringat, denique costis quasi periosteum internum præbeat. Quas ad res, tantum abest, ut sensu opus sit, ut is potius contrarius sit: longe aliter quam in aliis experimentis, exempli causa in membrana oris & alimentarii canalis, similibusque.

§. C I.

At contra hanc nostram sententiam vehementer pugnat, quod plurimos pleuræ nervos intextos esse volunt: in quibus etiam numerandus Celebrissimus *Winslowius* [g]. Verum enim vero, sicut jam de perioste pericranio §. LXXXIII. dictum est, existimare convenit, non in ipsam membranæ pleuræ substantia nervos intextos esse, sed ejus superficiebus, tanquam firmæ basi, solum instratos, ut super eam ad destinata loca decurrant: quo itinere facile speciem præ se ferre possunt, ac si membranam ipsam constituerent.

§. C II.

Quum igitur pleuræ membrana sentiendi facultate careat, illi dolores laterum pectoris, qui Græcorum nomine pleuritidis notissimi sunt, non possunt in illa thoracem interius succingente membrana sedem habere, ceu vulgo creditur, sed aliis locis nervosis ac musculosis assignari debent, quales in pectore ejusque ambitu plurimi sunt. Est enim hic morbus in sanguinis inflammatione positus, qui sanguis ibi locorum per plurima vasa copiose affuit, &, si per morbum substiterit accumulatus, producit, velut in aliis inflamm-

[g] *Traité de la Poitrine*, §. 25. & 36.



inflammationum generibus, cum reliquo symptomatum satellitio etiam atroces istos dolores. Quam hujus morbi ideam præclare ex vasorum sanguiferorum, in primis intercostalium venæque sine pari decursu partiumque connexione explicavit Illustris *Brendelius* [h], Præceptor etiam meus ad cineres usque magnopere colendus. Et quod à sanguine congesto pendeat hic dolor, eo comprobatur, quia sanguinis missione quam optime solvitur; quemadmodum spuria pleuritis scarificatione ipsius affecti loci sanari potest.

§. C I I I.

Tandem ea, quæ de pleuræ cognita sunt, etiam ad reliquas, quæ ex pleura productæ sunt, membranas transferre licebit, hoc est, existimare, ut mediastinum, exterior septi transversi membrana, tunicæque pulmonum extimæ, quatenus pleuræ texturam atque indolem servant, pariter sentiendi facultate destitutæ sint. De mediastino nobismet ipsis hoc tentando compertum est, (§. XCIV. & XCV.); in pulmonibus autem periclitatus Cl. *Zimmermannus* [i] idem animadvertis.

S E C T I O VI . D E P E R I T O N Æ O.

P R O P O S I T I O.

§. C I V .

Peritonæum sentiendi facultate caret: pariterque membranæ, quæ ex peritonæo productæ sunt.

E X P E R I M E N T U M I .

§. CV. In cane, quem similiter atque in experimento de pleura capto constrinxeramus, cutem in alterutro abdominis latere per aliquod spatum discidimus, quod erat musculosi separavimus, bonamque peritonæi partem omnibus fibris carneis, ea qua decet cautione, nudavimus, simul cruentem, qui nobis erat impedimento, spongia detersimus. Interea dum haec parabantur, & dum sanguis abstergebatur, canis quiritus, seque jactare connixus est. In universum enim animalia ferre nequeunt, si sponsa crux detergatur, in quacunque parte hoc fiat: nimur quia tali modo semper incisa cutis in facie interiore lanoso & aspero tactu spongiae per-

Tom. V.

V v

strin-

[b] in Diff. inaug. *De Pleuritide vera & Pleuropneumonia*, sub ejus præsidio habita à Job. *Christoph. Lammers*, Götting. 1744. §. 12. seqq.

[i] in Disp. alleg. §. 16. pag. 17. seq.



stringitur. Tranquillitati reddito cane, nudatum peritonæi locum scalpello lacefivimus, deinde etiam butyro antimonii: restitit tranquillus, neque commotus est. At quum posthac dissectam cutem in facie interiori, tum quoque partem aliquam musculosam butyro antimonii corroderemus; utroque casu cœpit ululare seque jactitare. Abdomen quadantenus aperiuimus: iterum quirabatur. Quum conquevisset, ab interiori facie peritonæum butyro antimonii stimulavimus: nihil sensit. Verum volsella ea, quæ disiecta erant, cutem scilicet & musculos, apprehendimus compressissimumque: confessim inde dolorem percepit.

E X P E R I M E N T U M II.

§. C VI. In hædo, quem, pariter ut in experimento pleuræ, ligaveramus, quemadmodum in cane bonam partem peritonæi, multos inter balatus, denudavimus. Qno facto, eam membranam lapide infernali tetigimus, alioque loco spiritu nitri fumante. Sed nihil sensit, nam neque balavit: quod pariter omisit, quum postea peritonæum in facie interiori stimularemus. Contra satis sensit, quum musculosam partem eodem spiritu aduraremus.

E X P E R I M E N T U M III.

§. C VII. In alio hædo peritonæum reectum butyro antimonii lacefivimus: quod tamen nec ab exteriore facie nec ab interiori sensit. Compressit vero amicorum aliquis paulo fortius ejus nares digitis: quod statim sensit.

E X P E R I M E N T U M IV.

§. C VIII. Præterea adhuc in alio cane peritonæum butyro antimonii corrosimus: sed æque nihil ejus sensit.

C O N S E C T A R I A.

§. C IX.

Haud quidem meminimus, qui peritonæum sentiendi facultate gaudere dixerit, aut propugnaverit. Nihilo tamen minus, quum facile alicui subnasci possit dubitatio, utrum ad illas corporis partes, sive membranas, quibus sensus inest, referendum sit peritonæum, necne, experimentis in eam rem inquirere dignum videbatur Perillustri *Praeceptori*, quo sic certum statueretur judicij ferendi fundamentum. Eo certius autem jam constat, peritonæum non sentire, quo magis idem à nobis novo studio repertum est, quod



quod Cl. D. *Zimmermannus* antea deprehendit: hic enim pariter in peritonæo pericula fecit, illudque sensus particeps haud esse perfidet [k].

§. C X.

Neque videtur, sentiendi virtutem ad illum, quem peritonæum præstare debet, usum vel officium requiri, adeoque huic potius fore contraria. Scopus enim, quem in peritonæo procreando præfixum habuit natura, sine dubio is est, ut illud viscera aliasque nonnullas partes ventris involvendo, à mutuis vexationibus & confusione tuta præstet: quamobrem & productiones undique emitit pro tunicis partium extimis constituendis, & extensionis capax est, si majorem molem acquirant partes, quas continet, ita tamen, ut partibus iterum diminutis, illud pariter ad pristinum actuorem modum redeat. Quodsi sentientis esset naturæ, non posset non fieri, quin istis in mutationibus variisque partium motibus functionibusque sæpe doloribus obnoxium foret. Hoc igitur ut caveretur, sensus expers factum est.

§. C X I.

Neque arbitror, in ipsa peritonæi substantia intextos reperiri nervos: sed, qui à nonnullis auctoribus ei tribuuntur, tantummodo per ejus superficiem transire. Et his quidem, ubicunque existant, utique sensus inest, & cumdem exserunt, si feriantur: quod tamen haud decet ad peritonæum referri.

§. C X I I.

Quæcunque vero de peritonæo ipso dicta sunt, etiam de ejusdem productionibus, seu processibus, & tunicis partium imi ventris extimis intelligere par est, quatenus eandem cum ipso peritonæo naturam retinent. Quod pariter experientiae consentaneum est: nam Cl. D. *Zimmermannus* [l] factis experimentis invenit, hepar & lienem haud percipere irritationem; quod procul dubio quoque de exteriore eorundem membrana valebit.

E P I L O G U S.

Pedem hic figo. Fateor quidem, multa adhuc singulis capitibus addi possisse: quod autem nec per temporis nec instituti rationem licitum fuit; in majorem enim molem jam excrevit hoc specimen, quoniam initio putaveram. Quoad maximam partem tamen generaliora indicavi, quibus facile ad ob-

V v 2 jectio-

[k] Vid. ejus sæpius alleg. differt. §. 4. Experim. 3. pag. 4.

[l] Loc. cit. §. 16. Experim. 2. pag. 17.



jectiones à specialioribus petitas responderi potest. Quod vero tot experimenta eaque tam prolixè enarraverim , factum est , ut unusquisque videat , an in factis ipsis experimentis , an ex iis deductis conclusionibus fallacia quædam à nobis sit commissa.

F I N I S .



DISPU-



C X L V I
CHRISTIANI GOTTL. LUDWIG;
D E
C O L L O F E M O R I S E J U S Q U E
F R A C T U R A.
P R O G R.

Lipsiæ 27 Jany. 1755.

Z z 3

