

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Disputationes Chirurgicæ Selectæ

Haller, Albrecht von

Lausannæ, MDCCCLV.

VD18 90538889

Sectio I. Resolutio problematis chirurgici de extractione Cataractae ultra perficienda.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16577

monstratio. Resolutio præcedit demonstrationem. Separatim hoc igitur ordine duo hæc tractabimus momenta. *Duae inde partis hujus secundæ emergunt sectiones*, quarum [a] *prima* sicut resolutionem [b], *altera* vero demonstrationem problematis hujus chirurgici. Sequitur ideo.

S E C T I O I.

Resolutio problematis chirurgici de extractione Cataractæ ultra perficienda.

§. LX. Si rigorosam desiderares problematis præfixi resolutionem atque *liberioris demonstracionem*, ad hanc pariter atque istam omnino plura prævia requiri dicendi gererentur principia, eorumque multo fusiōres disquisitiones, si quidem hac *series*. vice me tam rigorosum esse voluissem. Malui vero rem præsentem liberiori tentare *methodo*, observata tamen ea scribendi generis accuratione, quæ om̄nem, quam vulgo sibi sumunt, methodo geometrarum non plane rigorosa scribentes, licentiam prohibet excedentem. Hoc consilio præmissa instrumentorum ad proponendam hanc curationis cataractæ speciem necessariorum notitia confitim me ad ipsius nostri *problematis resolutionem* accingam, subjuncta postea eorum explicatione, quæ ad caput rei plenius intelligendum facere potest.

§. LXI. *Instrumenta*, quæ ad cataractam nostra methodo extrahendam requiruntur, sunt [a]: *lanceola* myrtiformis plano-convexa, ex utroque latere secans, cuspidem habens tenuissimam acutissimamque, & in ea, qua cum manubrio conjungitur, parte paululum incurvata [b]; *specillum sulcatum* [*Gallis: sonde creuse*] ex chalybe confectum, extremitate gaudens polita, rotunda, non sulcata, sulco prædicta paululum profundior, & in marginibus suis bene lœvi nec inæquali, quod denique manubrii loco *volsellam* habet non dentatam, sed planam [c]; *forfex* brachia habens recta, tenuia, juxta manubrium incurvata, & quæ ad extremitatem eorum usque ejusdem sunt crassitie [d]; *acus* post cuspidem ipsius acutissimam bene lœvis & polita [e]; *cochlear* denique parvulum argenteum, quod manubrii loco *volsella* iterum instructum est.

§. 62. Jam (§. 60.) succedit ipsa *resolutio problematis*, nostri chirurgici de cataractæ extractione ultra perficienda. Ut nempe operatio hæc evadat perfectior, ita eam instituendam esse censeo: 1.) explorato morbo, 2.) præparatisque ægro, 3.) ministris, 4.) instrumentis §), & reliquis ad operationem requisitis, 6.) ex adverso considerant æger atque Chirurgus, 7.) ita ut hic altiorem, 8.) iste vero inferiorem habeat situm, 9.) sub quo lux inter utrumque permeare, & in oculum operationi obnoxium manumque operatio-

Excusatio

demonstracionis

series

re

mentis ad sequentem operatio-

nem pertin-entibus.

re

ratoris libere illabi potest. 10.) Devinciatur oculus alter fascia aut strophiolo, 11.) transmissisque ægri pedibus inter chirurgi pedes, 12.) atque depositis ipsius supra hujus genua manubus, 13.) ab uno ministrorum observandis, 14.) sumatur lanceola supra descripta, ut calamus apprehendimus scriptorium [§. 61.]. 15.) Jam alter ministrorum caput ægri sursum retrosumque ad se reclinet, 16.) palpebramque superiorem attollens, 17.) & digitos suos quam levissime apponens, 18.) mobilitatem bulbi oculi caute moderet. 19.) Palpebram vero inferiorem chirurgus deprimat, 20.) dito iterum bulbo oculi leniter apposito, 21.) ejusdemque volubilitatem moderate dirigente 22.). Oculo nunc ægri, monente artifice, sursum moto, debiteque posito, 23.) in medio inferioris hemisphærii corneæ, 24.) linea distantia supra marginem, quo cornea scleroticæ jungitur, 25.) lanceola semper ad mobilitates oculi incertas attemperata, 26.) brachio in mensa juxta posita susfulto, 27.) in dicto [n. 23., 24.] corneæ puncto apponatur placideque demittatur, 28.) moxque sursum versusque pupillæ centrum uveam inter atque corneam directa altius introducatur, 29.) & tandem ista, eadem via & dexteritate reducta, iterum extrahatur. Hæc primum operationis compleat stadium. Quo absoluto sepositoque priori instrumento 30.) sumatur spongia, 31.) aqua tepida imbuta, 32.) iterumque modice expressa, 33.) eaque eluat ur plorans oculus. 34.) Hanc seponendo manu sinistra comprehendatur specillum [l. c. lit. b.] supra descriptum, 35.) dextra vero manu forfex 36.) dito annulari, annullo forficis inferiori, pollice vero superiori ipsius annulo immisso. 37.) Utraque interim palpebra per ministrum, cautione jam indicata, [no. 16-20.] remota, 38.) specillum fulcatum per vulnusculum, lanceola arte factum, immittatur, 39.) atque inter uveam & corneam, 40. oblique ascendens, 41.) manubrio interim paululum declinante, 43.) usque ad lineam horizontalem, corneam in medio ipsius secantem, inque duo æqualia hemisphæria dividentem, 44.) circa scleroticæ cum cornea in hac linea conjunctionem, 45.) manu incertæ oculi mobilitati attemperata dirigatur, 46. atque ita nisi extremitatis specilli politæ contra superficiem corneæ internam modice pressante, oculi bulbus, quantum fieri potest, figuratur ac immobilior reddatur. 47.) Quo facto forfice specilli fulco dirigente, [48.] unica & recta incisione, [49.] a vulneris prioris initio usque ad finem fulci immisso specilli aperiatur cornea. (50). Eadem cura atque directione [51.], in altero corneæ latere instituatur ipsius incisio. En! alterum operationis hujus stadium. [52]. Specillo jamjam ore comprehenso, [53]. seposita vero forfice (54). sumatur iterum spongia [55.] eaque dicto modo [no 32. 33.] deniū eluat oculus [56.] qua deposita eadem manu [57.], ut calamus scriptorius, sumatur acus antea [§. 61. lit. d.] delineata [58.]. Sinistra vero manu ex ore comprehendatur [59.], inversum specillum manubrii loco cum volsella instructum [60.]. Volsella hac placide attollatur

inci-



incisum corneæ labium triangulare [61]. Hoc elevato acu caute aperiatur lentis opacæ capsula [62.], in margine ipsius inferiore [63]. Si hac aperta per incisam inferne capsulam non sponte decidit lens obfuscata, [64]. digitis dextræ manus bulbo oculi in superficie ejus superiori proxime juxta latera lentis opacæ appositis [65.], non lateral is fed deorsum tendens fiat levis pressio [66]. Si ita nondum sequitur, parvulo isto cochleari [§. 61. lit. d.] lateraliter immisso exitus ipsius promoveatur [67]. Si ne huic quidem artificio obedit, atque concretio ipsius adeat, ipsa acu ejus tentetur provida separatio [68.], cochleari interim in ore retento, [61.] tumque si vinculis suis liberata nondum sponte succedit prioribus duobus artificiis, dicta nempe pressione, aut hac irrita, cochlearis ope educatur [70]. Si denique obnubilatum hoc corpus majoris est voluminis, quam ut integrum per capsule incisionem exire possit, illud altera volsella cochleari juncta diffringatur [71]. Atque ita postmodum fraginenta ipsius inverso iterum instrumento, ope nempe extremitatis ejus, cochlear referentis, successive foras ejiciantur [72]. Eodem modo quoque reliqua corruptæ indolis materia, post exitum lentis opacæ restans, exhaui riantur [73]. Oculi cavitatibus probe ita a focibus suis depurgatis secta capsula provide iterum aptetur [74]. Labia corneæ dehiscentia vel digitorum [75.], vel instrumentorum, cochlearis nempe aut volsellæ ope, molliter suaviterque in situm suum convenientem reclinentur, sollicite ubique aptatis incisarum partium marginibus [76.] & oculi plorantis humitas indicato modo [no. 32. 33.] exsicetur [77]. His peractis factaque vix unico visionis experimento in solatium ægri atque operationis certitudinem instituendo [78.], imponantur splenia mollia ex linteis complicatis [79.] collyrio refrigerante imbuta [80.], totumque oculum penitus contegentia [81.], quæ sustineantur fascia conveniente vel strophiolo. Hoc tertium est stadium, quo absolvitur operatio [82.], sub juncta seria ægri, ipsique servientium informatione, quoad animi corporisque tranquillitatem [83]. Æger oculo etiam fano cooperto [84.] in loco obscuro [85.] atque lecto situ corporis convetiente, capite nimis magis elevato relinquitur [86.], cibis mollioribus, remotis acribus, salinis, aromaticis [87.] parce modiceque [88.], potu vero largiori aquoso diluto & refrigerante nutritur [98]. Venæ sectio pro ratione necessitatis post operationem instituitur atque repetitur [90.], & potio denique anodyna versus somnum ipsi offertur.

§. LXXIII. Absint hic subtilitatis atque supervacanæe prolixitatis objurgationes arti convenientes problematum resolutiones istas suadent, urg ent, præcipiunt. Quæ distinktorum legitime distinguendorum multitudine ampla sunt, haud inani abundant prolixitate, qua potius ii frustra superbiunt, qui agendorum in ejusmodi problematis occurrentium vix decimam partem obiter attingunt, & multo verborum rerumque alienarum apparatu distracti mirum quantam eruditiois suæ amplitudinem sibi

*Remove-
tur proli-
xitatis ob-
jetio.*

Tom. II.

G g ima-



imaginantur. Lascivæ ejusmodi suadæ potius tribuendum esse contendō, quod multi multa sæpius in certi generis libris lectionibusque publicis se didicisse existiment, qui, quando in ipsis ægris applicare atque exercere volunt superficiarias, quibus imbuti sunt, doctrinas, defectum earum demum sentiunt mille modis, quid faciant nescientes, atque officia suâ perverse ac imperfecte præstantes. Si medicinæ præstanda auxilia tam faciliâ essent, ac multi sibi persuadent, meliores profecto atque feliores in foro practico haberemus artifices, quorum tamen defectum in republica nostris quoque temporibus dolemus. Quid de *heroibus* ictis *medicis* atque *chirurgicis* brevi studiorum via medicinæ sacra præoccupantibus, & temerario mox ausu praxi sese immiscentibus, & qualiacumque non obiter intentata relinquenteribus statuendum sit, me tacente audaciæ ipsorum loquitur effectus.

Agendorum amplitudine in problemate nostro ista non difficultiora sed facienda reduntur.

§. LXIV. Ne vero nimis te deterreat rerum in foro medico agendarum gravitas, sic habeto: ipsa incusata artis amplitudo distincte proposita eam reddit facilem. Insufficiens autem & vagabunda confusionis abundantia istam ubique impedit, & sæpe quam facilissima reddit difficillima. Hac ratione multitudo agendorum in superiori *problemate chirurgico* [§. 42.] tot numeris distinctorum nil impedit, expedit potius in tradita *cataractæ operatione*, debite instituenda. Omnia enim ita cohærent, & se invicem excepunt, ut semel lecta indivulso nexu menti imprimi possint. Immo tota numerorum series tria tantum includit stadia, quæ in toto opere peragendo percurrenda sunt. Hisce menti infixis, reliqua omnia simul ob oculos habemus.

Transfatio. §. LXV. Resolutionem problematis nunc excipit ejusdem demonstratio [§. 51.], non quidem rigorosa, sed liberiori methodo tradenda [§. 14.]. Sequitur itaque.

S E C T I O I I.

De demonstratione dati problematis.

§. LXVI. *Resolutio problematis* modo tradita [§. 62.] veritatem commendatæ operationis, per se spectatæ, non solum nude, sed eatenus simul attingit, quatenus istam hucusque usitatæ, & supra [§. 52.] descriptæ, præferendam esse censemus. Inde *duplex* nobis incumbit *demonstratio*; quarum [a] una veritatem commendatæ extractionis cataractæ corroborat [b], altera vero prærogativam hujus operationis evincit. Prius autem punctum supponit posterius. Ex qua ordinis ratione jami sequitur.

PUN-

