

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioannis Ionstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLVI.

VD18 90528921

Illustration: Tab. 36. Emberiza pratensis. Wisemmertz. [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11068

Emberiza pratensis.

Wiesenmertz.

Prunella.

Linaria Rubra.

Stockhensling. Linaria.

Fringilla. Finck.

Hensling
Flachfinck.

Fringilla montana.

Acantur quom
Gaza Spinum et li
gurinum. or cat.
Zeisel.

Citrinella.

Citrinle.

Carduelis mas.

Chloris.

Grünfinck.

Serinus. Girliz.

Fedemlein.

Fringilla. alba.

Ligurinus alius

Carduelis cilijs albis.

Canaria.

Zucker Vogel. Canary Vogel

Fringilla
subluta.



Iden
17.

Ala
nith
c. 2.

Id
23.

G
O

Pectus et uenter magis albicant, rostrum intensius luteum est.

Idem. c. 17. Sed et auicula *pasferibus congener* huc referatur, cui rostrum, ut in domesticis, candicat, totum corpus

maculis subrufis, oblongis deorsum descendentibus tingitur. Venter ac femora albescunt. Tibiae pedesque subflauii sunt.

PUNCTVM III.

De Pasferibus Indicis.

Aldr. Ornith. l. 15. c. 22. **P**asferes Indici sunt uarii, sed praecipua ipsorum genera sunt quatuor. *Vnus est macrourus et hic duplex.* Alius rostro miniativo magnitudine domesticis, caudam si excipias, par, rostro breui, crasso et praedicti coloris. Capite plano prope cernicem eleuato, intercurrente subuiridi ad caeruleum uergente colore, subnigrum. Guttore, collo inferiore, pectore et uentre candicantibus. Alis subuiridi ad caeruleum uergente, albo, nigro et lutescente colore tinctis. Cauda duplici minore nempe, alba, quae maioris fulcrum et maiore quatuor pennis longitudine dodrantale angustissimis constante aterrima. Tibiis et pedibus ex nigro et albo maculatis, unguibus nigris et acutissimo hamo armatis.

Idem. c. 21. Alius rostro caeruleo, cui caput, ut in illo, planum, sed in ceruice magis eleuatum totum nigrum. Oculi nigri, circulo albo circumdante et inde lutescente. Collum et pectus coloris coccinei, uenter et coxae candicant. Alae, tergus et caudae nigricant. Caudae longiores pennas, quae sunt binae longissimae, quinque nimirum palmorum et latisimae, tertia primum etiam lata, sed in exilia admodum filamenta desinens, minores aliae sustinent.

Alter est *brachyurus* superioribus

omnino dissimilis, minor nempe et praeter pedes et rostrum, quae carnei coloris, totus niger. Cauda breuiore. Oculis nigris albo circulo cinctis.

Tertius est sine uropygio et hic uel erythromelanus, in quo totum corpus prone et supine, item alarum principia coccineo colore splendet. Reliquum alarum atrum est. Rostrum pro corporis proportionem exiguum et domesticorum rostro minus colore, qua capiti iungitur, albo, caetera nigro, acutum et exile. Uropygium nullum. Inde ex eius pennis *Idem. c. 27.* *nerii thymelanus* superiori longior, rubri, cyanei et nigri coloris quique habet caput, collum, pectus et inferiora omnia coloris rubri saturati, ad colli latera maculas binas, contiguas semilunares, magnas caeruleas, rostrum paruum, recuruum, nigrum, prope frontem album, alas admodum longas, nigras, ad latera caeruleas, pedes breues et nigras.

Quartus porphyromelanus, cui caput, dorsum, uropygium coloris sunt *Idem. c. 28.* purpurei saturati. Rostrum collurionis aemulum, superius nigrum, qua capiti adhaeret, album. Remiges alarum nigrae. Cauda quinque digitos longa, decem pennis nigerimis constans.

PUNCTVM IV.

De Embriza Alba et Pratensi.

Gesner. in Ornithol. **H**ae passerini etiam generis esse uidentur. *Albam* ita Gesnerus describit: emberiza alba, quae mihi demonstrata est, media hyeme apud nos capta maior est flaua, rostro breui, latiusculo, flauum nihil habet. Colore similis alaude, alioqui dissimilis, uentre albicante, a quo

etiam albam cognominauimus. In superiore rostri parte retro mucronem, tuberculum intus conspicitur. Digni fusi sunt, crura album et puniceum colorem prae se ferunt.

De pratensi sic idem: emberizam pratensem uoco, quam aucupes nostri *Wise Emberitz* a pratis in

N

qui-