

**Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

**Jonstoni Historia Naturalis**

Ioannis Jonstoni|| Theatrvm|| Vniversale|| De Avibvs


**Jonston, Jan**


**Heilbrunna, MDCCCLVI.**

**VD18 90528921**

Illustration: Tab. 38. Montifringilla mas. [...]

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11068**





*Vetus.* Isdem, quibus carduelis uescitur, nasci in primis et comizae femine.

*Genera-  
tia.  
Vox.  
Aldrov.  
Ornith.  
l. 18.c. 4.* *Nidulatur* in montium syluis. *Oua* secundum nonnullos duodecim, se- cundum alios quatuor aut quinque ponit. Amoenissime cantat et non tantum carduelis, sed et aliarum avium aliquando uocem imitatur.

*Velutus.* *Volant* gregatim et toto agmine facillime autumno capiuntur. San- guis eius cum fali sanguine non coit. Asino uero, quod spinas tempore uerno depascens nidum deiiciat, infensus est.

*Descri-  
prio.* **PASSER CANARIVS** ab insulis Canariis, unde adfertur, ita di-ctus, auis est uulgaris, parim magnitudi-

ne, rostro albo parvo et in acutum tendente, alarum et caudae pennis totis viridi colore. Mari pectus, uen- ter et pars superior capitidis, quaero stro adiacet, magis lutea sunt, quam foeminae.

*Pascitur* phalaridis femine, fac- *Vetus.* charo et auricula muris, qua ad cantum excitantur.

Concentu est ualde amoeno et a- *Vox.* cuto, quem spiritu diu non interru- pto nunc longum, nunc in altum uaria uocis inflexione extendit.

Praeferundi, quibus cauda longi- or, corporis magnitudo minor.

## C A P V T II.

*De Fringilla, Montifringilla et Linaria.*

*Descri-  
prio.* **FRINGILLA** seu, quod frigus pre- nuntiet seu, quod plures in frigo- re conuolent, ita dicta, spiza est Ari- stoteli, modernis Graecis fringillaro. In ea capitidis et colli pars prona ad subcaeruleum uergit, quod hinc ad uropygium subuirecicit. Pectus et uenter inter rubrum et spadiceum ambigunt. Foemina minus uegetis or- natu coloribus, pectus et uenter ex rufo albescunt. Visa toto corpore candida. Visa et ex albido flauescens.

*Locus.* *Locis* gaudent hyeme moderate *drift. H.* frigidis, aestate tepidis. Nam in Hel- uetia foeminae per hyemem rece- dunt et ualido frigore ita offendun- tur, ut uolare nequeant et manibus capiantur.

*Genera-  
tio.* In infimis arborum et summis fru- ticum ramis *nidulantur*. Nidus in- tus ex lana et aranearum telis, extus ex musco construitur. Quinque aut sex ponere *oua* aucupes referunt.

*Vox.* Non uno eodemque modo ca- nunt. Quaedam concise quasi quae- rulantur, quaedam in longum tra- hunt. Maribus uox alta est et ple- na. Foeminis exilis et submissior. Fringutire uel frigere autores di- cunt, si, suauius ut canat, uolueris, locutam mandendam adpone.

*Ingenuum.* Difficulter ob astutiam capiuntur, facilius uel zephyro flante uel sodo.

Nam et demissius tum uolant et me- lius allelectricum uoces audiunt. Quaedam nunquam mansuecant et inedia consumtae commoriuntur. Omnes primis captiuitatis mensibus praemoesitia obmutescunt nec ni- si blanditis exhilarantur. Ma- ne si canant, tempestatem pre- *Theophr.* sagiunt.

**MONTIFRINGILLA** magnitu- *Descrip-  
tione.* dine fringillam excedit. Color in *prio.* capite, dorso et cauda nigror, quam fringillae. Supina pars albicat. Pectus cum gutture nonnihil rubo- ris habet. Aliae duabus transuersis lineis ex rufo flauescientibus di- stinguuntur, media linea interie- cta. In foemina uertex, ceruix et dorsum plus habent ferruginei, ala- rum linea superior adeo est angusta et brevis, ut fere delitefcat. Non adeo suave canunt et caueis inclu- fae aliarum, pasferum in primis, uo- ces imitantur.

**LINARIA** passeris est magnitudi- *Descrip-  
tione.* ne, specie admodum similis, colo- re tessaceo seu ferrugineo ad cine- reum uergente eoque in mare inten- fiore. Idem in pectore maculis re- spergitur rufis, foemina fuscis et maioribus. Alarum rectrices pen- nae nigrificant, sed ad latera et in extremitatibus suis candicant.

N 2

*Cibus*