

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.


VD18 90529014

Illustration: Tab. XXIII. Salmo Salm Lachs [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089

Salm. Salm.

Lach.



Salmo albus


Salm. Ein ander geschlecht.



Mugil cib. Meenalet



Mugilis species alia.




Lupus. Meer Wolff



Capito Anadromus. Elbfisch Meernaser.


Caper. capri. Sawfisch




Acipenser Zeelandicus.



Acipenser



Acipenser seu Sturio 2.



Sturio 3.

Gesteng

*Galen. de
Alim. facult.
l.3.* Galeno sunt fluviatiles, οὐφαλος generis quidem nomen est: sed quia παντες τὸ βαρύτερον τὴν οὐφαλήν ἔχει nomen obtinuit, nec id omnibus magnum, non omnibus etiam competit, nisi forte ideo dictum esse putas, quod in metu capite abscondito totum se occultari credit. Aristoteli, fane

**Arist. H.
A. 4. 9. c. 17.* aliquando peculiaris et unica *Mugilum species est*; aliquando duas *†* *Aristot. H.* sub se species complectitur: nec forte *A. 4. 8. c. 2.* male Mugiles marinos in Cephalos et νησes distinxeris. Νησis epithetum est omnibus Mugilibus commune, quod omnibus carnibus abstineant. Ηεραιas speciei nomen est, sed speciem Cephalii alteram, quae muco suo vivit Epithetum, et idem cum μυζηω videatur. *Sargus*, seu ut apud Aristotalem σαργινος, quid sit, dubitatur, Rondeletius eundem cum νησεi seu jejuno facit, Aldrovandus discernit. *Che-*

*Plin. H. N.
l. 32. c. 7.* Plinius Banchos inter Mugiles recentest, sed cum Myxone eodem facit. Rondeletius Bacchum quintam quan-dam speciem Hicesio esse, insinuat. Σφηνεις, Salviano cuneatus, Gefnero Cunealius, quod λαγαδος και τετράγονος, gracilis et quadratus sit, ita dictus, a solo Eutymeo inter Mugiles reponitur. Alii σφηνεις legunt, ut a σφην vespa, non σφην cuneo, isti pisces dicti fuerint. Δακτυλεος nomine Salvianus minorem aliquem in eodem genere ab Eutymeo ponit, alii διδακτυλεος, sed perperam legunt, cum duos in latitudine digitos non excedat: nec alii forte fuerint, quam quos Padi accolae Canistrillos, quod in Canistris venales ferri soleant, vocant.

*Galen. de
uji part.
l. 8. c. 6.* *Cephalinus* quibusdam cum Blaesia, teste Dorione idem, nisi mendum sit, et pro Blaesia βλέπεια, quod idem quod μυζηω, ut Galenus scribit, significat, legi debeat, et sic Cephalinus inter species Nestium numeretur.

Plaetarum nomen Cestreis a qui-busdam imponitur, si Polemoni libro de fluminibus Siciliae credimus. Actum de illis in capite de Muraenis. Species Mugilum seu Cestriorum sunt

quinque, apud Aristotelem, *Cestreas* nempe proprie dictus, *Cephalus cognomento Chelon seu Labeo, Cephalus pereas*, sive translitoranus, *Sargus* sive *Sargo*, et *Myxo* seu *Muco*. *Caput* nonnullis est magnum et depresso, *rostrum* breve ac retusum, ut *Capitonibus*, aliis minus et rotundiis, rostrum magis extentum et acutius, ut *Cheloni*. *Os* omnibus parvum, rotundiolum et edentulum. *Squammis* omnes teguntur. *Cestreus* magnas et crassas habet, quae nummatis speciem mentiuntur. *Pinnas* utrinque binas gerunt, illos si excipiias, quos lacus Sipharum gignit, quibus teste Aristotele, una tantum *Arist. H. A.
l. 6. c. 13.* utrinque est, et supinis carent. Praeter binas illas pinnas, quae utrimque *Aristot. de
part. l. 4.
c. 13.* consistunt, unam habent ab ano; in dorso duas, quarum altera aculeata est, altera aculeis caret; ad caudam spectans. Omnes a branchiis *lineas* aliquot subobscuras ad caudam deductas habere videntur, et si haud aequa in omnibus sint conspicuae. *Dorso* sunt subnigro: *ventre* vero candido. *Ventriculus* teste Aristotele carnosus est: cui parte altera plures appendices exeunt: altera una tantum, ut idem ait. Rondeletius longe alium esse scribit quam in carnivoris pisibus, densum nempe et carnosum instar ventriculi avium, foris planum, intus rugosum, figura verticilli vitrei, quod mulieres fusis appendunt. *Intestina* quoque crassa sunt, pinguique et in gyros acta; in quibus splen latet, ut idem observavit, et sub pinna locum aere plenum reperit. *Hepar* pallidus; parvum, et tanquam manu ventriculum amplectens. *Fel* rufum sive flavum, aqueae consistentiae. *Cestreo* ejusdem Rondeletius hepar ex albo rubescit: caro mollior, laxior, minus candida, minusque pinguis, quam Cephalo, additque gulam habere; ventriculum in longam appendicem desinere, semper inanem esse, uti et intestina. *Lapis* quem *Cestreus* in capite gerit, *Echinus* et *Sphondylus*, ab echinata specie dicitur. *Lineae*, quae a branchiis ad caudam ducentur, Cephalo breviores sunt. *Che-*

O 2 *cav-*